

Ptyrostoma. Cal. 5 phyllis. Cor. petala, infundibuliformis. Cor. lobulatis
polyperma

Vrytea *Senis* *alscolan*

Ptyrostoma
Ptyrosma

monogyne | *Stygnostomifolus oblongus*, floribus monogyne
^{ex herbario}

Habitat in Cap. b. spec. Herb. Royana &

Racis Stoebe Gnaphalodis. Caulis fruticosus: rami aggregato verticillati, teretes, purpurascens, superne villosa subcinerea, foliis tereti. Folia sessilia, adpressa, imbricata, vix semiunguiculata, oblonga, integerrima, ~~oblonga~~ mucrone fusco membranaceo terminata, intus glabra, concava, extus convexa, villosa, proscidium margine. Flores in capitulo globoso pappo triplo majora, sessiles. Bractea duo lineares ad basin calycis ejusque longitudinis. Calyx pentaphyllus, longitudine tubi corollae: foliola linearis, concava, pilosa, quae uti bractea mucrone arido fusco terminata, duo extenora. Corolla monopetalala, infundibuliformis: tubus rigidus, subplicatus, purpurascens: limbus quinquefidus; laciniis lanceolata, albedo, medio vena purpurascens puncta. Anthera quinque in faucibus, sessiles, sagittata, erecta. Germen globosum resupinatum. Stylus crassus, exsertus. Stigma obtusum, subtriangulata.

Medic. ca. Corolla 1 petala
filam. 5
stylus unicus
fructus tri valvis

Mystrotes

Folius ovatis, floribus digynis

Stalbe la Mart. illustr. *Et.* p. 56. f. 4.

Habitat in Cap. b. spec. Herb. la Martii, Roeyni et Burmanni.

Rami teretes, purpurascens, villosi, folius tecti, apice 3 vel 4 fidi.

folia sessilia, imbricata, vix semipollicana, ovata, callo apice

callo fusco, rigida, arena emersa, stete glabra, integerrima.

floralia lanceolata, hirsuta. Flores ad apices ramorum, sessi-

les, congesti, foliis inter & inerti. Bracteo duo ad basin calycis,

ovata, calyce breviores. Calyx pentaphyllus: foliola lanceolata,

pellucida, duo extenora[#]. Corolla monopetala infundibuliformis.

Tubus cylindricus, equali, longitudine calycis purpurascens: lim-

bis quinquefidus; laciniis lanceolatis acutis, margine albidis, di-

scis utrinque colorato. Filamenta quinque, in fauce tubi inter

lacinias. Anthera linear-lanceolata, limbo parum breviores,

erecta. Germen superum, unicum. Stylus duo capillares, pur-

purei, glabri, corolla parum longiores. Capsula bitriloculari, pety-

sperma.

* uti bracteo
apice fusco
callo

Pannari

neou

Habitat in Senegal.

Præmi teretes, ferrugines tomentosi. Folia subpetiolata, quinque pollicaria,
cordata, oblensa, obtusa, integerrima, supra glabra, nitida, subtus venosa,
incana, junctura utraque ^{seors} tomentosa. Racemi axillares et terminales,
ferrugines tomentosi, pedunculati, quinque pollicares. Bracteæ ovato-