

Pulmonaria

* ^{calycis} Pentantherum longitudine tubi corollae

1. officinalis P. foliis hispatis: caulinis ovato-oblongis, radicalibus subcor
latis
2. angustifolia P. foliis hispatis lanceolatis attenuatis. radicalibus
ellipticis
3. suffruticosa P. foliis linearibus scabris, calycibus subulatis quinque
partiti

** calycis tubo corollae dimidio brevior

4. paniculata P. calycibus quinquepartiti hispatis, foliis ovato-oblongis
perimatis pilosifoliis
5. mantiniifolia P. foliis ovatis caule ramoso prostrante
omnibus
6. sibirica P. foliis radicalibus cordatis, caulinis ovato-oblongis
7. virginica P. foliis lanceolatis obtusifoliis
ellipticis

glaberrimis.

7 virginica P calycibus abbreviatis, foliis lanceolatis obtusifoliis Lin. L. V
Müll. Dict. 4. 212.

Symphytum s. pulmonaria non maculata, foliis glabris acuminatis, flore
pediculis conulis Plukh. alm. 359. 4. 227. fig. 6.

Habitat in Virginia 4

~~Stem radiatim, longe petiolata videtur subrotunda uninervis
globata lobis profunde serratis, glabra venis bipollicaribus
na. Petioli longitudine capi. ^{petioli rariore compressi} Capiti exilis simpliciflori
mus. flores terni nati umbellati pediculi pollicares
iniquales ^{circiter} involucris in sphyllum linear lanceolatum
pediculis brevior. calycis laciniis lanceolatis corolla omnia
brevior laciniis limbi oblongo.~~

Paulis glaber striatus. Stems oblongo lanceolata oblongis ob
super integerrimis inferiora basin petiolum attenuata
superiora simplicia, nervosa. Pediculi et axillis
superioribus et apicibus caulis, multiflori. pedicelli filiformes
mes. Calycis laciniis brevior corolla multo brevior in meo
acuta styli longitudine corolla

gmelin

6 Sibirica P. calycibus abbreviatis, foliis radicalibus cordatis Lin. Spec. pl. pag. 194x LV.

p. Gmel. Sib. 4. p. 75. 739

Habitat in Sibiria 4

similis veronica foliis tota glaberrima folia calycibusque
virenti glauca styli corolla longior

— glabra

inferioribus attenuatis

5 Mantima P. calycibus abbreviatis, foliis cratis caule ramoso procumbente

8 l. Dan. 725

Cynoglossum perenne mantimum procumbens Monf. hist. 3. p. 450. f. 11.

7. 20. fig. 12.

Cynoglossum procumbens glaucophyllum maritimum Plukin. alm.

12 C. 1. 177. fig. 3.

Cerithe mantima procumbens Dill. Clth. 75. t. 65. fig. 75.

Habitat in Anglia, Norvegia, Flandria Littoribus O & Y

Caules plures procumbentes, glaberrimi uti tota planta,
~~simpliciter~~ saepe pedales. Folia inferiora subpeltata
basi attenuata, superne dilatata, superiora sessilia
omnia acuta coriifera arenia, vixi-glaucia. Flores
minores quam in peltata cum qua habitu sat convenit.
rudunculi axillares et terminales styli corollae breviores

glabra

~~inferiora~~
inferne attenuata

4 paniculata. ? calycibus abbreviatis quinque partiti lippedis, foliis ovato-oblongis acuminatis pilosis ⁱⁿ ^{caulis} Hort. kew. 1. p. 101.

Habitat ad fretum Hudsonis ?

varia floribus coeruleis et albis ?

Caulis ^{angulatus} sulcatus glaber. Folia sessilia ^{sub} brevifolia venosa subtus pallidiora pilosiora. Peduncululi axillares foliis longioribus ^{superne} foliis geminis ^{fructura} caulium ^{non} foliorum caulis. Calycis pilosus 5 partiti tubo breviter ^{sub} tubulato.

? suffruticosa Pulmonaria foliis lineantibus scabris, calycibus subulatis quinquepartitis
Lin. Spec. 1667. * S. V. p. 107

Lithospermum angustifolium umbellatum Bauh. Prodr. Pin. 250. Pluk. Phyt.
42. fig. 7. Boiss. Sic. 177.

Habitat in Alpibus Italiae & t.

Caulis radicales hyposi, perennantes cum foliis: Flores caulis palmare, simplicis
simi, subulati. Corolla linearia et fere glaberrima, sparsa, hispida, longa. Flores
subsicculati, terminales, calycibus quinque partitis, subulatis, corolla di
midio brevioribus Lin. Spec.

2 angustifolia P. foliis radicalibus lanceolatis Lin. S. V. p.

Fl. Dan. 1. 483

maculosa Pulmonaria 5 pannonica Clus. hist. 2. p. 170.

Habitat in Pannonia, Helvetia, Dania Suecia
β foliis non maculatis

Pulmonaria III. Clus. hist. 2. p. 169. cum fig.

angustifolia Pulm. foliis hirsutis oblongo-lanceolatis amplexicaulis;
radicalibus ellipticis Hort. Kew. 1. p. 181

Habitat in Dania Suecia Pannonia, Helvetia
caulis nitidus uti folia et calyx et

magnitudo pro cidentibus
folia semicomplanata attenuata. Inflorescentia
ut in officinali sive ac calyx lacinae tantum parum
maiores

Pulmonaria foliis hirs. Loh. 4. 536. herb. Sall.

1 officinalis P. foliis radicalibus ovato-cordatis scabris Lin L.V

8l. Dum. V. 482

- Symphitum maculosum s. Pulmonaria latifolia Bauh. pin. 59.
β. Pulmonaria vulgaris latifolia, flore albo Tournef. F. R. 4. 136.
γ. Pulmonaria non maculosa folio Clus. hist. 2. p. 160. Bauh. pin. 257.
Habitat in Europae nemoribus 4

officinalis Pulmonaria; foliis hirsutis: caulibus ovato oblongis; radicalibus
subcordatis Hort. Kew. t. p. 101.

Caules palmares. Folia radicalia petiolata, caulibus ^{acuta} semi
amplexicaulia inferiora basi angustata. Laciniae cal.
Calycis longitudine tubi laciniis lanceolatis

sepihana Pulmonaria

Pulmonaria sepihana Echii folio veniciflo, calyce sepihani, flore coeruleo
ex insula herbos Tournefort. Cor.

Habitat in Insula herbos herb. Tur.

Caulis herbaceus, erectus, palmatis, simplex, subhirsutus. Folia utroque pilosa,
radicalia subrenata semipollicaria, integerrima, superiora lanuginosa,
lanceolata, obscure remote dentata, acuta, margine villosa. Pediculi
et axillares, solitarii. Calycis laciniis ovatis. Corolla calyce parum lon-

gior

an hujus generis?