

Pycnostemum?

Brachyotum.

Thymus roquianus L.

Habitat in Armenia septentr.

Calyx bracteis immixtus, subincurvus, subcuneiformiter tubulosis, brevissime & que
dentatus: dentibus subaequalibus, acutis, ciliatis, apice subbipatis, intus glaber. Cor.
tubus filiformis, calyce angustior, superne recurvus: limbus subampiculatus
delatatus; lobum superius porrectum, apice rotundato subbifido: inferius recurvo-
patulum, trifidum, lobis lateralibus rotundatis, inter medio productiore oblongo subbi-
gulato, obtuso, subrenulato. Stamina 4. minutissima. semina oblonga, subtetragona
cylindrica. Richard.

Medium Brachypteron

Habitat in Carolina Herb. Rich.

Caulis herbaceus, erectus, semipedalis, glaber. Folia sessilia, ovato-lanceolata, pollicaria
acuta, glabra, subtus nervosa, utrinque punctata, obsolete remote denticulata.
Capitula terminalia, parva. Folia floralia integerrima, uti pedunculi et calycos
vellosa canescentes.

habes -

verticalatum Brachyflorum

Habitat in Carolina Richard

Caulis herbaceus, ramulosus, glaber. Folia semipollucaria, ovato-lanceolata, utrinque punctata, subtus nervosa, integerrima, suprema uti verticilli caeserentes. Flores verticillati.

anistatum Pycnostemum

Nepeta virginica L.

Habitat in America boreali herb. Michx.

Caulis pedalis et ultra, canescens, superne ramosus. Folia petiolata, lanceolata vel lanceolata-oblonga, interdum lineari lanceolata. Saepe vultu. Florem terminalis foliis cinct.