

Pyralana

pubera *Pyroluna*

Habitat in Carolina herb. Nut. 5

Frutex 3-6 pedalis. Rami superne pubescentes. Folia petiolata, alterna, sive
peltata, elliptico-lanceolata, villosa, acuminata, integerrima, subversuta.
Flores in racemo terminali, sesquipedaliter villosi, dorsi. P in fructu Vermine
li erecta, brevissime pedicellati. Bractea villosa minuta. q in axillis supe
rioribus, solitarii et fructu Vermine latiore et raiflora. P Cal. brevis, cam
panulatus, tubo hemisphaerico concavo: lacinis revolutis. Stamina 5. calyci
breviora, superne in tubo, filamenta brevissima, crassiuscula. Anthera subdyma
erecta, oblonga subrotunda, tuberculum subcarnosum inter fructum et laciniam
♀ Calyx tubinatus-companulatus, sive fidus: lacinis revolutis. Anthera sive
steriles, germinis calyci concavum, rasperum, superne valescula quoque. Baies
stylus calyci brevior, erectus, crassissimus. Stigma subpeltatum. Baies caly
ce coronati, umbilicati. Pene arpeum crassissimum, versus parietes
internas induratum, loculare, spermium. Semen subovoidem in fundo
basi affixum centraliter
ordo naturalis E Coagui ?