

Ryostno

retundi-folia *Pyrostrophia* foliis oblongo-subrotundis, pedunculis unifloris

Habitat in insula Bourbonis Commaef. herb. Guss.

Rami teretes, glabri, cito striati. Stipulae superne, sessiliae, sesqui-pollicariae, pollicem fere
latae, obtusissimae, basi sinu cordatae, utrinque glabrae, coriacea, supra nitida, arenae,
subnervosa, subtus pallidiora, venosa. Pedunculi axillares, uniflori, unguicula
res, sursum unicaspati, medio bracteis duobus orati.

oloides *Pyrostoma* Encycl. p. 209. Tab. 69

Habitat in insula borbonica ad St. Louis.

Rami teretes glabri et cortice cinereo articulati superne alter-
natum compressi. articulis apice dilatatis. Folia petiola-
ta opposita elliptica lanceolata bi-pollucaria et ultra, utrinque
glabra et avenia subtus pallidiora obfusa venosa obtu-
sifolia, integerrima. Petioli semunquiculares. Nervi
pubulato vix unguiculares, interspaciae decidui. pedun-
culi axillares oppositi plerumque triflori breves apice bracteis
brevi canaliculatis pedicelli pedunculula longiores

Commerſoni Pyroſſina

Pyroſſina ^{Guſt.} ~~Guſt.~~ Gen: pl. pag 206.

Habitat in Infula Bobonica &

non vid: plures & antea ſpecies