

Cynus

*Folia folia Pynus foliis linear lanceolatis canis subtus albo tomentosis, floribus  
axillaribus solitariis subsessilibus.*

Junosa Pynis foliis lanceolatis utrinque glabris, ramis junceis fertilibus  
Pynis Junosa

*Pyrus orientalis*<sup>2</sup> *sylvestris*<sup>1</sup>, folio oblongo. incano Tournef. Cor. pag. 43.

Habitat ad Pontum Euxinum

Rami fasciculati

habes

*pruniifolia* Lynce

Habitat in Syria herb. Desfont.

Rami teretes, superne angulati, glabri. Spino rariores, sparsae, unguiculatae; validae, saepe foliiferi. Folia aggregata, ternata, petiolata, semipollicaria, oblonga, utrinque glabra, venosa, subtus pallidiora, serrulata. Petiolus unguiculatus. Conyubus terminali, brevissime pedunculatus. pedicelli pollicares, glabri. Calycis lobata intus pilosa.

*Pinus*

*Pinus sylvestris orientalis* folio oblongo incano Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Rami teretes, glabri, purpurascens: ramuli pubescentes: Folia petiolata oblonga vel lanceolata-oblonga, utrinque tomentosa incana, axillate supra glabra? integerrima, junio ~~et~~ a semipollicaria

Cydonia P foliis integerrimis, floribus solitariis Lin S.V. p.  
Haequ. fl. austr. 4. T. 342.

Malus cotonea sylvestris Bauh. pin. 434.  
β. Malus cotonea major Bauh. pin. 434

Sub nomine V Cotonea et Cydonia Lobel. hist. 500

Cydonia leptanua Malus cotonea minor Bauh. pin. 434.

In herb. Quis. vidi  
plantam an rone  
tas

Habitata ad ripas petrosas Danubii

foliis cordatis acu-  
tis, acutis subtus  
tomentosi. Eructus  
pyriformis. Rami  
superne tomentosi.

Rami teretes glabri fusci purpurascetes junioribus tomentosi  
viciis. folia petiolata, ovata acuta supra glabra  
vix venosa subtus viciana tomentosa sesqui polliciana  
stipula lanceolata unguiculatae, obtusiuscula utrinque  
versus marginem glandula plura parva fusca petiol  
viciana ubi flores subsessili in apice ramulorum  
solitarii. Calycis foliola ovata oblonga villosa pagina  
glandulis fuscis adspersa unguiculatae. Petala pollicia

na

ovata

subtus viciana

*prunifolia* *Pyrus* umbelliferis, pedunculis pubescentibus, stylis basi canatis,  
foliis ovatis acuminatis Willd. *phyt.* pag. 8.

*Crataegus ceratopholis*, floribus magnis Mull. *ic.* 100. t. 269?

*Pyrus malus* f. *aut* *hort.* *hens.* 2. pag. 175?

Habitat in Libani



nivalis P. foliis integerrimis, floribus corymbosis Lin. Suppl. pag. 255. t. V  
pag. 467. Gauc. fl. austr. 2. t. 107.

Habitat in Austria <sup>transalpina</sup> <sup>in</sup> <sup>monte</sup> <sup>negosi</sup> P. ovalia supra villosa subtomentosa  
rami crassiusculi - folia elliptica petiolata <sup>to</sup> <sup>gemma</sup> <sup>rustica</sup>  
subtus perica <sup>circumflexa</sup> albidaque. Flores ter minores corymbosi  
Lonicibus globosis acerbis sponis sed maturis putrescent  
dulcisponis her. Pedunculi valde tomentosi uti calyces.  
petala oblonga magna

folius ovalibus

subtus tomentosus

communis P. foliis ovatis serratis, pedunculis corymbosis Hort. Kew. 2.

pag. 174

*Pyraea* *Pyris sylvestris* Dod. pempt. 351. Bauh. pin. 439.

*Salem* *Pyris Bergamotta gallica* Bauh. hist. 1. p. 45.

*Pompejana* *Pyris boni christiani* Bauh. hist. 1. p. 52.

*Lavonia* *Pyris Jesus f. mophatellina rubra* Bauh. hist. 1. p. 44

*Volcema* *Pyris Dorfolia eademque liberata dicta* Bauh. hist. 1.

p. 53.

*Pyris communis foliis serratis Corbus, floribus corym-*  
*bosis* Len. l. V. p. 466

Habitat in Europa, variet

varietates hujus vid. in Mull. Dict.

<sup>Illenana</sup>  
Poll. vera P. foliis serratis subtus tomentosis, floribus corymbofis Lea-  
mant. 244. \*

Pijnis poll. illenana Bauh. hist. 1. p. 59

Habitat in Germania 5

Rami teretes, fissi, unice punctati. Folia petiolata, ob-  
longa tomentosa supra etate glabra costa tantum  
cinerea. Corymbi terminales pedunculis calycibusque  
tomentosis ciliatis. Flores frequentes minores quam in  
communis

proct P. foliis serratis villosis umbellis trifloris Pall. fl. ros. pag 22

non vidi

microcarpus Piperis foliis oblongis serratis <sup>velatis</sup> umbellis sesquipedibus calyci-  
bus intus tomentosis

Habitat

ex herbo de Braetzel prope Ultrajuba

Petoli uti folia juniora villosa cinerea. Folia basi  
sepe integerrima acuta pollicina etate glabra  
Flores Piper baccati cui similes ad flores multo fructus  
multo minor

on procor Pall.

malus P. umbellis sessilibus, foliis ovato-oblongis acuminatis serratis  
glabris, unguibus calyce brevioribus; stylis glabris. Hort Kew. 2.  
pag. 175.

Sylvestris Malus sylvestris Dod. pempt. 709. Pin. 433.

paradisiacas. malus pumila quae potius frutex quam arbor. Bauh  
pin. 433.

praefomela v. Malus praefomela Bauh. pin. 433.

subelliana d. Malus sativa, fructu sanguinei coloris ex austero  
subdulci Tournef. Art. 635.

castriana & Malus curtis pendula dicta Bauh. hist. 1. p. 21.

caவில்lea & mala sativa, fructu magno intense rubente, vis  
to odore Tournef. 4. 635.

Eurotia h. Poma orbiculata Ruell. Herp.

Pyrus malus: foliis serratis umbellis sessilibus in  
f. v. pag. 466.

Habitat in Europa

& Crataegi cerasi folio floribus magnis Mill. ic. 100

Folia subtus villosa, brevius mucronata quam Pyrus communis

varietas in mea oratio villosa subtus lanefolibus

spec. abies P. umbellis septibus, foliis ovali-oblongis serratis lobibus, unguibus  
calycis longioribus, stylis basi lanatis Hort. Kew. 2. p. 175.  
Habitat in China 5



baccata P. foliis aequaliter serratis, pedunculis confertis, pomis baccatis,  
calycibus deciduis. Hort. kew. 2. p. 175

Crataegi cerasi folius, floribus magnis amm. ruth. 274 Tab

<sup>31.</sup>  
Pyrus baccata foliis serratis pedunculis confertis, pomis baccatis  
Hort. kew. Mant. 757 N. V. 466

Habitat in Siberia, Dauria &

Rami Vertices glabri folia ex eadem gemma ac flores petio-  
lata oblonga acuminata sesquipollicia na utriusque  
acuta tenuispine serrata glaberrima. Petioli filiformes  
ut ped. pedunculi virides & ex apice ramuli filiformes  
glabri versus medium truncati lineari <sup>quasi pectate</sup> pubescentia. Corinae  
calycis lineares acuta petala oblonga unguiculata caly-  
ce duplo majora

coronaria P. foliis cordatis indivi-  
satis serratis angulatis glabris, pedunculis com-  
pofiti Hort. Kew. 2. p. 176.

Malva sylvestris, flombus odoratis Gron. Virg. 55.

Cynus coronaria foliis serratis angulatis, umbellis pedunculatis  
latis hinc spec. pag. 607 & L. V. p. 466.

Habitat in Virginia;

Rami teretes fusci Ramuli alterni breves foliosi et  
floriferi. Folia petiolata alterna oblonga per basi  
subcordata obtusa obtuse serrata juniora subtus  
tomentosa adulescentia utroque glabra subtus & nervis pene  
venosa. Petioli filiformes. Pedunculi ex apice  
pollicares uniflori calycis laciniis lanceolatis  
attenuatis extus glabris intus tomentosis

subcordato oblongis

*P. angustifolia*  
~~*P. angustifolia*~~ foliis oblongis f. basi acutis incisè serratis, ramis  
& utapris umbelis terminalibus

Habitat in Virginia: America septentrionali. ~~In ex parte~~

~~*P. angustifolia*~~

*P. angustifolia* Pini coronaria, an eadem? Rami teretes, cinere  
subvillosi apice tomentosi. Folia petiolatè alterna  
remota pinnata angustiora lanceolata oblonga ad ultro  
vs oblonga bipollicaria et ultra utroque glabra subtus  
tenuissime venosa incisè serrata acuta stipula  
pubulato petioli incana. Pedunculi terminalis 4-5  
pollicares uniflori Calyx intus tomentosi

*P. angustifolia*  
integerrima

*P. angustifolia* foliis lanceolato - oblongis nitidis dentato - serratis  
basi attenuatis integris, pedunculis corymbosis Hort. New  
2 pag 176

ead. ~~non~~ *angustifolia*

*Quercus Pymis foliis serratis ovalibus, floribus solitariis Dronici Mout.*  
Weisf. pag. 17. Tab. 57

non vidi

Poir de quod

Habitat frequens. St. Clairi prope Lutetiam

Rami crispis pennis cymis, superne tom. inf. Ramiuli breves validi.  
Folia petiolata, bi-3. tripollicina, lanceolata elliptica, juncea  
utrinque tomentosa, etate supra glabra subtus viciosa, utraque  
acuta, integerrima, nerv. apice serrata. Truncus albus herb  
maus

Grammia

5 and 2 yr

japonica P. foliis lanceatis glabris, floribus solitariis Thunb. fl. japp.  
p. 1. V. p. 467.

Habitat in Japonia & herb. Royani  
Folia obovata ut semi polluciana

*Salix-folia* P. foliis lineari-lanceolatis canis subtus albo-tomentosis, flo-  
ribus axillaribus solitariis subsessilibus Lin. Suppl. p. 255. #5. V. p  
467.

*Pyrus salicifolia* Pall. A. 3. p. 734. Tab. N. fig. 3.

*Pyrus sylvestris orientalis*, foliis oblongo ovatis Tournef. corol. p. 43.

Habitat in arenosis desertorum Sibiria &  
arbor primo vere florens. Fructus pyriformis, vultuatus  
parvus Lin.

non vidi.



Spinosa Pyrus spinosa, foliis lanceolato oblongis integerrimis  
Pyrus spinosa: foliis oblongis Tournef. Def. pag. 211

Habitat in Arabiâ Inros et Natolis Liban.

Rami glabri vertes cortex purpurascens, punctati. Ramuli  
aeterni bis tripollicares spinosissimi. Latae spinosi  
rigidi glabri folia subsessilis latera latus et ramuli  
basi acuta glabra obtusa cum mucrone utraque  
glabra venulosa subtus pallida pollicaria et ultra  
supra nitidiuscula. F.

an Pyrus sylvestris Cretica ~~Bank. p. 439~~ Tournef. Cor pag. 43  
a Pyra sylvestria cretica Bank. p. 439

Flores non vidi.

trifoliata. P. folus Vernati

Habitat in Arabia

Taxis Hedysari. Rami angulati incani folia petiolata  
versus foliola elliptica utraque acuta glabra integri-  
ma tripolliciana juniora plicata mucronata. Petioli  
longitudine foliolorum - stipula canaliculata

non videtur huius generis flores non vidi.

hybrida Pines foliis subter Lanaticis: pinna extrema maxima  
floribus corymbosis Moench Weiff. pag. 90. tab. 6.

non vid.