

Rajania

1. hastata R. foliis ^{lanceolatis} lineari hastatis cordatis
2. angustifolia R. foliis linear-lanceolatis basi obtusatis
3. ovata R. foliis ovatis acuminatis tri-nerviis
4. cordata R. foliis cordatis septem-nerviis
5. quinquefolia R. foliis quinatis ovato-oblongis, floribus racemosis
6. quinata R. foliis quinatis ovatis emarginatis, floribus umbellatis
7. hexaphylla R. foliis ^{trius} pinnatis oblongis acutis, floribus racemosis.

2

angustifolia R. foliis lineari lanceolatis basi rotundatis lvs. prodr.
pag. 59.

Habitat in Hispaniola

non vidi

3 ovata R. foliis ovatis acuminatis trinerviis Sw. prodr. pag. 59.

Habitat in Hispaniola

non vidi

cordata R. foliis cordatis Septemnerius Lin Spei: pl. pag. 14624

S. V

San-Paya scandens, folio Yamni Plum. gen. 33. n. 155. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

Rami teretes glabri. Folia petiolata, alterna ^{tenuata} acuminata
integerrima utrinque glabra, palmata, venis reticulata
Racemi elongati pedicelli saepe gemini alter flos masculinus
fructus pollicari compressis apice altero latere obliqua stolon
d' alius ferrugineo flavescens nitida.

5- quinquefolia R. foliis quinis ovato-oblongis Lin. Spei. pl. pag. 1462 & 1. v
pag.

San Raza scandens quinquefolia Plum. gen. 33. id 155
fig. 2.

Habitat in America

Folia ad singula genicula quina, ovato-lanceolata obtusius-
cula, petiolata. Racemi ex medio inter nodorum
non ex axillis.

floribus racemosis

6 quinata R. foliis quinatis: foliolis emarginatis, floribus umbellatis
axillaribus Thunb. fl. jap. pag. 148 + S.V. p. 800

Habitat in Japonia.

Caulis volubilis glaber ramiflorus. Folia ex axillis plura, petio-
cata, glabra. ^{petioli bipollicares} foliola umbellata petiolata ovata, emargi-
nata cum acumine, integra pollicaria. Flores ex eadem
gemma cum foliis, ^{umbellati} pedicelli longitudine petalorum pedicelli
ungueulares.

7. Hexaphylla R. foliifera: folioli oblongis acutis, floribus racemosis Thunb fl-jap
p. 1497 S.V. p. 888

Habitat in Japonia

Caule scandens striatis glaber, teres. Folia alterna petiolata
glabra. foliola petiolata, integra, venosa, subtus pallida
bipollicaria. Petioli apice uncinati, palmares: partiales
semipollicares. racemi axillares