

Observat. Synon. <sup>Linnae</sup> Ranunculi  
bellati in spec. plantarum  
emonea et corrigenda

## Ranunculus

- + *parviflorus* R. foliis radicalibus quinquefido lobatis subnatis, caulibus sesquipedibus  
multifidis caule unifloro. (in Vertica diversione ponenda)
- + *monopetalus* R. foliis tripartitis emnatis, caule simplici villosis subnatis unifloro
- + *pelosus* R. foliis ternatis trifidis incis, caule simplici subaphyllo peloso
- + *riularis* R. foliis ternatis glabris, folioli cuneiformibus incis, caule  
natisa natanti septanti, petalis lanceolatis
- + *columna* R. foliis ternatis incis trifidis s. 4fidis, caule ramoso pedunculato  
tomentoso
- + *roskalinus* foliis ternatis incis cauleque ramoso peloso
- + *tomentosus* R. foliis ternatis villosis, caulibus trifidis caule villosis  
tomentoso multifloro
- + *bulbosus* R. foliis ternatis foliolis subpinnatifidis, caule multifloro  
calycibus reflexis, radice tuberosa
- + *philonotis* R.
- + *repens* R. foliis duplicato ternatis, stolonibus repentibus calycibus
- + *minor* R. <sup>Natalis</sup> foliis ternatis incis cauleque diffusis ramoso peloso, seminibus  
munitis

- + polyanthemus R. foliis perquepartitis. Inflores. floralibus lineariibus 3-5 partitis  
 lineariibus caule erecto, calycibus patulis  
 + acris R. foliis ternatis tripartitis summis lineariibus calycibus pa-  
 sulis  
 + lanuginosus R. foliis tripartitis crenatis villosis, caule petiolisque hirsutis  
 inter ad. chorophyllos R. foliis compositis lineariibus multifidis caule erecto uni-  
 + floro, calycibus reflexis  
 + millefolius R. foliis supra decompositis caulibus lineariibus, caule ramosis  
 hirsuto villosis, calycibus pilosis  
 + arvensis R. foliis superioribus decompositis lineariibus feminebus  
 aculeatis  
 + parviflorus R. foliis 3 f. lobatis supremis indivisis acutis hirsutis, caule  
 inter ad. suffuso, feminebus mucronatis  
 + orientalis R. foliis multifidis, calycibus reflexis, feminebus pino-  
 fo-subulatis recurvis  
 + grandiflorus R. foliis multifidis caulibus alternis oppositis geminis,  
 caule erecto bifolio  
 + falcatus R. foliis filiformi ramosis, scapo nudo unifloro, feminebus  
 falcatis



Dicotyles R. foliis ternatis cauleque dicotome ramosi  
\* aquatilis R. foliis emersis peltatis, submersis capillatibus ramosis

+ polyanthemos A. foliis quibusdam...

Ranunculus

183 omnes species tam quoad ad differentiationem quam quoad omnem ad huc emendationem  
 egent. ~~ad separationem ab aliis~~ sequendo divisi quod hic infra invenitur

Obf. Divisio Ranunculeorum a foliis petenda, hinc Divisi: 1) foliis integris 2) foliis lobatis  
 3) foliis radicalibus divisi per se de se peti, et 4) foliis radicalibus compositis. Cum foliis  
 pet. Dicit quod folia radicalia alia composita alia integra ad istam divi. ponem omnia  
 ubi folia omnia radicalia simplicia sunt ad 4<sup>am</sup> verout simul simplicia et composita  
 videntur



Filiformis Ranunculus

Habitat in Canada Herb. Nut.

Caulis repens, filiformis, glabrus. Sola ad nodos aggregata, 2-3. Lineari  
glabra, unguiculata. Pedunculi folio duplo longiores, uniflori. Flores  
parvi. Petala flava, cuneata. Semina lassa, subglobosa, glabra.

*Hesperis matronalis*

Habitat in America boreali herb. Nut.

Caulis petiolis, folia subtus et calycis hirti. Odor radicalis, longe petiolata, unicam in caule superne, tripartitum: lacinae lanceolatae, integerrimae, unicum sub ramis pedunculi lanceolatum, indivisum: radicalia ternata, <sup>ta</sup> vix pollicina intermedium apice dentibus paucis serratum, ovatum, trifidum: lateralibus bifida, basi integerrima, apice dentibus paucis serrata. Corolla flava



*Panniculus*

Habitat in insula Bourbonia herb. frug.  
Caules diffusi, uti tota planta glabri. Folia longe petiolata, subrotundo  
cordata, trifida, incisae et dentata: dentibus obtusi. Petioli basi utraque  
membrana dilatati. Pedunculi solitarii uniflori, folio breviores. Semina  
oblonga, rostrata mucronata.

~~Ranunculus~~

Ranunculus foliosus Oenanthe Tournay.

~~Habitat Sen. Prof.~~



Ranunculus folia radicalia cordata subrotunda crenata caulina tri  
5 quefida lacinis linearibus

Habitat in Pene <sup>huc</sup> Tuscia

Calici basi setosus. Folia radicalia longe petiolata, semipollicana,  
crasfusiola, arcuata, glabra, squaliter crenata. Caulina 3-5 pda  
petiolofusiola. Caulis erectus, superne in pedunculos diviso, striatus  
glaber. Pedunculi longi, villosi, inani. Calyx pili flavis, hirsutus.  
prope abortivum. Confer cum mucronato Erum. plant.

Ranunculus

Ranunculus lusitanicus hederis terrestri folio grumosa radice Tournef.

9. N. 44

an Ranunculus latifolius radice grumosa oblonga major. Gristley. viid  
Luf.

Habitat Olyssiponi herb. Lus.

Radices plures, fasciculati, oblongi. Folia radicalia, cordata, sub  
rotunda, sublobata, interdum trifida: lobi obtusi 3-4 dentata, villosa,  
unguiculati. Pedunculi pelosi. Caulis erectus, superne in pedun-  
culos diviso, paucos, mucosus, striatus, subaphyllus, fruticulosus.

Folia caulina trifida integreque linearia. Calyx pelosus, ovatus.  
Desit certe inter plantas a me in Barbaria Lactar vel Lusitania  
Dr Schousboe



epiplotus Ranunculus foliis inferioribus quinque partibus superioribus tripartitis.

Habitat in stagnantibus, vulgo per Brachia Bonano Commes. herb. 4. usq.

Caulis erectus, pedalis, glaber, basi crassitie fere pennis cygnes, ramosis. Lolia cordata, subrotunda, radice alia pollicaria, laciniis oblongis, incisae, obtusae, superiorum linearis, incisae, serratae, suprema linearis indecymma. Flores parvi, albo sub incarnati. Semina globosa, obtusa, subglobosa, loricata. Radice Ranunculi f. elevari.

Canutus Ranunculus<sup>7</sup>

Habitat in Syria herb Desfont.

Radix bulbi longi, fasciculati. Caulis erectus, spithameus, lanatus, subbiflorus, simplex. Folia radicalia alia obovata, parva trifida. lacini serrato; alia parva majora, tripartita, lacini subbifido; alia uti caulina bipinnata: pinnis linearibus, incisae: caulina 2. remota, laciniis angustioribus, omnia villosa subtomentosa incana. Flores magni. Calyx villosus, reflexus.



*Pronunculus*

Habitat Constantinopoli Herb. Desfont.

Bulbi plures, fasciculati. Caulis erecti, semipedales, subramosi, villosi-subcanescentes.

Folia petiolata, ternata <sup>radicalia</sup> ~~radicalia~~ foliolo inter medio trifido, lateralibus bifidis laciniis

3-2. profunda utatis, oblongis, obtusis: caulicis oblonga, angustulana, interme

dio parum longior, integerrima, obtusiuscula, basi attenuata; florum simpliciu. Flores magni. Calycis reflexi

*Pranunculus*

*Pranunculus lanuginosus* Walther:

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Caulis erectus, villosus, subimplex. Folium petiolata, impariteta: lobi laterales bifidi, in  
superioribus indivisi: lobi ovati, acuti, obtuse serrati, serraturis mucronatis, utraque  
villosa, subtus pallidiora, sesqui polliciana. Petioli folio duplo longioris, villosi pro  
sertum apice. Semina levia, mucrone reflexo hamata



alpinus Ranunculus

Ranunculus alpinus fumans folio Tournef. Inp. R. L.

Habitat in pyrenaeis herb. fust.

Folia radicalia longe petiolata, pennata: pinna pennatifida; lacinae subulatae  
vellosae. Scapus foliis altior, vellosus, apice incurvus, uniflorus; basi sublonge  
fur

Ranunculus

Ranunculus orientalis, Dulci, Donnici radice Tournef. Cor. pag. 20.

Habitat in Cappadocia herb. Tournef.

Colica cordato-subrotunda, trifida: radice alia petiolata

habes



Ranunculus

Ranunculus orientalis, napellifolius, flore luteo, magno Tournef. Cor. pag.

20  
Habitat in Cappadocia herb. Tournef.

Solia radice alia ternata, multifida, caulina tripartita.

habes

recurvatus Ranunculus

Habitat prope New York.

Caulis pilosus. Folia caulina petiolata, profunde trifida, peltata; lobi obtusati, intermedio subulato, obtuse serrato, serraturis mucronis terminatis; lobis lateribus subbifidis, extrorsum serratis, supra glabra, subtus venis villosi. Pedunculi superiores, breves, subramosi. Flores parvi, pilosi. Calycis foliola lanceolata, reflexa. Styli reflexi humosi.



*paludifus Ramunculus*

Habitat in Africa boreali herb. de Martini

Caulis erectus, semipedalis, ramosus, vellis adpressis, subanescenti. Solum  
radice ovata, obtusa, basi integerrima, extrorsum obtuse serrata, aliter  
nata foliis trifidis; laciniis linearibus lateralibus bifidis, superiora triparti-  
ta, integerrima, summo linear-lanceolata, villosa, prostrata subtus. Radun-  
culi uni flori, canescentes. Calyx patens, canescens.

Parent

pyrenous Ranunculus

gouan

Habitat in Pyrenois herb. Desfont. Mus.

Radix crassa. Caulis palmari, uti petioli villis longis densis spinis sublanatis, sub  
ramosus. Folia radicalia cordata, quinque fida. Lacinis serratis, villosis. Cau-  
lina sessilia lacinis lanceolatis subserratis in supremis integerrimis. Calyx  
pilosus. Corolla magnitudine fere Trilli europ.



*Promorpha Ranunculoides*

*Ranunculoides orientalis* Dulcis *Downii* radice *Tournef.* Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Radix promorpha, emittens ramos plures attenuatos, bi-*f.* tri-pollicares.

Folia radicalia longe petiolata, trifida; lobi acute dentato-incisi, corda-  
to-subrotunda, pollicaria, venosa, aculo armato pilis adpressis raris. Cauli-

na duo, inferum petiolatum, statura radicalium; suprema tripar-  
dita: lobi ovati, acuti, integerrimis. Pedunculi gemini. Caulis semi-

pedalis, striatus, pilosus. Pedunculi absque spinis, unicani. Semina glabra, sub-  
rotunda, mucronata.

Ranunculus

Ranunculus phoeniceus myconi Daleham p 1036.

Ranunculus montanus nec voss arundinaceus cuspidato folio e usque  
herb. Vaillant.

Habitat herb Mus.

Caulis basi tereti setis, strigulosus, vel minor, simplicissimus, vel divisis in  
pedunculis 2. 3. Pedunculi apice lanuginosi. Mango petalorum et folia  
inferne vellis rarisemis. Calyx glabris. Semina globosa, glabra



*Ranunculus*

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis teres, striatus, villosus. Folia radicalia tripartita, trifida, 3-4 dentata  
in ipsa lobi basi angustati, subrotunda, pollicaria, utrinque pilis raris  
adpersa. Petioli bi- & tri-pollicares, villosi & superne oppositi, tripartita:  
laciniis trifidis, tridentatis, lateralibus integris vel bidentatis sesquipolli-  
cariis; supreme lanceolata. Pedunculi inferne villosi, apice intarsi  
Calyx villosus, non reflexus. Flores maximi  
a grandi-flores d. ferre videtur.

*Pranunculus*

Habitat in locis salisugineis ad Teniscam herb. Musf.

Radix radicalis, oblongo-subrotunda, longe petiolata, unguiculata, apice 4-5 foliis,  
lobi rotundati, glabra, nervosa, arenia. Stolones repentes, glabri. Scapi  
erecti, digitales, superne divisi, in peduncululos 2-3. glabri, striati. Flores  
parvi. Petala plura, oblonga.  
Prope fucanam collocanda.



Ranunculus

Ranunculus nov. Comment. Petrop. XVIII.

Habitatio: Sibiriæ herb Mus.

Caulis erectus, herbaceus, simplex, palmatis vel paucis utra. Solia radicalia longe petio-  
lata, vix semipollicaria, subrotunda, glaberrima, arena, enervia, basi integerrima,  
exteriorum dentato-incisa; dentibus oblongis obtusi: caulina gemina, alterna, semi-  
amplexicaulia, radicalibus paucis minoribus, 5-fida; laciniis lanceolatis. Petioli 1-2  
pollicares, glabri. Pedunculus terminalis, indivisus, apice villis raris ferrugineis.  
Calycis foliola oblonga, obtusa, exteriorum semineo villosa tomentosa. Petala paucis emar-  
ginata.

*ophioglossifolius* Ranunculus

Ranunculus lesbius palustris ophioglossifolius Tournet. Cor.

Habitat in insula Lesbo herb. Mus.

Caulis plures, erecti, glabri, striati, pedales, supremi in pedunculos plures divisi.  
Folia petiolata, inferiora ovata, sequentia oblonga, <sup>sub</sup>suprema sessilia lanceolata, om-  
nia remote serrata, floralia linearia integerrima linearia. Flores parvi

habes



Ranunculus

Ranunculus Lusitanicus grumosa radice, foliis hederae Vestris Tournef.  
Inst. R. H. 206

Habitat in Lusitania herb. Mus.

Radix fasciculata. Folia radicalia veni fermea, subrotunda, crassa, venosa,  
glabra, inciso crenata. Scapus fere spithameus, pilosus, inaequalis; folio superiore  
indiviso lineari, seminequivalari. Calyx extus pilosus.  
eadem forte ac praeterea Desfontaine.

*Ranunculus*

*Ranunculus* *leucis* *pulsatilla* folio flore magno Tournef. Por.

Habitat in oriente herb. Hoffm.

Radix bulbis pluribus, oblongis, fasciculatis, semipellis carnis. Caulis erectus, panicum  
ramosus, palmatis, pilosus, canescens. Sola bipinnata, longa petiolata: pinna  
tenuare, unguicularis. Calyx recurvus, pilosus. Semina subulata, recurva  
an orientalis? confer cum *Chorophyllo*



29 nivalis R. calycis hispido, caule unifloro, foliis radicalibus palmatis caulinis  
multipartitis sessilibus fl. Capp. 232. t. 3. fig. 2. Gaertn. fl. austr. 2. t. 325. 326

Ranunculus minimus alpinus. Catew. Bauh. hist. 3. pag. 161. Fergana  
interos.

B. Ranunculus. idem pygmaeus fl. Capp. 232. t. 3. fig. 3.

Habitat in alpinis Lapponia, Helvetia &

Radix tuberosa fusiformis. Caulis simplex erectus interdum palmari  
glaber stratus. Folium radicale 1. 2. petiolatum quinquefidum  
lobis oblongis integerrimis glabris. caulinum unicum rarius duo  
opposita, sessile tri vel quadrifidum laciniis oblongis integerr  
mi. Pedunculus terminalis uniflorus pilosus. Foliole calycis  
ovata concava extra si vellea nigri adpressa.

Specimen a Desfont. habui

in herb. Mus. vidi cum sequente synonym.

Ranunculus montanus purpureus calycis villosis foliis Platanis G. Bauh.  
append. 162. sed false pertinet enim ad R. glaciale

Caeni Ran. foliis radicalibus, cuneiformibus, caenis apice a multifido, caulibus  
semioimpletis caulibus latemiatis, summi sespites linearibus, caule lasso  
modo Bellardi app. ad fl. ped. pag. 27. Tab. 6.

Ranunculus foliis plantagineis caeni furcatisque Hall. herb. fr.  
2. pag. 70. var. 6. Vill. flor. de lph. 3. p. 733 var. 6

Habitat in alpebus 4

Caulis semipedalis teres, ramosus. Folia radicalia 2-3. petiolata  
caulina subsessilia. Petala albisima

non rudi



*japonicus*

*tomentosus*



herpetus

308 Ophalei R. Folis ternatis in basi cauleque ramoso piloso  
Habitat in arabia  
Folia suprema multifida bipinn



34 <sup>monpelicæus</sup>  
~~benfysanicus~~ R. foliis tripartitis crenatis, caule simpliciter villosis subnu-

do unifloro. Lin. S. V

Praenuntulus fatatilis magnifloræ Bauh. pin. 1000. 96. pin.

102.

Habitat Monpelii

Planta mea in Babana lecta palmanifolia grū  
mofa. folia radicata tripartita crenatifida lobis dentato  
subinif. Scapus uniflorus

27 nitosolius R. foliis supraecompositis, caule simplicissimo unifolio unifloro, radice  
tuberosa Lin. S. L. Jacq. coll. 1. p. 106. Tab. 6. 7.

Ranunculus prostratus nitosolius Planch. herb. 1. pag. 232.

Ranunculus nitosolius foliis flore suave rubente Bauh. pin. 1. Pl. Monf.  
her. 2. p. 44. D. f. 4. t. 31. fig. 54.

Habitat in alpebus Austriae, Delphinatus &

Planta crystallina tota glabra cauli simplicissimo erecto. Folia  
radicalia supraecomposita, 1. 2 in caule terminatum folioli lutesca  
lobis bipartitis intermedio tripartito lobis subtus fidei. Corolla  
alba



*risulans*

philonoti




minor R

Column



*mlouei*



20 aconitifolius  
Glycyrris R

Folius omnibus quinatis lanceolatis inciso serratis L. h. V.  
p. v. p. 5164

Ranunculus albus folio denso Bauh. hist. 3. p. 844

Ranunculus montanus aconitifolio, albus flore major Bauh. pin. 102.

IV. Ranunculus montanus 4tus. Clus. hist. 1. p. 236.

Ranunculus montanus aconitifolio, albus flore minor Bauh. pin. 102.

V. Ranunculus pleno flore albo Clus. hist. 1. p. 236

Ranunculus folio aconiti, flore albo multiplici Bauh. pin. 179.

Habitat in alpidibus helveticis austriacis, Pyrenois &  
glaber caulis fructu pediculis, erectis. Folia petiolata profun-  
de serrata, foliola lanceolata ovata. Pedunculi  
ramosi. Calyxes pelosissimi



multifidus R. Folis multifidis inferioribus pinnatis caule multifloro  
calyce corollam aequante Hoffm. Descrip. pag. 102

michi ignotus

Fomentosul



46. *Chorophyllum* R. Calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto unifloro:  
foliis compositis linearibus multifidis Lin. L. V.

*Ranunculus gemosa* radice, folio ranunculi bulbosi Bauh. prod. 96

Pin. 101.

*Ranunculus chorophyllum*, apphodeli radice Bauh. pin. 101. Barr. ic.

habeo  
libra herb. Tournefort 501.

*Ranunculus montanus leptophyllum*, apphodeli radice Col. siph. 1

p. 312. 4. 311.

Habitat in Gallia, Italia. Barbaria

Caulis erectus pedalis, villosus, superne in pedunculos dispersus

Folies petiolatae, fimbriatae radicalia subternata foliolis

a Thourno habui  
Planta vix palmari bif. tripartita lobis bif. trifidis lineari lanceolatis acutis  
radice tuberosa, caule caulinum fere 1.2. minus dispersum. floralia lanceolata  
subaphyllo nisi unicum  
setaceum in medio  
Fca nervosa villosa. Calycis foliola ovata nervosa  
acuminata subpraeae extus

*Ranunculus saxatilis apifolius* minor radice tuberosa, petiula  
obducta Boerh. mus. 12 p. 162.

*Ranunculus radice tuberosa striulata* Boerh. mus. 4. 124

non radi

verte

Radices fasciculati. Caulis pedalis, subramosus, teres villosus/pum. Solum  
plurimum radicalium, caulibus 1-2 pennatis: penna multiplex & villosa.  
Pedunculati longi, uniflori. Receptaculum oblongum. Semina subula  
ta, recurva.



3556 Millefoliatus Ranunculus Ranunculus foliis <sup>superioribus</sup> decompositis lacini linearibus caule calycibus  
pelosis caule ramoso sericeo villos. Tab.

In Cultis circa promontorium Carthagenis Tuncti 4

Radix gnomofo bulbis oblongis fasciculatis

Caulis erectus, semipedalis, ~~ram~~ teres, pilis albis densis sericeis prostratis  
superne testus, ramofui ramo utro alterove, fructura Caulis

Folia plurima radicalia, dostrantalia, caulina 2 vel tres respu  
vadium sub ramis, omnia supra decomposita, tripinnata,  
pinnis lacinae 3 vel 5 fidi, laciniis linearibus, angustis, acutis,  
brevibus

Pedunculis ex apice ramorum vel caulis terminalibus, solitariis,  
us, unifloris, aphyllis, paucis.

Foliola Calycina lanciolata, pelosa, colorata, patentia. petalis.  
Petala flava, magnitudine fere R. illyncii, calyce dimidio longiora

52 orientalis R. Seminibus pinnatis-subulatis recurvis, calycibus reflexis, foliis  
multifidis Cn. L. V.

Habitat in oriente. herb. Tur.

Ranunculus foliis cerasanthi her. Tur. orientalis patulus affinis  
deli radice staphylini foliis, flore stellato seminibus uncinatis  
Radices tuberosa oblonga. Folia bipinnata: foliola 3-4 pida. Pedun-  
culi vellosi incani, uti caulis. Caulis superne ramosus. Calycis  
foliola ovata, acuta extus tomentosa herb. Tur.

non vidi



53. grandiflorus R. caule erecto bifolio, foliis multifidis: caulinis alternis sesquipedibus  
Linn. l. v.

Ranunculus orientalis, aconitifolio, flore maximo Tournef. cor. 22

Habitat in oriente & hest. Koenig

Folia radicalia reniformi rotundata 5 fida: laciniis unis  
to glabra: caulina sesquipedibus, 5 que fida laciniis pinnatis radicalium  
basi angustata. Flor. magnitudine Ranunculi elyrici. Caulis  
canescenti simpliciter. Pedunculus elongatus uniflorus.

54 falcatus R. foliis filiformi ramosis, scapo nudo unifloro seminibus falcatis  
to in l. v. Fœqu. fl. austr. 1. t. 40.

Melampyrum luteum minimum Baub. pin 234.

Ranunculus alopecuroides, apuga foliis Boiss. ju 20. t. 14. fig. 3.

Ranunculus ceratoccephalus, seminibus falcatis in speciem adactis  
Monf. hist. 2. p. 446. f. 4. t. 20. fig. 22.

Habitat interjectis Europa australi et orientis B

Planta spontanea vix digitalis sola tomentosa, culta glabrior  
Sola petiolo scapus foliis dimidio altior, receptaculum  
elongatum

Boiss. t. 14. fig. 3.



9. *bellatus* R. foliis ovatis serratis, scapo nudo unifloro Lin. l. v

*Ranunculus grumoso* radice 1. Claf. hist. 1. p. 230.

*Ranunculus lusitanicus* Dod. pempt. 429.

*Ranunculus latifolius bellatus*, aphroditi radice Bauh. pin. 101.

N. *Ranunculus lusitanicus*, folio subrotundo, parvo flore Tournef. & R.

H. 206

*Ranunculus latifolius bellatus* autumnalis, flore plenus et prolixo  
Monf. hist. 2. p. 447. f. 4. t. 31. fig. 49. 50. 51.

Habitat in Lusitania, Creta &

Radix fasciculata superne a petalio perispermatis, lobis  
foliis petiolate ovata f. ovalia crenato serratis, ceterum  
petioli via com non nulla in tegemina. Tunica pelosissima adaltera  
gibudine foliorum glabrora squipalliana obtusissima. Scapus erectus  
simplicissimus perthamocis pelosus inde uniflorus  
petala plura

aphyllo peloso unifl.

6 pyrenensis R. foliis linearibus indivisis, caule erecto striato subbifloro, radice  
bulboso Mart. 240. V. pag. 515

Pranunculus pumilus, gramineis foliis Bauh. Hist. 3. p. 250

~~Pranunculus, gramineo folio, bulbosus Bauh. pin. 101.~~

~~β. Pranunculus montanus, folio gramineo multiplex Bauh. pin. 100~~

~~V. Pranunculus montanus, folio gramineo multiplex Bauh. pin. 101.~~

~~Habitat in Gallia praesens & pyrenensis &~~

Radix fetis e petiolo foliorum praesentis anni legitur. Caulis  
dexterior simplex glaber. Veris striatus, superiore in pedunculo  
binis indivisus, folium <sup>linearis canicollatum</sup> sub pedunculo inferiore cotinum apophyllo  
pedunculi <sup>subulato</sup> proferitur superne uniflori. Solia utrum  
que attenuata vix pilosa integerrima altitudine per caulis  
basi in membranam dilatati.

Pranunculus plantagineus All. fl. pedem. ta 14 45. Tab. 76. fig.  
1. figura secundum specimen cultum forte minus enim magnus est

subaphyllo

Canicollato linearibus caule erecto subbifloro pe  
dunculi herpatis, radice bulboso



19 *Micranthus* R. foliis inferioribus quibusdam superioribus tripartitis <sup>Aeneantibus</sup> caule glabro multi  
floro

Habitat in Bosana

Caules debiles erectus striatus glaber, superne in ramos floriferos  
divisus.

Folia longe petiolata: <sup>nolligana</sup> inferiora <sup>laxi acuti v. fidei.</sup> glabra, laciniis linearibus <sup>Cateralibus sensum</sup>  
<sup>magis</sup> parum lateralibus apicem versus utrinque bifidatis, incipi <sup>et horum</sup> lobis latera  
libus latere exteriori <sup>superioribus</sup> obtuse <sup>tripartitis</sup> serrata: superiora <sup>laxi</sup> latiniis  
Aeneantibus lateralibus patentibus <sup>laxi</sup> latere exteriori bifida  
vel serrata <sup>et</sup> una altera interdum uti intermedio versus  
apicem serratura utrinque unica floralia ultima serrata  
angusta unguiculata integerrima uti reliqua obtusa.  
Flores parvi vix magnitudine R. sibirici calyx glaber

24 herpatus R. foliis ternatis incis. cauleque ramofo herpato spino

Habitat in Ampela Boboni

Caulis erectus sessile pedalis, uti tota planta pilis copiosis spinis  
griseis vestis superne in ramis floriferis densis.

Folia petiolata radicalia majora flouliu minoru & vix par

ata laciniis lineariis divi <sup>indivisi</sup> inferioribus subincisi supremis  
indivisi, <sup>solitarii</sup> inferiora, et radicalia <sup>multoties</sup> <sup>vici</sup> bi. f. tripar

ata laciniis bi. f. trifidis laciniis serrato-incis

Calyx pilosi usculus



36. *nicotiana* R. foliis ternatis glabris foliis lanceiformibus incis, caule natanti  
repanti, petalis lanceolatis remotis  
Habitat in nova zelandia  
Planta tenera glabra

*Tranum* ead. em. forte e feto magellanico

Bellator A.



pilosus R. foliis ternatis trifidis incisis, caule simplicia subaphyllo piloso.  
 Habitat ad fretum magellanicum pilosa  
 folia radicalia longe petiolata, ternata. foliola <sup>pollicaria vel rannumetra</sup> lateralibus bifida in  
 tripartita trifida laciniis linearibus lanceolatis biternum bif. trifi-

di  
 Petiolarum 5 pollicares. Anathus pilosus  
 Caput erectum foliis dimidio altior Anathus pilosus superne divisis  
 in 2 f. 3. folium tripartitum sub pedunculo inferiore. Pedunculis  
 indivisi & pilis conferti cinerascetes.  
 Calycis foliola ovata pilosissima.  
 Corolla flava

37 saxatilis R. foliis radicalibus petiolatis spedo lobatis subincis, caulinis sessilibus  
multifidis caule unifloro

Ranunculus saxatilis magno flore Bauh. prodr. 96.

Ranunculus subhirsutus, caule subunifloro, foliis radicalibus palmatis, caulinis  
multipartitis sessilibus Crantz fasc. 2. p. 92. Tab. 4. fig. 4. ed. 2. p. 118.

Ranunculus caule unifloro, foliis glabris reniformibus semperque  
lobis Hall. hist. 2. n. 1160.

Ranunculus nivalis all. fl. Ped. n. 1454

Fasc. 4. fl. Austr. Tab. 325

Habitat in pratis et pasuis Alpeum Helvetiae Austriae et Sabae

Eric 24

Planta palmaris. Caulis simplicissimus erectus pilosus interdum fer  
hirsutus. Folii radicalia reniformia subrotundo reniformia lobis  
cuneatis apice 4 ad septem dentato-incisi, venosa non pilosa  
Caulina duo vel terna superne, distantia semiamplexicau  
lea inferius plures fusum laciniis lanceolatis integris vel  
trifidis laciniis superiorum integerrime subtus pilosus  
flos terminalis magnus. Calyx pilosus

Synon. Bauh. ad montpelusium referitur

Ranunc

Diversa certe et mihi videtur a nivali Lin



56 Dichotomis. R. foliis linearibus. Ternati dichotomis caule dichotomo  
Habitat in Insula Garsel Indio orientali  
affinis maxime Ranunculo aquatili at folia multo  
longiora. Cae palmaria et ultra et latera ~~basim~~ mediana  
petioli dilatata ~~brevis caule~~ ~~super~~ singula semel vel  
bis diversa interdum opposita. Caulis crassitie pereno  
cygneo. Pedunculi oppositi folii vel terminales  
uniflori

42 minor R. foliis ternatis incisif. caule diffuso ramoso pilosif. seminibus  
munitati

Habitat in rupibus inque <sup>apud</sup> Piedemontano

Affinis <sup>R.</sup> repenti caulis pluri stratis pilosif. pilis patentibus pitha  
moi. foliola cuneata <sup>renuncularia</sup> apice <sup>3.</sup> vel 4. 5. incisif. obtusa.  
floralia linearis lanceolata integra peduncululi laterales  
et terminales. Semina compressa marginata mucronata  
dorso punctis elevatis

Ranunculus arvensis parvus folio trifido Bauh. pin. 174

Ranunculus minimus apulicus Col. Ephr.

~~Ranunculus parvulus All. fl. pedem.~~ Delcanto fuit in auct.

Celeb. vni



34 Tomentosus R. foliis ternatis villosi caulibus terpedi. caule villosi tomento  
fol. multifloro

Habitat in Europa australi

Radix fasciculata. Radix villosa canis. foliis uncinis in sub  
laciniis linearibus laciniatis apice intermediis subtrifido floralia  
indivisa. folia radicalia petiolata villosa in primis pet  
tus pet foliola uncinata apice aliquoties uncinata

37 Columno Pi. foliis ~~ternatis inciso~~ <sup>ternatis inciso</sup> ~~trifido~~ <sup>trifido</sup> caule ramofo pedunculis  
tomentosi

Ranunculus albus saxatilis aphrodeli radice Col. cap. 140  
Ranunculus alpinus apii folio, flore albo magno Pont. Comp.  
117. Sequ. fl. Ser. 1. p. 490. t. 12. fig. 2. 3.

Ranunculus sequieri foliis orbiculatis multifidis,  
caule prostrato ad gemmula nodoso Vill. prosp. p. 50  
Tab. 32.

Ranunculus Columno All. fl. peden. 1453. Tab. 67. fig.

34  
Habitat in locis lapidosis Italiae &  
Caulis <sup>pauciman</sup> fractus glaber. Foliis longe petiolata ~~ret~~  
~~profunda 3 fissis partita & fere ternata~~ laciniis lateralibus  
bifidis interna lobo inferiore uti lacinia intermedia fere  
tridentata, puli rarissimi <sup>longis</sup> & fere nuda. Pedunculi  
elongati crispis fere petalorum sub flore canato sub  
tomentosi. Calycis glabri

Ranunculus columno foliis palmato-quinquepartitis, laciniis cunei  
formibus pennatifido trifido, quinquefidisque; caule tereti  
velloso ramofo; pedunculi uniflori radice aphrodeli  
fibrosa Wulf. in coll. Haerh. p. 345 &

petoli super  
en latentes.

Ranunc



stellatus Ranunculus foliis quinquelobis, lobis integerrimis, lobis peltatis  
Stipulis membranaceis

habitat in Bonaria

caulis prostratus? ~~non~~ articulatissimus, articulis glabri medio vix

crassioribus striatis bipollicares

articulis superioribus  
velutis incanis

Folia petiolata, opposita, subrotunda latiora quam longa  
stipulae glabra subtus pilis stellatis, pollicaria, 5 lobata lobis oblongis

folia juniora  
etiam supra pilis  
stellatis sed vix  
puberula incana

gemmae apice distantibus lateralibus minoribus vix  
gemmae interdum lobulo unico vel utraque acuto.

Petiolus folio duplo longior

Stipulae hyalinae membranaceae lacerae minutae

Florae axillares pedunculo lineari brevissimo solitario gemmae florum  
germina globosa

Species - *Stipula*

Dicotyles Ranunculus Caule ~~dicotomo~~, <sup>multipartito</sup> foliis ~~ter bipartitis~~ filiformibus  
pedunculo terminali <sup>et caeruleo</sup> uniflora  
hab in tr. de la garé.

Planta absque dubio aquatica affinis aquatili  
cauli dicotomo, articulatus, articulis verticibus, glabris, striatis  
sensim <sup>prope</sup> apicem <sup>multipartitis</sup> crispiora. bi s. 3 pollicares  
altissimi folia ~~tripartita~~ <sup>multipartita</sup> articulis longioribus, laciniis  
filiformibus linearibus bi vel ter trifidis laciniis bipartitis  
glabris, planis.

Petiolus membranaceus brevissimus amplexu caulis  
pedunculus terminalis <sup>et caeruleus</sup> solitarius uniflorus, bipollicaris

Structura caulis

Calycis foliola oblonga glabra petalis triplo breviora  
Corolla petalis integerrimis magnitudine aequali



cod. foliis Ranunculus foliis petiolatis serratis inferioribus ovatis, superioribus  
lanceolatis, caule multifloro

Habitatio Romana?

Caulis <sup>herbaceus,</sup> erectus, striatus, <sup>et</sup> ~~in~~ tota planta glaber, ramosus, <sup>et</sup> ~~in~~ <sup>ovata</sup> ~~per~~ <sup>basi</sup> ~~transversa~~

Folia inferiora longe petiolata, unguiculata, obtuse serrata  
tenuesque nervoso-venosae, obtusifolia: suprema linearibus

Petiolus foliorum infer  
iorum, utrinque attenuata.

Petiolus folii triplo longior, inferne utrinque membr. dilatatae  
membranaceae, complexi caulis

Pedunculus superne, filiformis, uniflorus. Siliqua parva

Germina oblonga, glabra, q' terra.

Antennarium

thorianum.

Habitat in Insula s. Thomae 3

Rami articulati glabri. apice dilatati; Tetragoni a lineis duobus utrinque spinis decurrentibus aculei gemini utroque verti longitudine petali.

Folia petiolata, opposita, ovata bipollicaria, acuta, integerrima glaberrima, nervosa venosa, nervi marginem ~~haud a~~ in versus marginem in vena longitudinali undulata desinentibus.

Petiolus brevissimus. Ramuli floriferi compresso angulati. Peduncululi axillares et terminales plures oppositi, uniflori semisanguiculares,

Calyx glaber