

# Ranunculus

\* foliis simplicibus

1. flammula R. foliis infimis ovato-lanceolatis superioribus lineari-lanceolatis caule declinato, floribus pedunculatis
2. reptans R. foliis lineari-bus caule repente floribus pedunculatis
3. nod. florus R. foliis petiolatis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis floribus sessilibus.
4. lingua R. foliis lanceolatis, caule erecto simplicibus piloso.
5. gramineus R. foliis lanceolatis, caule erecto, peraphyllo simplicibus unifloro, radice bulbosa
6. pyrenaeus R. foliis lanceolato-lineari-bus, caule subaphyllo erecto sub bifloro, pedunculis hispidis, radice bulbosa
7. parnassifolius R. foliis ovatis nervosis integerrimis, caule subaphyllo sub trifloro, pedunculis hispidis
8. amplexicaulis R. foliis caulinis ovatis amplexicaulis integerrimis caule sub bifloro, radice caespitulata

9. bullatus R. foliis ovatis serratis, caule aphylo unifloro piloso.
10. Ficaria R. foliis cordatis angulatis, caule decumbente subramoso, ramis simplicibus unifloris
11. plantaginifolius R. foliis cordato-ovatis crenatis, scapone monoglypho glabro, flagellis reptantibus
12. cordifolius, foliis petiolatis ovatis serratis, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis caule erecto multifloro
13. Thora R. foliis reniformibus subtrilobis crenatis, caulibus sessili, petalibus lanceolatis, caule subreflexo.

†† foliis dissectis et divisi lobatis

- <sup>hyperboreus</sup>  
<sup>creticus</sup> foliis radicalibus trifidis tri s. quinque lobis lobis divariatis  
caule repente
- pedunculatus foliis subrotundis trilobis integris caule repente
- parvulus R. hirtus; foliis trilobis incis, caule erecto subreflexo.
- municatus R. foliis simplicibus lobatis obtusis glabris, caule diffusis  
femineis mucatis.
- capponicus foliis tripartitis lobatis obtusis, caule subnudo unifloro

perp

xxx foliis dissectis

- *Erechticus* R. foliis radicalibus reniformibus crenatis sublobatis, caulinis tripar-  
titi lanceolatis integerrimis, caule multifloro.

- *Casubellus* R. foliis radicalibus subrotundo-cordatis crenatis, caulinis digitatis den-  
tatis, caule multifloro

- *abotinus* R. foliis radicalibus cordatis crenatis: caulinis ternatis angulatis  
caule sub<sup>trifl.</sup> flor.

*anidomus*  
*canonius*  
*perfrans*  
*Belebat*

*Belebat* R. foliis inferioribus palmatis: summis digitatis fructibus obli-

qu.  
*micranthus* R. foliis inferioribus quinquefidis superioribus tripartiti  
lineantibus caule glabro multifloro

*novalis*  
# *anidomus* foliis radicalibus reniformibus crenatis incis; caulinis digi-  
tatis lineantibus, caule multifloro

*alis* *aiometifolius* R. foliis omnibus quinatis lanceolatis incis serratis

*loco* *coll*  
*platanifolius* R. foliis palmatis lobatis incis, caule erecto, bracteis  
lineantibus

*alpestris* R. foliis radicalibus subcordatis tripartitis: lobis trilobatis:  
caulibus lanceolatis integerrimis, caule subuni flor

*paris* *paludosis* *holysant*  
*Platanifolius* - *arvensis* - *spatidus*

~~xxv~~ ~~foliis omnibus pinnatis~~  
~~xxvi~~ ~~foliis compositis~~

+ *allegneus* R. foliis radice libus pennatis ternatisque, caulibus tripartitis  
folioli laciniis que indivisi lanceolatis integerrimis calycibus  
reflexis

+ *peruylvanicus* foliis ternatis trifidis incisus subtus pilosis, caule  
inter antecedenti erecto, calycibus reflexis

+ *Thurstonii* R. foliis ternatis, tripartitis, trifidis incisus cauleque ramoso  
hirsutissimo

+ *ternatus* R. foliis omnibus ternatis: folioli trifidi caule multiflo

+ *japonicus*

+ *apaticus* R. foliis ternatis <sup>no</sup> ~~et~~ radice libus integris ternatis biternatis  
inter antecedenti que: folioli trifidis incisus caule inferne ramoso.

+ *nudo folius* R. foliis supra de compositis, caule simplicissimo unifloro  
unifloro, radice tuberosa

+ *glacialis* R. foliis ternatis tripartitis trifidis, calycibus hirsutis  
caule subflore

+ *nevadae* R. foliis radice libus quinquefidis, caule <sup>sub</sup> monophyllo et unifloro  
inter antea caulibus 3 to quadripartitis laciniis integris

20 glacialis R. calycibus hirsutis, caule bifloro, foliis multifidis L. V.

fl. Dan. tab. 19. Faey. coll. 1. p. 109. t. 2. g. fig. 1. 2.  
Ranunculus montanus purpureus; calycis villosi Bank. hist. 3. p. 662.  
Schemtz. alp. 139. t. 20. fig. 1.

Ranunculus alpinus conandri folio, flore albo purpurascente

Barr. ii: 456

Ranunculus caule bifloro, calycis hirsuto Lin fl. Lap. 233. t. 3. fig. 1.

Habitat in alpebus Lapponia, Helvetia, Dalmatinar & Illyriae

Radix fasciculata <sup>caulis</sup> ~~caulis~~ <sup>radiculis</sup> ~~radiculis~~ <sup>gigis</sup>. Caulis palmari <sup>petiolata</sup>

sternatur glabri pte folia plerima ad radicem quo plena  
que in medio caulis proplem, crassiuscula avenia, ternata  
folioli tripartiti trifidis lobis obtusi. Pedunculus pollicis  
ni uniflorus. Corolla magna extra purpurascens. Foliole  
calycis ovata

43 polyanthemus h. calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto foliis multi  
partitis. Lin. l. V

Ranunculus polyanthemus simplex Lobel. ii. 666.

Ranunculus Sylvestris Tabern. ii. 42. hist. 117.

Habitat in Europa boreali gramminosi

Ranunculus ~~foliolatus~~ <sup>foliolatus</sup> caulis erectus semipedalis fructus, pili adpressi. Corolla petala  
5a radice quinquempartita lacin lobis bis trifido  
laciniis linearibus apice serratis subtus villosis folia  
superiora in caule fere nulla nisi floralia 3-5 partitata  
laciniis linearibus. Pedunculi ramosi

31 Laponicum foliis tripartitis lobatis obtusis, caule subnudo unifloro fl. lwei  
5094 Fl. Dan. tab. 144.

Ranunculus caule unifloro unifloro, foliis tripartitis fl. Lapp.  
231. 7. 3. fig. 4.

Habitat in alpebus Laponicis

Caulis filiformis erectus interdum apyllus interdum folium <sup>vel</sup>  
superne vespi florum indivisam <sup>capill</sup>. Folia palmata. Folia <sup>longa</sup> petio

interdum folium lobata lacinae obovati intermedia triloba  
tripartitam in <sup>marginata</sup> lobis. <sup>lobata</sup>  
caule interdum bifida lacinae tri vel

varietas in alpebus norvegicis frequens caule pollicari foliis tri vel  
5 lobis lobis indivisus. vid. fl. Dan. et fl. Lapp. her.

45 Ranunculopsis R. calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hispidis, foliis trifidis lobatis crenatis holopetalis Lin. spec. pl. p. 779 fl. Dan. 8. 397

Ranunculus montanus lanuginosus, foliis ranunculi pratensis repentis  
Bauh. prodr. 96. pra. 102.

Ranunculus montanus subhispitus latifolius Bauh. prodr. 96. 196.

Ranunculus montanus subhispitus latifolius Bauh. germani folio  
Bauh. pin. 102.

Ranunculus magnus valde hispitus, flore luteo Bauh. hist. 3. p. 417.

Ranunculus nemorosus hispitus, foliis caryophyllata Loef. mus. 220  
7. 71.

Habitat montis, in Helvetia, Lusatia &

Caules erectus striatus superne divises. Folia radicalia tripartita lobis <sup>late</sup> ovato-oblongis serrato-incisi bipollicia nbi et ultra <sup>re</sup> lateralibus extorsum latiora petiolis pilosis. Caulis superiora ternata <sup>per</sup> duo opposita floralia ternata lanceolata intermedio longiore et latiore subnifido pedunculi elongata ramosi. Calyx villosus





41 repens L.: calycibus patulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis com-  
positis Lin. Spec. p. 779, fl. Dan. tab. 795.

Ranunculus hortensis L. Dod. prompt. 425.

Ranunculus pratensis repens L. in Juss. Bauh. pin. 179.

Habitat in Europa cultis. 4

Caules diffusi <sup>repentes</sup> patuli, subramosi. Stolorum longi foliosi.  
Folia petiolata duplicato ternata. Petiolo laterali  
subtus basi angustata apice superiore reflexo per hinc dilatata  
serrato subina supra in superiore subpetiolo inferiore glabra  
pedunculi sub florum rano villosa semina

duplicato ternati

foliis ter in

quomodo semina

44 aem. R. calycibus patulis, pedunculis erectibus, foliis tripartito multifidis sum-  
mi linearibus Lin. 1. v

Ranunculus hortenfis Dad. pempt. 426.

Ranunculus pratensis erectus aene Bauh. pin. 178.

B Ranunculus hortenfis erectus, flore pleno Bauh. pin. 179.

Habitat in Europa pratis, pascuis & <sup>conge</sup> rupibus & <sup>reticulata</sup> rupibus. <sup>ter</sup>  
Caulis <sup>conge</sup> fructus glaber erectus. Oculi radicali <sup>reticulata</sup> petiolata ter  
nata foliis tripartitis lobis bis. trifidis. caulina ad diversiones  
inferiora <sup>reticulata</sup> sessilia <sup>reticulata</sup> superiora sessilia. Pedunculi  
terminales uniflori

32 hyperboreus R. foliis trifido 3. f. 5 lobo lobis divaricatis, caule repente

Ranunculus <sup>glor</sup> repens caule in caule singulari, foliis variegatis  
 amm. nith. Pl. tab. 13. fig. 2. Fl. Dan. tab. 331.

Ranunculus hyperboreus foliis profunde trilobis lobis ob  
 longis divaricatis, caule filiformi repente Retz  
 prodr. n. 617. <sup>4ml</sup> Pl. sub. 47. 83. <sup>175. 204</sup> sub alio nomine Rothb.  
 in Act. Hafn. Xp. 45. Pl. t. 4. fig. 16.

Habitat in Flandria et Nova Zemmaria

affertur a R. hederaceo ad Lapponias a primo descripti  
 qui tunc foliis profunde lobatis a Lapponico caule  
 repente

57 parviflorus R. seminibus mucronatis, foliis simplicibus laciniatis acutis hirsutis,  
caule diffusis. Lex. Spec. pl. pag. 7004.

Ranunculus hirsutus annuus, flore minimo Pluken. alm. 311. t. 55. fig. 1.

Raj angl. 3. p. 240. t. 12. fig. 1.

Habitat in Europa australi ☉

offenis mucronato caule diffusis uti tota planta pilosus, ramosus. Solia  
petiolata tri vel 5 fido lobata floralia saepe indivisa oblonga  
flores parvi minoris quam in mucronato. tuberculo minuto in  
seminibus nec aculei. pedunculati laterales breves

Ranunculus rotundifolius repente echinatus Mauh. prod. 97  
p. 100

1. *Flammula R. foliis ovato-lanceolatis petiolatis caule declinato* Lin. S. V  
fl. Dan. Tab. 572.

*Flammula ranunculus* Dod. pempt. 432.

*Ranunculus longifolius palustris minor* Bauh. pin. 100

*Ranunculus palustris, foliis serratis* Bauh. pin. 100

Habitat in Europa passim usque <sup>et America boreali</sup> & in montibus

Caules, uti tota planta glaber, striatus saepe pedalis, ramosus

Folia petiolata inferiora, ovata lanceolata pollicaria

neriosa obsolete dentata, superiora linearis lanceolata

utique adpressi <sup>adpressi</sup> saepe sesipollicaria, acuta. <sup>adpressi</sup> superiora subrotunda dispersi  
prolixi in foliis <sup>in</sup> ramis floriferis. <sup>in</sup> caulis terminalis pedunculat. Ducto  
superioribus

Comae simplex, pili minuti adpressi uniflori, folium subtula  
tum ad ramificationes. Folium radicale petiolo saepe  
saepe longiore oblongum. Petioli basi versus membranosa utrinque  
aucti amplexicaulis

foliis inferioribus ovato-lanceolatis, superioribus linearis lanceo-  
latis caule declinato ramoso

2 reptans R. foliis lacinantibus caule repente Lin. S. V. fl. Cup. <sup>pag 236 Tab. fig 6.</sup> fl. Sam. tab. 100

Ranunculus flammeus minimus, spargula folio Buxb. cent  
s. app. 41.

Ranunculus repens, gramineo folio, e singulis geniculis radices  
agens Aram. mth. 80. t. 13. fig. 1.

Habitat in Europa boreali ad ripas lacuum

Radicibus filiformibus ad nodos foliosi, & floriferi. Folia angustissima  
sesquipedalia paucis. Caulibus digitalis folio 2 vel 3 remotis  
brevioribus, subuni flori

floribus pedunculatis

varietas forte antecedenti

50 arvensis L. feminebus aculeatis, foliis superioribus decompofitis linearibus  
L. V. fe. Dan. tab. 219

Ranunculus fylveftris 3. Dod. penult. 427.

Ranunculus arvensis echinatus Paub. pin. 179.

Habitat in Europa australi agri O

Caulis erectus palmans fractus vilofus, ramofus. Folia  
radicalia petiolata ciliiformia apice tridentata, caulium  
inferiora ternata folioli angufti basi valde <sup>negra</sup> affluente  
apice tri vel bifido. Superiorum <sup>divergentia</sup> tri bifida profunde bi  
trifida laciniis interioribus bifidis. pedunculati latera  
les uniflori femina peltobunda utraque aculei longi



gremosa R.

Ranunculus folios Oenanther Tournef.

Ranunculus minor apii folios radice gremosa Botanici aquo  
texturis

Ranunculus alpinus Tribuli aquatici folios Boerh. Musc.

hinc quoque pertinet videtur seu: herb. Turc.

Folia emissa, pelosa vel glabrescens, incisiva, 5que dentata: alia  
pinnata

bullatus R.

Ranunculus autumnalis Clus.

Ranunculus Scythicus folio subrotundo parvo flore Tournef.  
+ R-h. herb. Guss.

Bergera

1. Koenigii B

3 radiflorus R. foliis ovatis petiolatis: floribus sessilibus Lin. l. V

Ranunculus panheusi pumilus, plantaginella foliis Pet. gar. 40. t. 25  
f. 4. Vaill. in Act. panf. 1719. p. 40. t. 4. fig. 4.

13 Ranunculus ficulus, foliis rotundo vix serrato Pet. gar. 39. t. 24.  
fig. 4.

Habitat Panpis et in Sicilia locis paludosi.

Caulis prostratus? Planta digitalis glabra affinis reptans. Folia radicea leu  
petiolata ovata obtusa integerrima femurquidulana  
caulina linear lanceolata, obtusiuscula basi attenuata  
inferiora alterna sequipollicana, superiora opposita un  
guiculana. Flores ad gemmula sessilia solitaria parva  
semena munita

Ranunculus alpinus palustris cynosuri ocygni folio Hort. Cat.  
tab. 4. in

petiolatis

radicealibus ovatis, caulibus lanceolatis

Folia oblonga. Semina rotunda munita. Variat foliis latioribus  
et angustioribus longioribus

prope rept. collocatur

<sup>herpatus</sup>  
~~fericeni~~ Ranunculus <sup>herpatus fericea</sup> foliis omnibus ternatis tripartitis incisus calycibus patulis  
hab. in Trifida Bourbonis

Radix annua

Caulis erectus pedalis teres, herpatus

Folia <sup>naeviolata</sup> omnia ternata foliolis tripartitis incisus laciniis acutis dentatis utrinque  
pelosis subtus mollibus; subtus fericeis pollicaribus summis sessilibus an  
quibus linearibus lanceolatis integerrimis

Pedali folio triplo longiore Radiculis basi dilatatis amplexicaulis vagi  
nantes pelosis fimi

Peduncululi sesquiapicem foliosi villosi bipollicares uniflori

Calyx patens foliolis oblongis acutis margine membranaceis

a Pennsylvania differt foliis utraque pelosis calycibus patulis  
a ternato calyce patulo

radicaulis Ranunculus foliis ternatis intermedio tripartito trifido lateralibus bipartitis in  
cisis caule subnudo

hab. ad fretum magellanicum

Caulis erectus teres villosus, pilis adpressis, superne crassior pedalis  
aphyllus

Folia radicalia petiolata, ternata foliolo intermedio tripartito laciniis  
intermedia <sup>indenta</sup> laterales unijuga unica vel nulla omnes acuti  
foliolo <sup>superpetiolata</sup> lateralia bifida laciniis bifidis lanceolatis omnes laterales  
integerrime glabriusculi vix pilosis pollicantibus

Stemina ~~apice~~ petiolis folio quintuplo longior pilosis

Floris ad apicem binis vel tres pedunculati pedunculis brevibus  
tomentosis unifloris folio tripartito laciniis subintegris, lanceolato  
lineariibus ad basin pedunculi

Calyx patulus laciniis ovatis villosis margine membranaceis

5. gramineus R. foliis lanceolato-linearibus indivisi, caule erecto compresso  
paucifloro radice tuberosa

Ranunculus gramineus folio, bulbosus Bauh. pin. 101.

13. Ranunculus montanus folio gramineo Bauh. pin. 100

14. Ranunculus montanus folio gramineo multiplex 101.

Habitat in Gallia pratis aridis &

Radiis superne setosis. Folia plerumque in caul. radice  
12 in caule, angusta bis 3 pollicaria nervosa striata foliis alij  
longioribus rarioribus patentibus, integerrima. Soleem can-  
terum amplexu caule vix pollicare <sup>lym</sup> caulis striatus per  
plicis finis glaber in pedunculis uniflorus depressus  
palmis vel paucis ultra

~~Tuberosus~~ bulbosus

caule erecto subaphyllo <sup>indiviso</sup> unifloro radice

7 parnasifolius R. foliis subovatis nervosis lineatis integerrimis petiolatis,  
floribus umbellatis Lin. Spec. pl. pag. 774, Taegu. coll. 1. p. 191. V. 9. fig. 3.

Ranunculus montanus, graminis parnasifolius Tournesford. 286.

Habitat in Europa australi.

Folia radicalia longe petiolata, integerrima <sup>subovata</sup> ~~tricuspidata~~  
folia duo primor

scalia lanceolata  
5-7 nervia, ovata vel ovalia acute glabra.

Petioles caule altior <sup>5</sup> pollicari <sup>base</sup> Anatus basi dilatati  
marginibus membranaceis, glabri. Caulis proter folia sub  
floribus lanceolatis <sup>5-7</sup> ~~tricuspidatis~~ <sup>perpetuis</sup> ~~angustatis~~, apiculatis, venis glabris  
pedunculi 3 vel <sup>4</sup> ~~quatuor~~ ad apicem approximati intermediis  
nanis longior <sup>monophyllis</sup> laterales breviores diphylli foliis oppositi  
hirsuti. Calyx purpurascens

ovatis nervosis integerrimis, caule semisubopphyllis  
pe sub 3 floribus, pedunculis hirsutis



8 amplexicaulis R. foliis <sup>caulibus</sup> ovatis acuminatis amplexicaulis; caule multo  
flor., radice fasciculata Lin. S. V

Ranunculus pyrenaeus flore albo Clus. cur. app. alt

Ranunculus montanus, folio plantagineo Bauh. pin 100 Mon. f. h. 87

2. p. 444. f. 4. v. 30. fig. 36

Ranunculus dulcis, foliis latis rapistri persolati, floribus albis Mentz.  
pag. 1. v. 8. fig. 6.

Habitat in Pyrenaeis, Apenninis &

caulis erectus simplex, striatus, palmatis et ultra

foliis radice

alterna, integerrima glabra glaucis undia valde alta  
caulibus  
nata bipolliciana vel minor. pedunculi superne  
gemini uniflori

integerrimi

10. *Tucania* R. foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro Lin. f. V  
p. fl. Lan. Tab. 499.

*Chelidonium minus* Tuck. hist. 867.

*Chelidonia rotundifolia minus* Bauh. pin. 309.

β. *Chelidonia rotundifolia major* Bauh. prodr. 137. pin. 309.

Habitat in Europa niderati, umbrosi, spongiosi &

caules plures decumbentes glabri, ramosi. Folia  
pallidiora dentato angulata, glabra, petiolata. Radix  
culm. terminalis elongatus uniflorus petala plura.

Cau  
caule, decumbente  
caulibus procumbentibus subra  
mosi, rami unifloris simplicibus unifloris

11 *Plantaginifolius* R. foliis cordato ovatis apice integris tridentatisve, flagelli  
septantibus Murr. in Com. Gott. 1777. p. 39. t. 2. Faigu. hort. 3.  
p. 14. t. 31.

Habitat in Sibria

*Ficus* R. *ficiensis* folia radicalia petiolata nervosa venosa, Venera pollinaria  
vel ultra, glabra crenata, venella integerrima obtusa  
Petioli caule saepe althor. Flagelli pedales remote  
foliof. folia plura ad nodos. Caulis digitalis simplex  
uniflorus superne infra florem folium amplicaulis  
lineari lanceolatum. Petala plura minora quam  
in *ficiensis*

crenatis, scapo monophyllo glabro

12. Thora R. foliis reniformibus subtrilobis crenatis: caulibus sesquipedalibus, floribus lanis  
latis, caule subbifloro L. V. Faequ. off. 23. Tab 13.  
fl. austr. 5: 442.

Thora major Cam epit. 225.

Thora vaddensium Lobel. ii. 604. Clus. hist. 1. p. 239

Aconitum pandalianthes f. Thora major Bauh. pin. 104.

13. Thora minor Cam epit. 226

Aconitum pandalianthes genus, uno tantum folio Dalech. hist. 1738.

Aconitum pandalianthes altinum f. Thora minor Bauh. pin. 104.

Habitat in alpinis helvetiae, Pyrenaeis &

Paulis simpliciter erectis subtile sime striatis, glaber uti tota planta  
<sup>interdum raris lobis apice unguiculatis</sup>  
Folium unicum in medio caulis subrotundum latis quam longum  
reniforme, sesquipollicare. folia floralia lani unguicularia interger  
nna

<sup>14</sup>  
55 hederaceus R. foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente L.  
fl. Dan. t. 321. Gmel. p. 4. v. 13. fig. 8.

Ranunculus aquaticus hederaceus Luteus Hank. pin 100. Mon. p. 10  
2. p. 441. J. 4. v. 29. fig. 29

Habitat in aquis vadosis Danis, anglis, Belgis

Caulis filiformis glaber. Folia ad gemmula aggregata petiolo  
La. tri p. 5 loba pinnatifida, glabra lobis rotundatis. Pedunculi  
interfolia solitarii uniflori. <sup>Compositi in petiolo</sup> Semina subrotunda rugosa  
reticulos unguiculati

40. parvulus R. luteus, foliis trilobis incisis, caule erecto subunifloro Lin. Mant  
179. + P. V. pag. 810.

Ranunculus arvensis parvus, folio trifido Bauh. pin. 179

Ranunculus saxatilis minimus hesperus Bauh. pin. 102.

Ranunculus minimus apulus Col. ce. phr. 314. & 316.

Habitat montipelii inque italia.

Caule erecto pilosissimo prostrato infero, solitarius, palmarive  
ultra in pedunculo unifloro verrucosus. Tollea petiole  
radiculis subrotunda crenato serrata. Vix unguiculata pilosa  
pauci in caule tripartita laciniis trifidis, foliis radice  
fere majora flos ratiore planta magnus. Calyx membranaceus  
vellosus

semina quomodo?

44 *municatus* R. seminebus aculeatis, foliis simplicibus lobatis obtusis glabris, cau-  
le diffuso lin. L.V

*Paranunculus palustris echinatus* Vauh. prod. 95. Jun. 1800

*Paranunculus creticus echinatus latifolius* Alp. exot. 263. v. 262.

Habitat in Europa australi seorsim et humentibus O

Caulis ramosus basi utus debilis & glaber. Solia petiolata  
glabra serrata cus per lobata quam longa superiora  
trifida laciniis dentato incisus, Requirpollinaria petio-  
latis inferiorum foliis multoties longioribus basi petiole aliquot  
transversis basi inferne mediante membrana dilatata  
complexu aucti pedunculi laterales et terminales  
uniflori. Lemina ovato ovata apice striata inermis.

14 creticus 2-folius radicalibus reniformibus crenatis sublobatis  
caulis tripartiti lanceolatis integerrimis, caule multifloro  
Linn. S. V. pag. 516.

Ranunculus creticus latifolius Olf. bot. 1. p. 239.

Ranunculus affodeli radice, creticus Benth. p. 101.

Habitat in Creta.

Habitus. caesp: Caulis pubescens sine striatus simpliciter raris pilosus. Folii  
radicalia bi-3 pollicaria duplo latiora quam longa  
nisi lobata crenata nervosa venosa pilosa. Cuius laciniae  
et in meo unicum proter flouales apertae utraque  
dente velut integerrima. pedunculis ramosi. Canuquos  
flores magni.



*Triampaca* M. foliis lanceolato-ovatis Len Mant. 70. 4. p. 500

*Michelea euonymoides* Burm. ind. 124.

*Lampaca sylvestris* Rumph. amb. 2. p. 202. t. 60.

Habitat in India &

15 Caspicius R. foliis radicalibus subrotundo-cordatis crenatis, caulinis digi-  
tatis dentatis, caule multifloro Lin. t. V  
Ranunculus rotundifolius verus sylvaticus major vel Caspicius, foliis  
thoro caltho Brey. prodr. 1. p. 45.

Habitat in Casubia, Sibiria &

Caulis dichotome ramosus erectus, teres, striatus, pedalis. Folia  
radicalia petiolata, nervosa - venis bipolliciana lateora quam  
longa. Caulinis ad diversione ramorum sessiles cernitur septem  
partiti suprema quadri vel 5 partitati lacinis canaliculato  
extrothem densum dilatati in inferora, superne serrata  
basin versus integerrima rase petiole suprema angustiora  
polliciana. Pedunculus ex apice ramorum solitarius  
uniflorus. Calyx vellosus

polymorphus Ran foliis radicalibus subrotundis petiolatis, <sup>2</sup> caulibus <sup>1</sup> <sup>et subterranis</sup> <sup>caulis</sup>  
caulis septem digitatis: folioli integerrimis all. fl. ped.  
no tab. 67. fig. 3. 4.



16 *aunicornis* L. foliis radicalibus reniformibus crenatis incis; caulis  
digitatis lineariibus, caule multifloro <sup>in spec. pag. 78, 79</sup> fl. Dan. tab. 655  
*Ranunculus rotundifolius* vernus sylvaticus Bauh. hist. 3. p. 341.  
*Ranunculus* 1. sylvaticus Galock. hist. 1020.  
*Ranunculus nemorosus* s. sylvaticus folio subrotundo Bauh. pin. 170.  
Habitat in Europae partibus humidis & siccis

in herbario de Jberatus

nitidus R. foliis caulibus nitidis & rufis: laciniis obtusis  
Vet. fl. Car. pag. 159.  
Habitat in Carolina.

non vidi

23 pennsylvanicus R. foliis ternatis trifidis incisio subtus pilosis, caule erecto, calyci-  
bus reflectis Lin. Suppl. p. 272. P. V. pag. 516  
Pronunculus canadensis Jacq. msp. 2. p. 343.

Habitat in Pennsylvania 4

Caulis herbaceus erectus. Folia petiolo radice <sup>pollicari</sup> triplici <sup>fidem</sup> lanceolatis incisio serratis. Caulibus ternatis subtus pilosis  
trifida serratis ~~incisio~~. Racemis lanceolatis elongatis  
incisio serratis pedunculati pappi laterales uniflori  
perianthio compresso mucronato corolla glabra

Sub nomine Pron. canadensis plant. vidi mihi vix videri diversus a  
pennsylvanicus

monspeliadurh.



*Picleratus* R. foliis inferioribus palmatis: summi digitati fructibus oblongis  
L.V. fl. Dan. tab. 570

*Ranunculus phytolatri*: Dod. pempt 426.

*Ranunculus palustris*, apii foliis, Lani. Bauh. pin. 100.

Habitat in Europa praeferatim paludibus.

Caulis ramosus striatus glaber. Folia inferiora tripartita  
lacinis lanceolatis cuneatis apice subincis in supremis  
lanceolata integerrima. Pedunculi laterales et termi-  
nales receptaculum oblongum femina subglobosa ovulo  
armato uti negosa

Bregnia Ran foliis tripartitis puberulis, receptaculis lanuginosis  
Candi ftory ansp. tab. 4. fig. 2.

facilis R.

paludifera R. foliis inferioribus Vaginae multo multo inflexi superioribus  
simplicis simis linearibus Poir. & 2. p. 104  
Habitat in Barbana.

michi ignotus

30 alpestris R. foliis radicalibus subcordatis obtusis tripartitis: lobis trilobatis: cauli  
no lanceolato integerrimo caule subuni-floro hb. p. 5174. Jacq. fl.  
aust. tab. 110

Ranunculi montani 1. p. 234. Clus. hist. 1. p. 234.

Ranunculus alpinus humilis rotundifolius, flore majori et minori  
Baob. pen. 101.

Ranunculus alpinus humilis albus, foliis subrotundo. Segu. Ver. 1.  
p. 409. t. 12. fig. 1.

Habitat in alpebus helveticis et Austriacis 2

Planta digitalis vel palmari glabra. Folia radicalia nulla  
minium vel duo in caule superiore approximata lanceata obtusa  
vel unguiculata et squama subrotunda, interdum squa  
ma loco foliorum. radicalia tripartita, rarius ternata  
lobi oblongi incisivi intermedia <sup>trifida</sup> lobis bifidis venosis  
Pedunculis caulem ter mixant unifloris. Petala emargin  
ata

*micranthus*

21 *glaberrimus* R. foliis palmatis lobatis incis, caula erecto, bracteis  
linearibus Mant. 79 + S.V. pag. 516 Pl. Dan. tab. 111.

*Ranunculus albus* flore simplici. Lobel. ii. 660.

*Ranunculus montanus*, aconitifolius, albo flore majori Bauh. pin. 102

Habitat in Norvegia, Germania et Italia alpina &

Statura ramunculi aconitifolii, bipedalis erectus folia petiolatis  
glabra venosa & partita laciniis serratis incis lanceolatis  
Pedunculi ramosi

25 *apiaticus* foliis ternatis bitermatisque: foliolis trifidis incisi, caule inferne ramoso lin. h. v. Lin. h. v. pag. 5164

*Ranunculus apiaticus polychlorus* f. radice grumosa radice r. Clus. h. 7. 1. p. 241.

*Ranunculus*, grumosa radice, ramosus Bant. pen. 101. Cum varietatibus

Habitat in Asia, Mauritania, palmarum  
Caulis erectus pedalis <sup>intermedium</sup> in pedunculatos divfus, vellosus  
Folia petiolata, plerumque radicialia, pro alia cordato subrotunda crenato subincisa margine ciliato: reliqua subbitermata foliolis bis. tripartitis lobis bis trifidis lineari lanceolatis dentis glabri <sup>cum subioracis</sup>. Caulis 1. 2. minus divfus supremis floralibus lanceolato-nervosa  
Calycis foliola ovata, acuminata subsaricea

*Ranunculus saxatilis apifolius* minor radice tuberosa reticulata obtusa Boiss. mus. 2. p. 162.

*Ranunculus* radice tuberosa reticulata Boiss. mus. 7.

varietas <sup>124</sup> forte ex hupania foliis radicalibus tripartitis lobis lobulatis dentatis, caule subnudo subunifloro an potius monspeliensis



22 *Ulyncus R. foliis ternatis integerrimis lanceolatis Lin. S. V*

401 qu. fl.

Austr. 3. 4. 222.

*Ranunculus grumosa* radice 4. Clus. hist. 1. p. 240

*Ranunculus lanuginosus angustifolius*, grumosa radice major et minor. Bauh. pin. 101.

Habitat in Islandia, Hungaria, Narbona, Italia &

Caulis erectus, teres lanuginosus tomentosus ut folia et calycis.

<sup>radice</sup> Folio prima indivisa, tripartita vel <sup>trifida</sup> subpinnata. Caulina

superiora bipartita, lanceolata attenuata, integerrima

bi-3. tri-pollucina. Floralis indivisa. pedunculati

superne divisi uniflori. Los majores. Calycis foliola

lanceolata <sup>reflexa</sup> <sup>superioribus</sup> <sup>reflexa</sup> <sup>radicalibus</sup> <sup>pinnatis</sup> <sup>vel</sup> <sup>ternatis</sup> <sup>caulis</sup>

foliis tripartitis, laciniis lanceolatis attenuatis integerrimis, Calycibus reflexis

*Ranunculus lanuginosus asphodeli radice* Bauh. pin.

*Ranunculus saxatilis montanus asphodeli radice* Colum. Egypt.

Culte 1313.

*aconitifolius*

25 Vernatus R. foliis omnibus ternatis - folioli trifidi caule multiflora,  
calycibus reflexis Thunb. fl. jap. p. 241. S. V. pag. 516.  
Habitat in Japonia

non vidi

villosa *Hieracium foliis lanceolatis pilosis. geminibus in globum collectis*  
Lour. fl. Cochinch. pag 303.

Habitat prope cantonem Siamum

Caulis herbaceus pilosus erectus, octopollicari, ramosis. Stipulae vix natae  
lanceolatae, serratae, aliqua bifida. pedunculi uniflori, terminales,  
solitarii, flores lactei.

Coussi Ranunculium

non vidi

palustris *Heatonia* foliis cuneiformibus glabris, gemmibus in cylindrum  
collectis Lour. fl. Cochin. pag. 303.

Habitat in humidis prope Cantonem Sinarum

Caulis herbaceus, pedalis, suberectus, crassus, fistulosus, lavis, ramosis.  
Folia ternata, glabra, petiolata. Pedunculi solitarii, subterminaliter,  
uniflori. Flores lutei parvi. Cal. foliolis ovatis coloratis, reflexis.

Petala striata, patentia. Stamina 10 inaequalia basi receptaculi  
elongati circumstantia. Germine articulo 100 in receptaculo  
columnari. Stylus nullus. Stigma puncta singula in apice gemmi.  
Pentagonum nullum.

palustris *Ranunculus*

non vidi

4 *Corypha R. foliis lanceolatis caule erecto* Lin. S. V.

Lin. Mont 407

fl. Dan. tab. 754.

*Ranunculus lanceolatus major* Tabern. ic. 40.

*Ranunculus Coryphifolius palustris major* Bauh. pin. 34.

β *Ranunculus flammew, latiori plantagine folio marginibus  
pelosis* Pluken. alm. 312.

Habitat in Europa borealiore foris, aquis limosis

Caule interdum tripedati & pelis copiosi adpressis cinereis

Folia 4. 5 polliciana utrinque attenuata hinc remote  
dentata pelis adpressis, nervosa petiolus inferne

dilatatus amplexicaulis pedunculatus ex ala folii  
ante penultimi erectus

simpliciter peloso