

Rauwolfia

1. nitida R. glaberrima nitidissima foliis lanceolatis transversim nervosis
2. canescens R. foliis subtus ramisque subpubescentibus
3. tomentosa R. <sup>ut supra</sup> foliis tomentosis

*Rauvolfia glabra* Caran. in vol. 3. pag 50. Tab. 297.

*Callisia cymbofolia* Ortega Dec. pag. 5 P.

Habitat in Nova Hispania 5



*macrophylla* Rauwolfia

*Rauwolfia macrophylla* foliis obovatis cratisque emarginatis integerrimisque, nunc emi erectis multifloris Fl. Peruv. 2. pag 26. tab 152. fig. 6  
Habitat in Peruvia collibus arenosis 5

Spinosus Caulis fruticosus, tergyalis, erectus, ramosus primis; Rami brachia-  
ti obtuse tetragoni, helvoti, granulati. Folia opposita, brevis petiolo-  
ta, obovata ovataque, obtusa, <sup>sona</sup> emarginata, ~~nonnulla integerrima~~, supra  
nitida, subtus pubescentia, venis prima, rugosa, conacea, patentia  
Petioli pubescentes. Spinae opposita, horizontales, teretes, acuta, nigri-  
da; seniores folifera et florifera. Pedunculi axillares inter spinae et  
folia multiflori. Flores breviter pedicellati. Calyx pentagonus pubescens  
fructiferus quadruplo major expansus, obtusus. Stamina nigra bilocula-  
ria disperma. Corolla lutescens, fauce villosa. <sup>nucis</sup> ~~semine~~ biloculares

4 longioris

*flexuosa* Rauwolfia

Rauwolfia flexuosa. foliis oblongis obovatisque angustis, racemis  
flexuosis & paucifloris. Bl. Penn. 2. pag 26. tab 152. fig a.

Habitat in Peruvia fruticosa 5.

Caulis fruticosus, tergyalis, erectus, ramosissimus. Rami erecto patuli,  
tetragonis. Folia breviter petiolata, opposita, oblonga obovataque, obtusa, vix  
gemma aliquando emarginata, supra glabra, nigra, nitida, subtus pube-  
scentia, venosis binis - Spina axillares, bracteata: seniores ramosae,  
foliiferae. Racemi breves, a punctis gemmaceis, flexuosi, 7-9 flori.  
Flores parvi albo lutei. Limbus et pars <sup>interior</sup> corollae villosa. Drupe nigra  
purpureo ceras, magnitudine pisi - Semina <sup>duo</sup> obovata, bilobata, hilo  
cylindrica

folia oblonga



glabra Rauwolfia foliis alternis lanceolatis glabris, cymis pedunculatis  
paniciformis oppositifoliis Willd: Spec. pl. pag. 1218  
Rauwolfia glabra caule fruticoso ramoso, foliis omnibus solitariis ovatis  
lanceolatis glabris Lavan. ex. 3. p. 56. Tab. 297.  
Habitat in Nova Hispania

non vid.





canescens R. subpubescens: Len. S. V.

Gayou. Am.

Rauwolfia tetraphylla latifolia Plum. gen. 19. 4c. 236. fig. 2.

Arbor Lycophora jamaicensis, foliis minoribus Pluken. t. 266. fig. 2.

Solanum fructu fruticosa, foliis laurinis oblongis integris subtus hispida Sloan hist. 2. p. 107. t. 100. fig. 1.

Habitat in Jamaica t.

Rami dictotomi pubescentes. Folia brevissime petiolata ternata vel quaternata lanicolato oblonga usque pollicaria inaequalia terna sensimque minoribus <sup>ad latera petioli</sup> supra glabra subtus villosa pallidiorum pedunculis lateralibus foliis triplo brevioribus pedicellis lateralibus trifloris intermedeis unifloris

foliis supra <sup>obtusis</sup> pubescentibus

tomentosa Rauwolfia tomentosa Lin. S.V. p. 250 Gaëqu. obf. 2. t. 35.

Habitat in America

Folia quaternaria, lanceolata utraque tomentosa prope hinc subtus  
Cuspidata duo minora. Pedunculi communi racemosi  
terminales et axillares. Flores parvi. Fructus magnus  
Sed nisi Gaëqu

—— utraque tomentosi

non vidi