

Relhania

Dichotoma Kelhania

Habitat in Cap. b. p. herb. Royani 5.
Suticulus rigidus, dichotome vel 3, chotome ramosus. Rami erecti. Folia linearia
crassa, glutinosa. Umbella multiflora
affinis Herb. umbellata

bidentata Melhania folus lineariibus curvatis glabris apice & patulis bidentatis, flori-
bus terminalibus solitariis sessilibus.

Habitat in Cap-b speci herb horten 5

Stem ter glaber. Rami verticillati, & caepe foliorum dentati. - Solia frequentissima, op-
posita, sessilia, sinu quinquelobata, supra canaliculata, patentia, apice compressa
recurva parum lobata cum emarginatura parva bidentata. Flores solitarii.
Calyx cylindricus magnitudine corollae aequus nitidus squamo lanceolato
obtusis pilis.

7 microphylla Ath conyrbis simplicibus foliis obovatis reflexis glab^{apice} serrulatis glabris.

Habitat in C. l. spec 7

Tota glabra Rami scabri aggregati 4-5. Sola sessilia sparsa, conferta, cetero patentia
parva. Conyrbis 6-7 floris pedicellis brevibus apice squamosis. Calycis magnitu
dine subobovati squamis lanceolatis.

pedicelli sub
umbellati

Prehans spec 7

Eclipsis

Cal: Communis ovatus imbricatus: squamis exterioribus ovatis acutis, interioribus linearibus
intimus apice ovatis acutis patentibus, ^{radicantibus} omnibus ^{bus} planis.

Cor: Composita radiata. Corollula hermaphrodita tubulosa ^{disii} numerosa in disco.

Seminibus circiter 14 in radio

Propria hermaphroditi infundibuliformis quinque dentata calyce paululum brevior
Femineis ligulata, linearis, 3 dentata

Stam. filamenta quinque capillaria. Anthera cylindrica longitudine corollulae

Pistillum. Hermaphroditis: Germen lineare. Stylus filiformis, staminibus longior bifidus.
^{stigmata ajuta}
Seminibus ut in Hermaphroditis.

Per: nullam. Calyx immutatus, ^{dentatus} persistens.

Sem: Hermaphroditis linearia. Pappus paleaceus, ^{monophyllus} cylindricus, ^{dentatus} tubulosus, tubo corollae dimidio
brevior atque plerumque
Seminibus binellima.

Receptaculum paleaceum. Paleae omnes flosculos dispergentes lineare subulatum, angustis
primis membranaceum.

Hic differt ab Athanasio prope radio, a Heyleri seminibus absque plerumque paleis tubulosis
tantum coronatis, ^{paleis} totum receptaculum inter omnes flosculos nec solum inter flosculos
radio, sequens igitur erit differentia.

Receptaculum paleaceum. Pappus cylindraceus 1-phyllus. Radius multiflorus.

1 *Secunda* *Eclipsis* *foliis* ^{triquetris} *linearibus* *secundis* *recurvis* ^{et} *subtus* *incanis*.

+ *Habitat* *in* *Cap.* *6.* *Spei* *Burmannus* *7.*

Truxter *pedalis* *proli* *ferus* *Caule* *tereti*. *Rami* *seticillati* *a* *capite* *foliorum* *munia*
in *glabri*, *juniores* *superne* *tomentosi* *incani*. *Folia* *fracta* ^{secunda} *frequentia*, *linearia*
^{triquetris} *obtusiuscula* *integerrima* *apice* *recurvata* *pubescentia* *supra* *subtus*
linea *tomentosa* *incana*. *Flores* *terminales* *sessiles*, *solitari*. *Calyx* *glaberr*
mus *niti* *dus*. ^{Corollae} *lobi* *fulphurea* *basi* *purpurascens*.

+ *Leysera* *paleacea*

Asplenium *spidioides*, *foliis* *luteis*, *foliis* *rossi* *marini* *crebris*, *ovariis* *defutis*
Leysera *ancoides* *foliis* *triquetris* *obtusis*, *floribus* *sessilibus* *Berg.* *Cap.* *294* ^{*}
Leysera *paleacea* *foliis* *triquetris* *apice* *callosis* *recurvatis* *lin.* *V.* ^{*}
pag. *771.*

3 *Saxifraga* *foliis* *saxifragata* *linearibus*.

Habitat in Cap. b. p. 5

Stemulatus ramis tenuibus mucatis. Folia sessilia, plura ex singula
gemmas, semiunguiculata, inaequalia canescentia. Flores terminalis, sessilis,
solitarius. Calyx ovatus, imbricatus squamis apice fusi. Palea minuto
inter femineos, femina coronata margine

2 Juniperina Cyclops foliis subulatis rigidis pungentibus striatis.

Habitat in C. b. p. t. y.

Trutidulus ramis inferne aggregatis bifidis a cape soliorum exasperatis
^{crectis} ^{juniperina} superne tomentosis anis. Folia sessilia approximata, subulata
pungentia, striata, ^{ex t. y.} ^{glab. nuda} intus lanescens, semipollicaria. & Cos terminans
Ces sessilis solitarius. Squamis calycinis ^{crectis} ^{glab. nuda} nitidis flavescens marginibus
apiceque fuscis. Semina villosa.

Habitus Leyfers Calli omnis

Eclipsis (Palhana)
1. *Lycnanosa* *Orthopetala* *uniflora* *lateralibus*, *foliis* *ovatis* *recurvatis* *Lin. Am. 4. p. 329.*
Ab. p. 9. n. 52.

Habitat *ad* *C. bono* *per* *t.*

Trunculus *determinata* *ramosus*, *in* *equalis*. *Folia* *alterna*, *sessilia*, *ovata*, *mu-*
ronata, *glabra*, *recurvata*. *Pedunculi* *ex* *axis* *foliorum*, *solitarii* *uniflori*, *foliis*
in *quies*. *Calycis* *oblongi*, *imbricati* *lobes*: *sequamur* *intimis* *linearibus*, *mem-*
branaceis *patentibus*. *Styluli* *aequales* *hermaphroditi*. *Paleae* *lineares*, *longitu-*
dine *flosculorum*. *Semina* *Rayno* *brevisimo* *coronato* *Lin. Am. l. c.*

Lepidiflora ~~alt.~~ *Ecetopi* foliis linearibus pilosis pedunculo longioribus.

Athanasia leptiflora pedunculis unifloris foliis brevioribus, foliis linearibus
pilosis hinc Symplic. p. 362. l. v. p. 741.

Habitat in Cap. bonapae

Calopsis
humila foliis linearibus pilosis pedunculo brevioribus

Athanasia humila pedunculis unis floris foliis longioribus, foliis linearibus pilosis
Linn. Suppl. p. 362. S.V. p. 741.

Habitat in C. b. p. 17

uniflora *Eclipsis* foliis obovatis imbricatis glabris

Athanasia uniflora floribus solitariis terminalibus sessilibus, foliis obovatis imbricatis glabris
Eclipsis glabris in Suppl. p. 62. L. V. p. 741.

Habitat in Cap. Speitz

uniflora A.H.

callosa *Cerclopsis* foliis Inquetnis glabris apice patulis callosi recurvatis.

Habitat in Cap. b. frei &

Totum glaber determinate ramosis: Rami subaeque vagati mucronati post casum foliorum
Folia sessilia approximated, subtus caninata supra folio canaliculata apice
reflexa tuberculum parvum parum infra apicem. Flo. terminalis subsessilis
solitaria: ~~oblonga~~ glab. Calyx glaber squamis oblongis obtusis

Differt a *Palaeica* glabris

sub nomine *Alth. uniflora* missa a Thunbergio cum descript. Lin. non convenit

obovata Rehb. foliis obovatis subtus tomentosis indianis

Habitat in Cap b. spec. 7

fructus ramis albernis teretibus superne tomentosis. Folia sessilia
frequentia alterna integerrima supra subullosa & magnitudine semi
unciculana. Flores ex apice ramorum solitarii. Calyx imbricatus
sanofus squamis ovatis.

Sub Ecloyis servatus in herbario

genus trifolia Eccobis folis lanceolatis glabris. Pedunculis umbellatis
genus trifolia Alb. Conyctis simplicibus folis lanceolatis indivisis natis confertis. Lin. Mant. 469+

L. V. pag. 741.

Habitat in Cap. b. Spei.

Truxta glaber Ramis glabris saxe aggregatis 3-4. scabris e cicatricibus foliorum.

Folia lanceolato linearia vix seminaequilana inferiora ramulorum ^{apice} minor, p^{ar}ta
ca conferta, subaristata. Pedunculi terminalis 3-5 filiformes breves. Calyx umbri
catus squamis oblongis obtusis.

Reth. pedunculata: foliis linearibus villosis, floribus pedunculatis, caulebus diffu-
sis L'Her. n. 7.
Zoegea capensis) Lin
Athenasia pumila)

Belbanca venyata foliis lineari-bus glabris, acuminis recurvo folio brevior, flori-
bus propletis L'Herit. n. 10.
affinis q. forte varietas (Belk. ab Athanopia via nisi corollis rad. cati)

lit

Saxifraga ^{Rock} *foliis* linearibus inquetis peltatis ternisve in cymis, calycibus
globosis subpetalatis n. 12.

an a *Palearctica* distincta, *happus* *subulosis* *apice* *dentatis*
uti, *legua* *omnis* & *an* *b.* *fr.*

Bellidiastrum *Belhania* foliis linearibus tomentosis, floribus simplicibus L. Herit p.
24. 16
Osmites bellidiastrum Her (at *pappus nullus*)

Decussata Rehb. foliis triquetris lineari-bus acutis decussatis, floribus sesquialteris L'Herit
n. 14
nom. 6. mei 5
cum sequente ob calycem majorem supra miscentis majoribus via hui
sus Gebeni omnes & utriusq.

pungens Kelk. foliis linearibus subpungentibus subtus striatis, floribus papilionatis

N^o 13

Belkan. Cava. foliis lineantibus villosis remotis, floribus longis pedunculatis, caecula
erecta
Hab. ad Q. b. p. O

Aeth. vesp. foliis lineariibus Inquetis canopisculis vespidis L. Herct. n. 5

a-b. 16. gaudent floribus foliis anis, antecedentes aggregati

Relb. pasperoides foliis linearibus enerviis, floribus subsessilibus. L'Her. n. 4
folia et flores duplo majores quam in microph. caules erecti nec diffusi
ab usque. differt foliis tagoui, subcarposi adpressis glandulis pedicellatis

Reh. microphylla foliis lanceolatis enerviis confertis, floribus pedicellatis
n. s.

Aelhanu genitifolia foliis lanceolatis acuminatis uninerviis subumbicatis
L. Kunt. n. 2
Athanasia genitifolia L.

Relb. cuneata foliis obovatis glabris, floribus / siliis - prom. g.
Athanasia uniflora L.

Rel. Catenifloro foliis lanceatis villosis, pedunculis lateralibus foliis brevioribus
Ⓞ
Athena septiflora Lin

~~palea~~ ^{Pa} fol.

Reliq. paleae ex foliis lineamentis Inquetis subter funonibusque canescentibus, calyci
bus sesquialibus tubinatis L. Heret. n. 11
Leyfera palea aera den

pumila

Att. pedunculis unifloris, foliis filiformibus villosis
Habitat in Cap. b. p. n.

Rami filiformes pubescentes. folia sequentia sex unguibus
na pedunculi capillares laterales pubescentes folio
duplo longiores glab. Calyx glaber parvus

Belhama