

# Reseda

1. luteola R. foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis, calycibus quadri-
2. canescens R. foliis lanceolatis undulatis pelopis
3. purpurea R. foliis linearibus obtusis, floribus pentagynis
4. psammodon R. foliis lanceolatis; radicalibus undulatis, fructibus stellatis
5. canifolia R. foliis linearibus glaucis planis, floribus trigynis
6. dipetala R. foliis linearibus integerrimis, floribus tetragynis dipetalis: petalis  
indivisi.
7. glauca R. foliis linearibus basi dentatis, floribus tetragynis
8. mediana R. foliis integris trilobisque, calycibus flore brevioribus
9. odorata R. foliis integris trilobisque, calycibus florem aequantibus
10. phytocoma R. foliis integris trilobisque, calycibus florem superantibus sexpar-
11. lutea R. foliis inferioribus pinnatis superioribus trifidis maxime obscure  
dentulatis
12. undata R. foliis pinnatis undulatis, floribus trigynis tetragynisve
13. fruticulosa R. foliis pinnatis apice recurvatis, floribus tetragynis, calycibus  
nec extibus quinque partitis, caule basi fructuoso
14. alba R. foliis pinnatis, floribus tetragynis, calycibus sexpartitis

undata Refda

4. *Cenifolia* R. caubibus basi frutescentibus pendulis, foliis linearibus glaucis  
planis, floribus trigynis

*Reseda alba minor* Bault per. 100.

*Sesamoides salmanticum parvum* 2. Pluf. hist. 1. p. 296. 7. 295.

Habitat in Salmantica & Hispania 4

Caubis basi perennans, caespiti penna asperna ramosis rami  
semipollicari & superius caules plures filiformes basi  
in terdum ramosi, ascendentes, glabri, albi pallide virescenti,  
palmares vel spithamei. folia crassifolia vix unguicul  
lana alterna la obtusa. Racemi bipollicari in terdum  
palmares. Flores parvi, albi

*Reseda canescens* <sup>Lin</sup> Spei plant non system

mediterranea Refda

*Reseda*

*Reseda nilotica* procumbens foliis undulatis flore albo, spica longissima, Capsula semen  
procedente Lippi M<sup>sc</sup>ript

Habitat in Aegypto herb. Mus.

Caulis decumbens, ramosus, subhirsutus. Folia lanceolata, pollucina, utrinque acuta, integer  
rima, plana, pilis raris adpressis. Spica oppositifolia. Germen lineari sive

2 canescens R. foliis lan. cecolatis undulatis pilosis Linn. l. V. p. 440 \*

Symb. bot. 2. pag. 52 \*

~~Peseda hexagona: foliis lanceolatis repandis undulatis; floribus hexagynis~~ <sup>Boiss. det</sup>  
~~Sejaprod et Salmantium parvum 2. Clus. Cl. hist. 2. p. 296. & 295.~~ <sup>pag. 92.</sup>

Peseda alba minor Bauh. pin. 100

Habitat Salmantibus ~~&~~ oriente <sup>4</sup> foliis albis superne ramosis

Caules teretes albi ante pilosi. folia sessilica, altera, sesquiquollia  
ria glauca viridia. <sup>racemosa</sup> ~~fructu~~ terminali spithamou erecto.

Luteola pumila Lessertonia Tournef. 9. l. h. an huc  
Bosiam habet folia undulata herb. mus  
Syn. Bauh an huc

~~Clus. Syn. uti et diff. Spec. pl. alicam fide plant. v. d. d.~~

1. Luteola R. foliis lanceolatis integris basi utraque unidentatis, calycibus qua  
drifidis Spec. pl. p. 644. fl. Dan. t. 164

Lutum herba Dod. pempt. 100

Luteola herba salicis folio. Bauh. pin. 100

Habita in Europa ad rias et pagos 0

Caules erectus striatus, sulcatus glaber, bipedalis saepe ramosis <sup>vel alter</sup>

Folia sessilia frequentia, <sup>obtus</sup> ovata, obtusa, integerrima plana <sup>terminalis</sup>

glabra. Spica terminalis erecta, flores superne confertior

flavescente. denticulus utraque ad insertionem folii

Dens ad basin folii forte an pluribus sed est

Cothinchinensis R. foliis oppositis, floribus axillaribus calycibus 5-parti-  
tis, pedunculis subdivisis L. fl. Cochinch. pag. 299.  
Habitat in agro Cochinch.

Caules herbacei, & pollicari erectus, tenuis. folia lato-lanceolata  
integerrima, glabra, sessilia, opposita. Pedunculi terminalis subdivi-  
si. Flores lutei. Corolla petalis patentibus subaequali  
lacinata. Stamina 10 Capsula 3 valvis apice dehiscens

non vidi.



chinae sic Presda folus lato lanceolatis integris glabris, floribus solitariis  
Inguinis, filamentis copiosis, calycibus 5 partitis Lour. fl. Cochinchin.

no. 299.

Habitat in suburbia Cantonensis Sini

Calicis herbaceus, 10 pollicaris, tetragonus, suberectus. Folia integerrima  
opposita simplicia. Pedunculus terminalis uniflorus flores lutei. Corolla  
5 petala petalis inaequalibus. Capsula apice dehiscent. Stamina 30

non vidi

3 purpurascens R. foliis linearibus obtusis, floribus pentogyris L. L. V.

Sesamoides salmanticum parvum. Clus. hist. 1. p. 296.

Prespa alba minor. 1. Bauh. pin. 100.

Habitat in collibus salmantici, Montpelii

4 Sesamoides R. foliis lanceolatis integris, fructibus stellatis. Lin. 1. V

Sesamoides fructu stellato Tournef. 4 R. 4. 424

Habitat Monpelii C

Caules plures palmari vel fistulari erecti, simplicissimi  
interdum basi parum caespiti vel. saepe unicus. Venter glaberrimus  
Folii lineari-lanceolata, basi versus attenuata unguiculata, radice  
lea parum <sup>et latior</sup> majora sub undulata, superiora plana. Racemus  
terminalis erectus palmari. flos diffusus luteus

26 Diplotala Reseda foliis lineantibus integerrimis, floribus tetragynis dipetalis: petalis  
indivisis Hort. Kew. 2. p. 132.

Reseda capensis caule fruticoso foliis lineantibus ternis, apice mucronatis  
Burm. prodr. fl. Cap. pag. 113.

Habitat in C. b. spei Burmannus

<sup>caulis spinosus</sup>  
Caulis fruticosus, erectus, ramosus. Rami teretes, sparsi, glabri.

<sup>longis</sup>  
Folia linearia, unguiculata, crassifolia, acuta, glabra.

Racemus terminalis. Floris remotiflori.

Calycis foliola sex, minuta, albo-marginata.

Petalis cuneata, integerrima.

7 glauca R. foliis linearibus basi dentatis, floribus verticillatis len. p. v

Refeda linaria foliis Bauh. prod. 42. p. 100.

Refeda linaria foliis glaucum pyrenaeum, flore flamineo Monf. bot.  
3. p. 601. f. 15. t. 1. fig. 4.

Refeda linaria folio, pyrenaeica, glaucifolia Plukh. alm. 317. t. 107  
fig. 2.

Habitat in Pyrenaeis

Caulis sesquipedalis erectus ter glaucus virens, glaber superne

Caulis sesquipedalis erectus ter glaucus virens, glaber superne

mofo: rami simpliciter. Colia alterna, sessilia sili formosa  
basi pendiculi nonnullis albi. Racemus terminalis pitha  
mos. Floe parvi albi.

in Inghiliana  
leafm minor

Specimen cultum

Mediterranea R foliis integris trilobisque, calycibus flore brevioribus Lin Man  
564x S. V. p. 440. Jacq. Collect. 1. p. 141. Symb. Bot. 2. pag

Habitat in Palestina

Caulis plures ascendentes, teretes glabri subtilesque striati, simplicis  
Folia utriusque attenuata, glabra, bipollicaria, integerrima  
glabra, inspicua uncinata, inferiora simplicia, superiora  
trifida interdum omnia integra indivisa. Racemus termina  
lis pollicari palmaris exsertus.

Refusa Tetragyna: tetragyna alba: foliis lanceolatis, repandi  
interdum basi pennatis incisi, calycis dentis supremo equali  
Tostr. descr. pag. 92.

odorata R. foliis integris trilobisque, calycibus florem aequantibus. Lin. Spici.  
pl. pag. 6464

Reseda foliis integris trilobisque, floribus tetragynis Mill. Bot.  
t. 217.

Reseda foliis integris floribus odoratis Hall. Gott. 95. Zinn. 988  
123.

Habitat in Aegypt. &c

Caulis glabris decumbentes, teretes. Folia indivisa, opposita ab  
altero latere, oblonga obtusa. alia trifida laciniis oblongis  
integerrimis, glabris, superiora interdum spida. Racemus  
terminalis bif. Tripolitana

10 phytoloma R. foliis integris trilobisque, calycibus maximis septatis L. h. V  
Lacini fl. auct. 2. 1. 132.

Reseda affinis phytoloma Bauh. prod. 42. & 42. Bauh. pin. 100

Reseda affinis phytoloma Bauh. prod. 42. & 42. Bauh. pin. 100  
III. Reseda minor vulgaris, foliis integris trilobisque Tournef. Fl. Fr. 4. 423

V. Phytoloma Bauh. her. 3. p. 386

Reseda minor vulgaris, foliis integris Tournef. Fl. Fr. 4. 423

Habitat in Gallia, Italia, Oriente

Caules plures, diffusi, semper <sup>decumbentes.</sup> dactylis, ramosi, rami  
pili raris adspersi. Folia <sup>lanicollata</sup> alterna, basi attenuata,  
bipollicaria, glabra obtusiuscula arena, fusca latiuscula  
alia indivisa alia triloba. Racemi terminales ramorum  
digitales erecti. Calycis foliola flore longioribus basi attenuata



11 Lutea R foliis <sup>lanceolatis</sup> ~~ovatis~~ trifidis: inferioribus pinnatis Lin. l. v  
Jacq. fl. austr. 4. t. 353.

Reseda vulgaris Bauh. pin. 100

Reseda lutea Bauh. hist. 3. p. 467

β Reseda gallica Cnippa Boiss. p. 77. t. 41. fig. 3

Reseda masiliensis, foliis lanceolatis Cnippa Pluken. alm. 317. t. 55  
fig. 4

Habitat in Europa australi montibus cretaceis O

Caulis teres, florati squamis albidis otulo aronato videndis ad presu.  
Folia alternis, basi attenuata, trifida laciniis lanceolatis basi in  
terdem attenuati, margine tenuissimo membranaceo denticulatis sub

ut profertim in costa squamis membranaceis albidis? Radicum  
terminalis bipollicaris floes lutei  
Specimen ex horto upsalensi ramosior foliis superioribus indivis

anti phytoma



189 fruticulosa R. foliis pennatis apice recurvatis, floribus tetragynis, calycibus patentibus quinque partitis, caule basi fruticoso Lin. Spec. pl. pag. 6457  
L.V.

Habitat in Hispania. 4

Radix & caulis supra terram perennans, crassitiei saepe duplo mollior  
& in summo apice caules plures adscendentes, laxes striis elevatis,  
folia pennata, pinnis 5-7. Canaliculatis delamentibus, fere unda-  
tis lobatis, apice recurvis. Spicis alternis, versus caulis apicem  
primos. Petala 6-f. 5. alba infida, calycis majora. Stamina 11.  
media inter undatam et albam

14 alba. R. foliis pennatis floribus tetragynis, calycibus sexpartitis Lin. H

p.  
Reseda maxima Lobel. hist. 110. Bauh. pin. 100

Habitat monpelii in Hispania C

<sup>Reseda</sup>  
Folia plana. Caulis in culta bi- / tripedalis fol

4 caule basi herbaceo

nota quibus a fenticulosa distinguitur de f. dero