

Rhamnus

Rhamnus reticulatus s. l. Edgy: 4.

ellipticus - sensu la March
fusca - parvifoliae - la March) het L. March

Rhamnus ^{reticulatus} _{nud} ^{spiculans}, scandens
rigidae. Spanish Town ^{Nud} ^{spiculans}: loculi monoperme pro
Dent

Rhus circumflexa la March est Rapanea

Rhamnus

R. carpiniifolius: inermis, foliis ovali crenatis venoso-reticulatis glabri; fructu fleshi
fl. R. 1 p. 2 p. 40. tab. 60

Habitat in Caucaso et montibus Amuratis

Arbor dum mopus ranaipatuli. Folia brevis simpliciolata minuta, ovato-acuta, crena-
ta pubescens non glabra.

arbor dubia deest enim descriptio fructifications

R. Dauncus enervis, floribus quadrifidis dorsi? foliis oblongo-ovatis serratis venoso

Pallas A. B. app. p. 721. n. 77 fl. Hof. I. p. 42. Tab. 61.

Cornus foliis citri angustioribus Ann. St. P. R. n. 200. n. 270. t. 33. Gmel. Feb. 3.

p. 106. n. 83

Ad fluvia Dania

Cathartes procerus. Rami recti, testaceo canescentes, ramuli suboppositi apice
foliosi. Folia majora quam in R. cathart. sublongata, subalatumata, acute
serrata, glabra longue petiolata. Styma & Dymum. Ballo magnitudine nisi
majore, subdiforme, pleniusque sferico

Sanguineus - Rhinocerus

Rhinocerus Sanguineo foliis ac illaribus glaucis rotatis hermaphroditi, caule erecto,
foliis crassis ovato-lablongisque lineatis integrimis Oct. Dec. pag 87.

Habitat in Hispania Galicia 5

Rhamnus

Rhamnus creticus, amygdali folio minori Tournef. Cor. pag. 41.

Habitat in Preta herb. Tournef.

habeo

casinoides Rhamnus

Habitat herb. La Manche &

Rami glabri, inferne terete, superne tetragonoi. Dolia brevissime petiolatae, semi-pinnatae; oblonga, nitida, avena, encava, glauco-viridia, obtusa, obsoleta remote serrata, conica. Flores axillares, fasciis, tenuiudi

carolinianus Rhamnus

Habitat in Carolina herb. Autum 5

Rami glabi, unermes. Stola petiolata, 2-3 pollicaria, oblonga, lanceolata, acuta
integerrima, subvenosa, costa pubescens lateribus pubulosa. Pedunculi axilla
res, angustulares longitudine petroli. Pedicelli b. petolo dorsi breviores.
Flori hermaphroditi. Hamina 4. stylus 1. styma emarginatum. Baia
triisperma. Petala 4.

minuti flores Rhamnus

Habitat in maritimis carolinae herb. Ruth 5
Primi frumentis. Tantum Tripedalis, densus, niger. Petala 5 que calyx brevis
ra. Stamina 5. Stylus brevissimus, apice torquatus Ruthard. Flores minuti pmi-

Rhamnus

Habitat in India Orientali herb. Aruf.

Rami teretes, glabi, flexuosi, fusi, nitidi, apice leviter pubescentes.
Solia petiolata, alterna, recte pollicaria, ciliata, obtusa, ferrato, ferrulini
muco rotatis, trinervia, etsimque glabra, altero latere basi obliqua.
Caulis dico, alter reditus, unguiculans, tenuis, alter duplo brevior reflexus,
affinis Napeia

ni fallor habeo.

Rhamnus hypericifolius Rhamnus floribus quadrifidis, foliis oblongis basi acutis integrimis.

Rhamnus hypericifolius Tous nef. Gaf. r. h. p.

Habitat. Lib. Fusj.

Rami teretis, purpureo sanguinis, glabri: ramuli infusam deponentes. Sola petiolaria, junta, aggregata cum floribus, semipeltaria, adultera foliaria, mucronata, oblique venosa. Pedunculi plurimi, folios brevioris; uniflori. an ab oleo foliis diversus.

pubescens Rhamnus foliis oblongis acuminatis nervosis subtus villosi

Habitat in Syria herb. Desfont

Daeos Rh. cathartici. Inermis. Ramis Veretis, glabi: ramuli villosi sub
tomentosi. Solia petiolata, alterna, 1-2. pollicaria, oblique nervosa li-
neata, ferrulata, ferrulis frequentissimis, ut nigræ Vachæ mollia. Peduncu-
li at illares, plures, longitudine petioli, vix angustiores. Smetus
semine Gor'andri parum major, glaber.

glandulosus Rhamnus

Rhamnus glandulosus Hort. Kew.

Habitat in Pananis Herb. Desq.

Rami sparsi; Varetos apice pubescentes, angulati. Sola petiolata, pollinaria
vel panum ultra, oblongo-ovata, acuta, basi obtusa, subcordata, obtusa fera
Taybas in versus integerrima, supra nitidissima, subtus obsoletè venosa, glandu-
lae 2-3 ad basin, sive uno altero verso medium, supra convexa, subtriangularis,
velloso-pubescentes. Ramoni axillares, compagiti, folios duplo longiores.

minuti flores Rhamnus

montium septentrionalis ad Floridam
Habitat in Carolina Michaux herb. p. h.

Test 3-4 pedalis densus. Flores minutissimi, diocia. Specie gracili; alterni & spicula brevior, bac
vede bracteolae lato sub angulo flore, rigidula, fibulata minuta.

♂ Palys breviter campanulatus, semisque fides, calcaris erecto patulis oratis, acutis apice in
tropusa incrassatis, ante et pli adhuc subsgonus. Discus inerasatus, 5que ex natu: Petala
5que minuta, calycinis breviora, iisque alterna, superne rotundata formicata, ex
cava inferne angustata, membranacea. Stamna 5: calyci ad ambitum dorsi infesta, petali
incultum involuerat, filamenta brevia. Anthere subovata. Postilli incrementum oblongum
3filiatum.

♀ Pal. mari. Cor. mani sed illa minor. Anthere effusa. Germen depresso globosum, Dorsi bafi
impressum. Stylos breves primi, crassus, apice brevissime 3fidus. Stigmata 3. obtusa. Germen 3 locis
laxe loculis 1 permissi. Bacc a subtilis bracteolata - sub spinosa, minutissimo calyci persistente
bafi cincta. Cava trullifolia. Nucleo 3, abdicatione 1. 2, cover oblique obcordata, planius
fusca compressa, Testa coracea, demum recte lineam longitudinaliter impressum, puncta
dehiscente & quafi leviori. Semen testa conformatum & exaratum non differt. Albumen
subornatum, undeque multitudinis embryorum. Embryo radiculus erectus, magnus. radicula brevis
semia, tereti coroides. Cotyledones complanatae, suborbiculatum oblique obcordatis

pumila Rhamnus

Habitat herb. Des. f.

Affini Rhamno cathartid. Rami erecti; glabri; fructus canticus: folia alterna, sessiles, serrato-crenata, Flores uti folia in ramulis. Folia cuneata, usque crenata, in Tegumento. Style 2. 3. bifida. radetur esse Duroia

cuneifolius Rhamnus rami spicifercentibus, foliis linearis cuneatis interrenimis sub

tus Tomentosus

Habitat in Syria herb. Desfont.

Tundet ramo sisimus rigidus. Rami sparsi, 2-3 pollicares, pubescentes, late glabi.
Folia linearis - oblonga, obtusissima, basi versur sensim angustata, acuta, are
na, supra nitidissima, subtus Tomentosa, linguis alana. Pedunculi 2-3

valentinus Rhamnus inermis, floribus hermaphroditi quadrifidi
trigynis, cappulis trilocularibus, foliis subrotundato-ovatis
subcrenatis Wilden. spic. pl. pag 1096.

Rhamnus pumilus Lavan. cc. 2. pag 65 Tab. 181.

Habitat in regno Valentino 5

non vidi

amygdalinus Rhamnus spinosus foliis nigridi perennantibus can
cedulatis obtusis interzimis utrinque glabris coribus defens
pe. At. pag. 170.

Rhamnus citharus Amygdali foliis minori T. Cor. 4.

Habitat in monte Atlas 5

Rhamnus carpenifoliae Rh. *Ramnus* inermis foliis oblongo-lanceolatis equaliter
dentatis acutis, fructibus spiribus Wild-ppr. pl. pag. 1101
Rhamnus carpenifoliae inermis foliis ovatis crenatis venos
reticulatis glabris, fructu spirali Pall. voss. 2. p. 24. T. 6c
Habitat in Siberia 5

nos. vdc

catharticus R. Gruni Verminalibus, floribus quadrifidis dorsi, foliis ova
ris, caule erecto Ann. P. V. p. Fl. Dan. t. 050

Pervirginea Cord hst. 175

Rhamnus catharticus Baum. p. n. 470

Habitat in Europa sepius

Rami terete glabri. Cortice cinereo. Solia petiolata polliciana
glabra, ferrulata acutifolia supra nervosa pubes. venosae
littera. Pedunculi aggregati corymbose. Flores
glabri

infectorum R. spinis verminalibus, floribus quadrifidis diuersis & cibibus
procumbentibus Lin. Mant. 49. t. 5. p. 233. ger. prov. 462 t
Spina infectoria pumila L. Clus. his 1. p. 111.

Rhamnus catharticus minor Baum. gen. 470

Lycium gallicum Baum. gen. 470. Baum. list. 1. p. 58

Habitat in Hispania, Gallia, Italia t

Rami et ramulae praei patentes recti in formam definiter
cortice supercente apice villoso. Sola ydora una cum flor
bus ex eadem gemma unguiculata fermea subitus venosa perio

ra ope certis velloso reducuntur longitudine petiolorum.

Petala 4 numeris, squamiformes inter lacunae
colyci. Stomata 4 tres

foliis oblongis ^{lanceolatis} ^{lanceolata} floribusque
4 fidis aggregatis ramulis villoso

Lattatilis spenis terminalibus, floribus quadripidis hermaphroditis hen-

Spec. pl. 1671. S.V. p. 233 Gaët. fl. austri. S.V. t. 53

Lattatilis Rh. spenis terminalibus, floribus quadripidis duocoris, foliis oblongis serratis glabris annuis Hort. Kew. t. p. 264

Rami teretes glaberrimi, Ramuli patentissimi purpureo-punctato
in spicam definientes ~~interdum villosas et glandulosas~~
folia petiolo plura et eadem gemma oblonga bafi acuta,
acutipula venusta ferrata subaveneris, unguiculata. Flores
et eadem gemma aefolia

Spina infectiora pumila 2. Clus. hort. t. p. 111.

Lycium gaët. pnumi sylvestris. Stoliczka Baud. pen. 470.

Habita est in montibus Baldensibus. 5

ramosque glabris

folia lanceolata marginata serratis 2-3. spinosis. Rami sparsi cando
flos Rhombea oblonga herb. Ruch. ex Lin

crenulatus Phamomia ramulis prunifertibus, floribus quadrigidis trifidis ve deorsum,
foliis oblongis obtusis serratis semper virentibus Hort. Kew. 1. p. 263.

Habitat in Tenenffat

non vidi

theerrans R. spenis terminalebus; foliis ovatis serrulatis ramis divaricatis
Linn. Mant. 207. & S. V. p. 233

Rhamnus Thea Ofb. N. 232. 161.

Habitat in Phina pauperibus Thea succedaneum;
rami teretes glabri alterni remoti. ramuli horizontales in
spiculae depinctae interdum oposti. Solia alterna oblonga,
obtusepula tenuissime ^{acutis} serrulata lora supra obtusa
ve venosa subter nervosa ad basin ramuli saepe opposte
succedentiae et terminalis ramorum interdum non
bis. trinotatae. flores per intervalla aggregata. Pedunculus
pubescens flores hermaphroditi

Emulatio
foliis oblongis specie atillani butyrariae
cibis subramosis

lycoides R. spinis terminalibus, foliis lanceolatis Lin. L. V

Rhamnus Tedius glabra nigra Clus. Hist. 1. p. 110

Rhamnus Tedius flore herbae, bacis nigris Baeh. p. 477.

Habitat in Hispania;

fructuosa non spinosa rami et ramuli de forni nodulosi glabri
ramuli in spinam definentes. Folia aggregata sene angusti-
fima glabra integerrima semipollucans conspiciula aversa

nonne Rhamnus; satabis, capillaris foliis repibus exasperata

Tournef. 9. 2. 4. p. 593. hinc quoque refiri potest

Amygdales hispanicae satabis capillari foliis sat exasperata Tournef.

Gard. R. herb. p. 628 Dierf.

R. foliis linear. canescolati cuneatisque integrionis ramulis glabris

Habitat in Hispania

*Tristis erectus apice angulat. apice
Rami teretes in punam depinentes. Folia angusta, obtusa sive mucronata rarus acuta leonipollacea aggregata in ramulis junonibus in
adultibus alternis. Stipulae duo parva petiolatae ^{aduncue} flore axillare aggre-
gati uniflori flore hermaphroditi tetrandri
an Rhamnus pentaphyllus Borbonis
fructus oleodes et lexicii*

angustifolium

oleoides R. spinis terminalibus; foliis oblongis integerrimis lato-angulis
2194 S.V.

Rhamnus hispanicus, foliis oblongis integerrimis Tournef. G.R. H. 539

Habitat in Hispania

Pram. verticis glabri in spinam deflexente ramuli sparsi fugiti
breves folios et floriferi. Folia petiolata oblonga subcuneata
glabra non obtusa prope conargente interdum mucronata
basi acuta pubescenti marginae parum reflexa aggregata
cum florib. Flores pedunculati plures quadrifidi tetrandri

accione Rhamnus hispanicus buti folio minor Tournef.
hinc pertinet

oblongi subcuneatis integerrimis floribus aggregatis 4 fido
aggregatis

Rhamnus eretico amygdali foliis minore
ex hysus hinc spectat. specimen in herb. Tourn. sub hoc nomine et syno-
nymo hysi foliis lanceolatis vel oblongis basi versus percurrente ali-
en meo herbario nutritio. Et quod die subulate recensit. an venatio
vel specie distracta

Batifolium Riffini Vernaleibus, foliis ovatis integerrimis Porr. d. 2 p.

127

Habitat in Barbanae

9

non vidi

pentaphyllus. *Rhamnus spinis lateralibus foliis solitario quinatisque Lin S. V. p. 233.*
Jacq. off. 2. p. 17.

Rhamnus siculus pentaphyllus Bosc. sc. 43. t. 21. Paris h. 1626. An hujus generis.

Rhamnus siculus T. Nat. Tom. 3. p. 229*

Habitat in Sicilia, Africa

Trist et rosis ferrugineis: spinos alterius validis, vix piliculis patentibus. Dolia
Basti aut uro usi similia, obovato-oblonga, petiolata, integerrima, levia, venosa,
decidua. Flores astellares, confetti, flosiles, ^{tem} *stermaghoditi*, masculi ferruginei, feminae
squamibino, ovato singulum *lofuleum* vestiunt. Corolla ipsitola, campanula-

tota reflexa, patent, quinquepartita. Lacinii oratus, acutis. Nectarium uncicatum ^{fundi}
ad Elocos eadem florae. Stamina 5. subulata, corolla lere longior. Filamenta alia si ca-
rorgana persistunt, florae. Stigma strata, subulata, alterna, fistulis semilunis, sed breviora. Germen
vix vero signata, strata, subulata, alterna, fistulis semilunis, sed breviora. Germen
mum luteum. Conicum vellosum. Styles filiformis, corolla duplo longior. Stigma simplex
omnipotens orata, glabra. Nutrimenta, beloculans var. *inloculans* Lin C.

Specie ad Valenda cum Boni: plantae Rhus et fida herb. Bonian

Rhamnus
polygamus P foliis ovalibus vel oblongis glabris integris ^{ermissis} oblique
pedunculis parvatis ~~racemos~~ dichotomis

Habitat in Insula St. Thome in West. 5

Arbor ramos teretibus cotice cinerascens ramulis angulatis
folia petiolata opposta ^{vel alterna} venosa, bipinnata vel minima
venosa oblonga pinnatum lata interdum ovalia pinnatis
bino lata pinnata intermedia vel dentibus utraque
tri vel quatuor pinnatis ^{obtusis} basi intermedia. Pedunculi
axillares solitane trifidi dichotomi interdum pedun-
culi 4 or pinnatis flores plures foliis subpedicellatis
fructus ovarus magnitudine Cerapi.

an eadem cum Rhamno fari omphalo

Sarcophalus R. mernis, foliis ovalibus coriacis integerrimi emarginatis
En Am. Acad 5^o. p. 395 & t. V
Sarcophalus foliis ovaliis glabris alternis apice leviter emarginatis
corticis intus ferrugineis Brown Jan 179.

Habitat in America^t

Rami teretes glabri cortice cuneo ramuli angulati glabri puncti-
punctis elevatis. Sola petiolata sed qui pollicaria oblique posita
bifida parum aduta integerrima aerea glabra margine raram
reflexi flore corymbi axillaris brevi flore tetrandri thermaphro-
diti monogyni

an mea huius decripta R. sarcoph. vele ad aliud genus
sub nomine Almanii nupt. Adhuc

Rhamnus
8-9 ferreus Rhamnus inermis, floribus hermaphroditis umbellatis axillaribus, foliis
oblongo-ovatis emarginatis integerrimis glabris membranaceis Tab.
Est Insula St. Lucia missit Dr. v. Rohr et A. West.
Rami teretes, sparsi, coriacei cinerasci, glabi
folia pedata, alterna, polliciana et alba, oblongo-ovata vel ovata,
membranacea, nervis fine nervosa et venosa, utangue glaberrima,
obtusa, emarginata, integerrima.
umbello axillare, brevissime pedunculato. Pedicelli glabri, pedunculo
communi paucum longiori, glabri
(a Rhamno sarcophalo differt foliis non coriaceis, floribus ~~umbellatis~~
~~axillaribus~~, nec pauculato axillaribus terminatis burque)

"
104 107

Rhamnus sarcophalus La Mart. fide herb la Mart.

~~Phamnus hermis; folio~~ ^{flavobrunneum} ~~foliis~~ ^{laminatis} ~~glabri~~ emarginatis

89 Conigatus Rhamnus inermis floribus hermaphroditis pedicellis glabris ubi
gemini, foliis oblongis integerrimis conicae glabris.

In insula S. Eruca legit de West

Rami pari, verdes; glabri, cotidea cinereo.

Folia petiolata, alterna, exequipollucaria, glaberrima, conica, integrerrima, obtusa praezime pallidore flavescens profectione pumina, obtusa, supra vix venosa, subtus pallidiora, avenia, enervia.

Pedunculi axillares, gemini vel terni, vix semiunguis vilares; glabi, uniflori.

Flori glabri.

Germen oblongum, glabrum. Stylus unus, subtilis. Stigma bi-

fidum.

Capsule bivalvis, obovata, stylis vestigio mucronata, buboni loculans semina duas propria materia carnosae a pericarpio non distincte involuta fundo granata, in duas valvulas dehiscentes primos catenulam hyperma interdum biloculans
latus 20-25 radulis punctat

Genus magnum la Marck fide herb ha M.

Cubensis Rhamnus inermis floribus hermaphroditi; capsulis villosulis aliis,
foliis rugosis inde
germinis tomentosis. Lin. S. V. p. 233. Gaugu. Amer. 16. Hort. Lind. v. 3. t. 49.

Habitat in America.

Habitas Viburni Cantano, folia unguis tomentosa. Emetus capsularis Lin

Catigolus Rh.

similioris frangula sed major calycis villoso, quamulo petalo
les

non vidi

voluta Rhamnus

Plut. 25 t. 368 - fig. 3.

52 t. 435. fig. 3.

Tridea anonymous foliis dilatè sessilibus alternis petiolatis
lanceolato-oblongi
Carolina, Lodoicea
In quo diplosporangio nucleus bilobulatus

Dicoria - Dicoria succosa 2 locularis vel abducta 1 locularis loculi
monosporous test. Pint

hybridus Rhamnus cerasiferae, florum androgynis, foliis oblongis acuminata
tis serratis ut peregrinantis L'Herb. p. 5

Habitat — ^t

pater Rh. alpinus mater alaternus

non vidi

Columbinus h. inermis floribus monozynis hermaphroditi erectis, capsulis
tricocca, petiolis ferrugineo-tomentosis Lin. t. V. p. 233.
Jacque Am. host. V. v. 3. 150.

Rhamnus arboreus foliis obovatis venosis Brown Jan. 172.

Arbor balzifera indica, foliis majoribus splendentibus flore
pentapetalio Pom. host. t. p. 175. tab. 90.

Habitat in America, habet fructos.

Prunus Herder, apice nigris tomentosis, subtili foliis ^{subtili} pubescentibus
petiolis petiolata 3-4 pollicaria, basi subcordata, ovata,
acuminata, acuminis obtusa, supra glaberrima. Flores axillares
plures

arbor balzifera acutis foliis longiorae ferruginea vellosa

Planta manu.

Reanthus reeboatus L'Herbarie vel hue vel ad ellipticis

romi flores Rhamnus? glaberrimus foliis lanceolatis oblongis nitidis
floribus minutis per ramos glomeratis propriis Act. Soc. h. n. Bar. 1
pag. 107
Habitat in Amer. merid.

non vidi

ellettii R. inermis floribus hermaphroditis subtrigynis, fructibus trilocularibus, foliis ellettii integris, umbellis axillaribus. Lw. prod. 50. t. 77.

~~tab 29 fig~~

Rhamnus Brown. Jam. 172. t. 29. fig. 2.

Habitat in Jamaica &

Rhamnus ellettii inermis floribus hermaphroditis subtrigynis et
fructibus subumbellatis, foliis ellettii acutis integrimis subtrigynis
villosum pulvi Hort. Kew. I. p. 265.

Apula setacea

ramulicetes ex ferne glabri superne villosum pulvi. Tolea petiolata
decidua & meato alterna, bipinnata et ultra integriforme parum acuminata
nervosa, nervis subtus ferruginea villosum pulvi, stylis longis, ramea
minata. Petoli subbonariis umbello, axillares pedunculato
petolo breviorer, flores tomentosif

umbelli pedunculato

in Tole adhibetur

Portio ad excitandam
fermentationem liquo stylis operi digesta
15 min vanorum dicti

Rhamnus venosus La Monk
fide Herb. Lammarck

Cat. foliis Rhamnus eremis, floribus monogynis hermaphroditis, calyculis vellosi,
foliis ellipticis integerrimis L'Herit. Sertum Aug. n. 4. t. 8. Hort. Kew. I. p. 165
Habitat in Iapulu aeronis 5
Rami terete superne pubescentia foliis petiolata palmata acuta
nervosa venosa, glabra fulva pallidiora cesta pubescentia petiolata
Pedunculi axillares plures uniflori unguiculatae

an mea sada cum L'Heritieri

volubilis Rh. inermis, caule volubili, foliis integerrimis ovatis & rotundatis hen
Sppel. pag. 152. & S. V. p. 233. Gaeger. Poll. 2. p. 336.
Arbor foliis tenuis nervosis alternis Boeth. Legd. b. vol. 2. p. 263.
Habitat in America.

volubilis Rh. inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis oblongo-ovatis
nervosi subundulatis, caule volubili Hott. Kew. 1. p. 264.

Rami veri, ter glabri. Folia bipinnata, mucronata subtruncata
pallidiora veris glabris oblique lanceolatis. Folia eadem modo
encata ac in Rhamno.

myrtinus R. foliis ovato-oblongis integrimis subter luccidis. Burm ad

Zizyphoides R. foliis ovato lanceolatis ^{in cespitosis} subtruncatis ^{lanceolatis} ramosi corymbis
axillaris.

Rhamnus *Zizyphoides* Torft. Gl. aust. append.

Habitat in societate in fulvo

Rami Veretei fusci apice unione : folia petiolata Tripollaea
nei atuta supra secundum nervos linearata subundulat-
subtruncatis ^{lanceolatis} ramosi nervis venosa pedunculis axillari-
ramosi in eani ~~globose~~ magnitudine fusci.

11-12 polifoliae Rhamnus cineraria, floribus hermaphroditis, foliis lanceolatis integreri
mes pectinis tomentosae rure.

Habitat in nova Zelandia? Dedit Dr. Fabricius Prof. Helonensis
Rami Venae; superne tomentosi; cinerei.

Dolia petiolata, alterna, vix pollicaria, superne versus sensim minora
supra glabra subrugosa, subtus tomento niveo testa, mucronata,
integerrima.

Petiole brevissimi; tomentosi

Clavis axillaris, subfoliatae, vix pedunculatae; cinerei, subtrigyna

hydrénis R. foliis ovalibus subdentatis glabris subter albidis Haenq. pl. cam.
alpi t. 2 fig. 2.

22

non vidi

Stremonus R. inermis, foliis ovatis integri glabri scaphelibus ramis tetracordonis

Lin. Suppl. p. 233 153

f. V. 233

Habitat ad Pap. b. spec. 3

Rami et ramuli Stremoni glabri. Folia brevissime petiolata, opposita pollicia
via oblonga subcordata nervosa venosa, glaberrima supra nitida
^{setigera} remota denticulata. Umbello axillares oppositi pedunculatae longi
sed ne fere foliis

— folia oblongis dentatis

en not. w. Galanthi species

Exocarya R. foliis oblongis remotae subdentatae globi
angulatae

Habitat. Dad. I. & l'Herpestes

Rami Teretes glabri folia petiolata via prolligaria q. labra
enervia aperi acutis obtusa unicolorata dentibus latiusque
avenia bafi auctis solitarii aggregati uniflori. Scoria
2-4. pedunculi ad illas foliaris aggregati uniflori.

Furina mensis R. folia perennantes ellipticas anguste dentatae nitidæ
glabri Scop. Del. fl. taf. 3. p. 10. Tab. 5.
Habitat Sunnami

Cugiarinus R? foliis lanceolatis glabris serratis

Habitat in Pap. b. pni d. Tahl. 5

Rami angulati glabri folia petiolata pollicaria ut ~~longa~~^{bafi}
aicta apice obtusifolia mucronata venosa enervia
bafia vespa integerrima pedunculi astillans plures breves

glandulifer Rh. inermis, floribus hermaphroditi racemosi, foliis ovatis obtuse serratis
glabri basi glandulosa
Habitat in Cananis 5

non vidi

fiandeni R. folia puberulis undulato-serratis, floribus dicot. Wall. flor. car.
p. 101.

20

non vidi

carolinianus R-foliae lombri oblongo - ovatis fernatae subperennantibus
floribus hermaphroditi Walt. fl. car. p. 101.

cult-goldei R-folii ovati serrati glabri, floribus ac clancis glabris

Thunb prodr. p. 44
Habitat in cap. b spec 5

29-30

non vidi

fagi folius R. foliis ovato oblongis serratis glabri, cante ^{decumbente} replete
Habitat in Hispania

Caulis teres ramosus superne villoso subtomentosus. folia brevia
petiolata pellucida pallide viride subtus nevosa venosa
acuta fimbriata. Pedunculi axillares breves pauci uniflori.

pumilus & incrassatus, floribus dermaphydotis, foliis serratis hinc Mant.
49 & S.V. p. 234. Gallo coll. 2. p. 141. t. II. Turr. deas. et al. 120

Frangula montana pumila fustatilis folio subrotundo Tournet & G.

R. 44 612. Segu. Veron. 2. p. 296.

Frangula minima nigra prunus sylvestri affinis americæ folia

Raj. dendr. 65.

Habitat in monte Baldo.

Fustulus pumilus fax repens sat adhuc ramosus - crusta
penna ~~an~~ ^{no} rigida rama lobis ramulis sparsis
apice sub pubescens. Sola petiolata sempervirens dicim
nata bafi acuta nervosa venosa glabra pedunculi pauci ampli
ri. Styles bifidæ
affinis cathartico. Sola oblongo

oblongis bafi acuti

repens folia subrotunda acutis acutis intaginatis, canule humelli
mo, flentibus diocesis Vill. pl. Delph. 2. p. 530.

Frangula R. nermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimi mis

Den S.V. 86. Dan. t. 270.

Frangula Dod. pempt. 704.

Alnus nigra var. *lutea* Baeh. p. 420.

Habita in Europa borealis nemorosis hamediaspiliis 5

Frangula R. nermis, floribus monogynis hermaphroditis umbellatis atellanibus
calycibus glabri, foliis ovatis integerrimi liratis Hort Kew. t. p. 264.

Lamini verteret coriace fuscō ramuli subvollopi. Solici bipinnice
na et ultra supra oblique nervosa Ced acuminata. Pedunculi
culi atellaneri t. 4. petiolo breviori peduncula pubescentes uniflori

Daviesii R. foliis ovato-acuminate acute serratis, floribus dicotys
Pall. t. 3. p. 721.

- ann. - nth. p. 200. t. 33.

hybridae *R. folia oblongo-acuminate serratis ut perennantibus*

L. Heret. f. sert. ang. p. 5

Habitat

alnifolius Rh. inermis floribus hermaphroditis, foliis ovalibus acuminatis ferrato
fusco reticulatis L'Heret. Jst. angl. no 2.

Habitat. 5

Ramni varie ^{modo} cretacei et cortice fusio monili alterni
vellopi. Solia petiolata nervosa subtriangularis pedunculi
area pectinatum mucum commixta vidit & Schumacher ex
gallia australi facie omnis Ramni alpini an diversis an
area L'Heretieri vel alia

alpinus R. inermis, floribus dicrois, foliis duplo-ovo-crenatis. L. S. V

Tranquula altera polycarpa Bauch prodr. 160

Alnus nigra polycarpa Bauch. nra 420

Tranquula inermis, foliis ovato-crenulatis Hall. hist. 223 t. 40

Alnus nigra ballifera, rugosiora foliis magiore Bauch. hist. 1.

p 562.

Rhamnus inermis, foliis glabri crenatis Act. gott 349 t. 16

Habitat in Alpibus helvetiis

Rami cordic. ramoso spiculati ramuli alterni vellosi foliosi
et floriferi. Folii petiolata oblongo subrotundata nervo
sa ves glabra oblique venosa prominuente pecten
culi astillares aggregati.

oblos subrotundo oblongi gtt

Cuneata R. inermis floribus hermaphroditis, foliis ovatis cuneatis repandis sub
var reticulata Lin Am. diad. 4. p. 300*
Clœcio ferte coynatus e maderap. fructu vitiis ideo benghalensis
foliis Pluvin. phyt. 122. fig. 4.

Rhamnus zeylanicus, folio subrotundo glabro, caulebus hispatis, spinis
exteguis Burm. zeyl. 100. t. 88.

Rhamnus cuneata Off. & 219. t. 7.

Habitat in Chino elevatis.

Rami verdei Ramuli patens spini pubescentes. Sola petiola
minuta ad alterna, obtusa cum mucrone integerrima utique glabra nervosa
singulare cuneata subtiliter pallidiora. Racemi terminali breves

foliis oblongis nervosis integri
mis planis floribus racemis terminalibus

Sphagopteris R. inermis, floribus hermaphroditis racemulosis, baculis sub
rotundis trilocularibus pellucidis, foliis oblongis serratis glabris.
Sw. prod. p. 50.
Habitat in Jamaica.

*Cyathostylis R. foliis lanceolatis linearibus subtiliter serratis, floribus dicotyle-
dones.*
Pall. t. 3. p. 722. t. 1. f. 1.

Habitat *herb. ter. et horto parvissimo*
glaber vel ex purpureo: ramuli sparsantei: folia alterna, pana-
gote oblongata, base acuta, super angustata supra arcuata, le-
vata, pubescens obsoleta revoluta

alaterrus et *inermis*, floribus diocisis, stigmate triplici, foliis serratis

Lin. S. V. p. 2344

Alaterrus 1. 2. Bluf. h. N. 1. p. 50

Phylica humilior Baub. pin. 477.

Phylica elatior Baub. pin. 477. ^{infuso cicutaria}

Habitat in Europa Australi

Rami purpurascens (arcti) superne pubescens. Folia petiolata
frasca subcionacea officina venosa glabra. Petoli vix sericei
griseulasci. Pedunculi axillares longitudine petiolorum multiflori
variat foliis ovatis et lanceolatis acutis vel obtusis

pedata racemulisstellatis brevifloris

3. folius integerrimus

4. folius linearis oblongis parvis utique bidentatis

5. folios bipinnatis et integerrimis vel mediis peltato-

6. ramis tuberculatis, folio sessu apice rotundato, approximata oblongo
subrotundato, semi pollicianibus, integrum sensu maius rotundis subter-
natis

prinodes Rh. mermis, floribus polygomi, stylis subtriplici, foliis ovatis serratis & Hed
fest. angl. n. s. tab. 9.

Celtis foliis subrotundis dentatis, flore viridi, fructu cuto Burm. afr. 242

tab. 30.
Habitat ad Cap. 6. p. 5