

Rheedia

*latiflora* R.

Kiattupitena Rheid. Hort. Mal. Tom. II. tab. 21.

Habitat in India orientali herb. 4 usq.

Folia radicalia, palmata, glaberrima, quinque nervia: nervi laterales, tri ramos  
venosa, elliptico lanceolati, attenuata, venosa. Scapus striatus, crispis pennis  
columbaris, apice flexuosus. Involucrum tetraphyllum: foliola duo ~~prostrata~~  
cordata, 5-7 nervia: lamina cordata, attenuata, 11 nervia  
nolleana. Pedicelli plures uniflori. Eructus balisae rotundus per ma

Podophyllum belokum



*marguota Rheedii* •

Herbat in Madagascar Com mes-herb-4us-5

Rami teretes, glabri, ciliati. Folia ad apices ramorum, opposita, petiolo  
4o, quinque pellucida, coriacea, oblonga, lata, supra simpliciter venata, palli-  
diora, subtus costa margineque lutea. Petioli semipollicares. Pedunculi  
breves.

latiflora Rheedia Lin. - S. V. pag. 487+

van Rheedia foliis subrotundo, fructu lacteo Plum. gen. 45. T. 257.

Habitat in America.

Arbor ramis articulatis compressis, laxis pubescentibus. Folia  
opposita, petiolata, lanceolata, integerrima, glabra. Petioli  
brevibus pubescentibus. Pedunculi axillares subternis  
fedi triflori Lin.

Planta in herb. Guss. certe diversa ab illa quam superior esse Rh. Lat.  
num vero Guss. vera valde dubium est.

non vidi

forte Mamma