

Rhettia

1. Virginia R. foliis lanceolatis pinnatis, calycibus ^{in dactylis} ~~in dactylis~~ ^{foli}
2. Anichotoma R. foliis ^{se} lanceolatis hirsutis integerrimis, ^{foliis} floribus ^{foli} pedun-
culis uni flori in dactylis ramorum et terminalibus
3. una flora R. foliis pinnatis ovatis serratis, floribus axillaribus solitariis
decandris, caule dactylis
4. menana R. foliis ciliatis
5. acis lanthera R. foliis oblongo ovatis serratis glabris, floribus pedunculatis axilla-
ribus alternis cal floribus quinquefidis
6. Asphodes R. foliis alternis costatis marginis serratis
7. glutinosa R. foliis oppositis trinerviis lanceatis, floribus thyrsoidis
8. purpurea R. foliis oppositis denticulatis coriaceis, ramulis teretibus, floribus
axillaribus decandris
9. Cucurbita R. foliis oppositis castellanis denticulatis coriaceis nitidis, ramulis
tetragonis, floribus terminalibus decandris

3-4. glomerata Fr. foliis lanceolatis integerrimis ^{oppositis} sessilibus ^{hinc} ramis que oppositis
flores pedunculatis terminalibus multifloris

hinc postulat Friend. Richard Melastom. Malloph., alata, hinc deas Aubl. et
Lythrum melanicum

reperi Rhexia foliis ovatis, petiolatis, floribus terminalibus ^{solitariis} diandris, caule repente herboso.

Habitat in Guinea 43 et 4

Caulis 4 trigoni, elongati, ramosi, geniculis pilis longis frequentibus vestiti. Folia unguiculata, trinerviâ, pilosa, utrinque acuta, avenia. Flor breviter pedunculatus, solitarius. Calyx pilis longis, ramosis hirsutus. Corolla dimidio minor quam in grandiflora. Anthera seu longa

^{P. scandens}
^{fermentosa}
^{subtriflora} Melastoma ^{Rhexia} foliis ovatis acutis utraque neq[ue] pilosis subserratis, caule scandente
^{scandens}
Melastoma ^{scandens} caule et foliis pilosis, floribus albis terminatibus Aubl. & C.

Gu. t. 1. p. 435. f. 172.

Melastoma minima scandens, sarmento tenui foliis quinque nervis, ovatis, ciliatis, oppositis Brown. Jan. p. 220.

Habitat in Sylvis ad ripas fluviorum Guiana +

Caules tetragoni ^{infr.} hirsuti villosi. Folia petiolata, quinque nervis, sesqui pollicaria
nei. Strob. Pedunculis axillaris biflori plerumque ternis minores ternis triflori
Foliorum lanicolatum ad utraque ad basim pedicellorum. Calyx 5 denticu-
latus. Corolla alba: Petalis ovalibus. Stamina decem. Pappula 5 locularis
eque valvis +

Or. Lem. species

synonyma Brown. hinc retract

F. nichotoma Rhetia

Ha. J. d. St. Math. In von Peter

1825

Theria
glomerata. flores albi.

Habitat in Summano Dr. v. Prokr

Melanium L. foliis oppositis ovatis, floribus alternis subdeciduis, Caule prostrato. Lin. S. V

Melanium herbaricum retinendum, foliis ovatis oppositis, floribus paginularibus ad alas alternas Brown. Jan. 215

Habitat in Jamaica. 5

Folia scabra

Caulis fere pedalis, subvirescens prostratus ascendens
teretiusculus scaber. Folia petiolata, majora, ovata
acuta integerrima, nervosa scabra. Petioli
mediocres. Flores pedunculati solitarii axillares
alterni fl. parvis majoribus, purpureis. Calyx tubu-
cosus basi dilatatus, striatus 6-10 denticulatus in

pedunculatus

Rhexis speciosa

non ordi

recurva Rhexia

Habitat Cayenne Richard ad rivum pratensis Richard
Caulis herbaceus, erectus, pedalis, ramosus, villosus, puberulosus; tetragonus.
Rami sparsi. Folia prostrata, unguiculata, recurva, ovata, serrulata,
acuta, villosa, subtinnervia. Flores axillares, solitarii, brevissime pedun-
culati. Calyx globosus, magnitudine seminis Conradi: laciniis linea-
ris. Corolla purpurea.

villosa Michx.

Habitat Cayenna herb. Richardi.

Caule herbaceo, tetragono, hirsuto sericeo, 1-3 pedalis, simplex. Folia sesipia, polliciana, ovato-oblonga, integerrima, acuta, quinque nervia. Racemi axillares, foliobreviores, pyrenosae longiores, simplices, foliosi. Flores solitarii, oppositi, hirsuti. Tolum ad basin calycis, ovatum, calyce brevius.

Citrea Rhexia

Habitat in Carolina Richard

Caulis, uti foliorum margini, nervi tres, calyces sexti subhespidi. Sola lanceo-
lata, trinervi

glabella Rhexia

Habitat in Carolina Richard. ^{interdum opposita}
Caulis subtriangulus. Solia ternata, pollicaria, lanceolata, acuta, trinervia, glabra ut
sola planta. Peduncululi dichotomi. Bractea sub calycis, ovata, uti calycis & corolla
extus pilis glandulosis.

Scandens Mexica

Melastoma scandens

Aubl. Fl. Guian.

Habitat Cayenna herb. Richardi

Caulis fruticosus, fermentosus, scandens, glaber. Folia petiolata, pollicaria
vel ultra, sub cordato-ovata, quinquenervi, globosa, serrulata, serraturis seti-
geris, acuta: ramuli juniores, uti folia, propositim nervi sub his ferrugineo
disputi. Flores terminales in capitulo axato, compacto, pollicari

Prunella *herbacea* foliis ovatis vellosis integer nimis, floribus racemosis

Habitat herb. Deffont.

Pauli herbaricus, erectus, & Amygdalus, ut: tota planta villosa - & prope pediculis, ramisque: rami oppositi, simpliciter. Folia petiolata, unguiculata, acuta, albido pilosa, supra acuta, enervia, subtus tri nervia. Racemi ex alis depressis, indivisi, terminaliter bifidi cum flore indivisum, bipollicarem. Flores secundi, distanter. Calycis tubi nati, 5-nati, quadrilobi: lobi rotundi

Rhexia

Habitat in Puerto Rico Herb. Desfont.

Caulis herbaceus, spithameus, erectus, dichotomus, tetragonus, pilosus. Folia petiolata, oblonga, unguiculata, utraque acuta, serrata, glabra, supra avenia, sinervia, subtus trinervia. Pedunculi in dichotomia, breves, uni flori. Capsula nutans, glabra, magnitudine fere peperis nigri. Calycis locinis quinque.

Strogop *Rhenia* folus quaternis oblongis *Strogopis* sepius

Melastoma ciliata β . La Mark

Habitat in India occidentali

Rami tetragoni, rufi *Strogopis*, tenues

recurva Rhexia

Rhexia Act. Soc. Hort. Nat. parif.

Habitat in Cayenna herb. La Mark.

Caulis erectus, vix spithameus, herbaceus, ramosus, piloso-glandulosus, tetragonus
a linearibus decurrentibus. Rami alterni. Folia petiolata, opposita, unguiculata
na, ovata, panem recurva, crenata, trinervia, margine nervisque subtus pilosa
glandulosa, obtusiuscula. Calyx piloso-glandulosus: laciniis quatuor linearibus.
Flores in dichotomia et apice, pedicellati, solitarii

purpurea. *Rhexia* foliis oppositis denticulatis coriaceis, ramulis teretibus; floribus
axillaribus decandris. *Her. prodr.* p. 61.

Habitat

Rami flosci glabri, uti tota planta, trifidi ciliati obscure tetragoni
folia petiolata, lanceolata nervosa subtus pallidiora obscure pubescentia
sive densa, supra arena, bipollicaria extrorsum ciliata denticu-
lata. Pedunculi laterales diphylli uniflori foliis brevioribus. Fructus
magnitudine cerasi

— lanceolato oblongo glabri

~~name~~

Cucurbita Pteris foliis oppositis cartilagineo-denticulatis conatis nitidis; ramis
tetragonis, floribus terminalibus delandis Schw. prod. p. 61.

Habitat in Jamaica;

Rami glabri bifidi fuscentes, cicatrinati. Folia petiolata opposita,
ovato lanceolata inferna subpithata, superiora bipellucana mit dui
sculo, trineria supra avenia subhis ~~trineria~~ subtilissime subveospi margini
punctis oblongis crassis subdenticulata, obtusa. Pedunculi ad axilla super
cum ramulo uterius uterius excrepente, superne foliis duobus lanceola
tis petiolatis longitudine calycis. Calyx magnitudine Cerasti, glaber
truncatus laciniis oque subulatis unguiculatis

villosa Mel. foliis sessilibus ovatis acutis, caule pilosissimo tetragono herbaceo
Melastoma villosa foliis sessilibus, ovatis, acutis; floribus corymboseis
Aub. Fl. Gu. 1. p. 420. t. 168

Habitat in Guiana, pratis humidis O

^{bi. An. pedicels}
Caulis erectus, tetragonus, simplex, pilis cinereis longissimis vestitus. Folia pollicata,
na, utrinque hispida cinerea declinata, integerrima multinervia.

Flores in apice ^{et corymbo} caulis et ramulorum racemose paniculati. Pedicelli
tibi pedunculi ^{et corymbo} hispidi. Bractea bina lanceolata ovata ad basin
pedicellorum Hamana 10

Abbas necesse secundum Richard

Rhexia

Rhexia inconstans, foliis ovatis supra ^{sub}rigidis hispidis setis adpressis subtus incanis trinerviis, pedunculis terminalibus unifloris.

Melastoma ornata: foliis trinerviis, integris rigidis, supra hispidis, setis adpressis, subtus incanis; umbellae quadrifidae terminalibus paucifloris, capsulis hispidis. Swartz prod.: pag. 69.

Habitat in montem in summitate solfaterrae (Vulcano) supra lavam muscis oblectam Ryan 4.

Rhexia
melastoma
calicutense
herb. Guis.

Fruticulus humilis, ramosus. Rami diffusi, ascendentes, inferiores radican-
tes, palmari et ultra, tetragoni, et pulsi ferruginei adpressis frequentibus
hispidi, subramulosi: ramuli axillares, uti rami oppositi, folio brevioribus

Folia petiolata, opposita, vix unguicularia, ovata, obtusiuscula, ciliata;
supra ^{sub}trilineata, avenia, adpressa setis flavescens adpressis, vincta;
subtus incana, trinervia proter nervos marginales, in nervis et costa setis
albidis hispida.

Petiolus brevis, hispidus.

Pedunculi terminales, plani, tres vel quatuor, interdum quintus centrali
reliquis brevior, vix pollicares, hispidi, ferruginei, uniflori, saepe unius et la-
teralibus biflori. Bractea duo in singulo pedunculo parum supra medium,
opposita, sessilis; ovata, ciliata, coctanum glabra, parva.

Calyx quadri- vel quinquefidus; subobovatus, adpressus setis frequentibus, albidis,

apice subglandulosis purpurascens. Lacinia lanceolata, attenuata, setis ciliata.

Corolla. Petala quatuor vel quinque, obovato-subrotunda, unguiculata, rosea, margine
exteriori ciliata: cilio remoto, apice laciniae glandula minuta terminata.

Stamina. Filamenta octo vel decem, erecta, corolla duplo breviora. Anthere oblongae, obtusae, sulphureae, basi parum incurvae, ^{apice inferiori indiviso,} filamentis duplo brevioribus, ~~apice~~

Stylus staminibus parum brevior.

Capsula globosa, glabra, calyce veita aequa brevior.

Multa similia habet cum Rhexia villosa Aubletii, ut primo intuitu facile eandem esse crederes, ~~illa vero differt~~ ^{villosa} ~~stamina~~ differt solum modo, quantum a figura vide se licet lacinis ^{per calycis} fetacis, ^{multo} antheris majoribus apice inferiore bicoloribus.

Numerus staminum ^{perpetuo} maxime variabilis (ex observatione Ryani, qui a septem ad duodecim numeravit, hinc Rhexiam inconstantem vir optimus nominavit

~~Rhexia inconstans folis erectis supra angustis~~

recurva Rhetia herbaeae, subviscido pubescentia. foliis ovatis obtusis serrulatis
recurvis floribus solitariis subsessilibus dichotomalibus Act. f. h. n.

P. l. pag. 108

Habitat in Amer. merid

non vidi

hippida *Alchemia* herbaea ercita brachiata caule hispido foliis oppositis
concoloratis hirsutis quinquenerviis integri pedunculis Ver. menali
bus trifloris Act. sci. h. n. Par. 1. pag. 108
Habitat in Amer. merid.

Angosa Arhexia spicata ulosa ramulis, foliis calycibusque frugibus micumbentibus
buis vestitis foliis papillis Anatis ovatis ad se h. h. Par. l. pag. 100
Habitat in Amer. merid.
an *Melastoma ornata* Herb. Quis
flos terminalis umbellati 4 or rami oppositi, tetragoni Anatis

~~melastoma ornata~~

Melastoma

Grandiflora Melastoma foliis cordatis quinque nervis simulatis caule ^{que} ~~que~~
~~petiolis~~ ~~hirsutis~~, pedunculis bifidis, staminibus quinque stentibus
Melastoma grandiflora caule et foliis hirsutis cordatis acuminatis
flore mollesco Trublfl. Guian: pag. 414. Tab. 160

Ex Rozena mist de V. Rohr. Ex herb. de Lind.

Caulis
vel quatuor
hirsuti
inso pilosissimi

Grami herbae et, hexagoni, uti tota planta, hirsuti.

Folia opposita, petiolata, bipollicaria, parum attenuata, quin
que nervia (prodes nervi marginales) rarisime septem nervia, utrin
que pilosa e pilis copiosis distinctis mollia.

Petiole pollicares.

Pedunculis axillares, oppositi, folio longiores, apice semel vel bis bifidi

Pedicelli uniflori: flori in dichotomia brevius pedunculatae
solum utraque petiolatum ad diversos pedunculi, structura

procer
secund. de V. Rohr

foliorum caulis modo minor.

Calyx subglobosus, lobis quinque linearibus subulatis,
calycis longioribus, intus glabris.

Corolla pedala quinque; unguibus brevibus.

ad album latus

Stamina filamenta 10: quinque in fundo calycis, ~~antheris~~
~~longioribus~~ ~~antheris~~ longioribus, robustioribus, antheris longioribus, lon

Longitudine corollae, ex his unicum genitum relinquit longius. ~~omnino~~
quinque venis in lingua petalorum inserta. Venis a breviora, absque
antheris. Anthera valida, ⁱⁿ ~~rostrata~~ subulatum apice in ^{rostrato} attenua
to.

Stylis Longitudine ^{staminum} ~~staminum~~
^{magnitudine} ~~staminum~~

Capisula globosa, glabra, utrinque sulco tenui et lineis duabus elevatis

ammonia ~~figura~~ ~~capisula~~

~~Figurae et hae: 230. hae postea in St. americanum
St. americanae non comites, sed in St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae.
40. tab. 14.
Stylis non St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae.
comites margini St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae.
to, St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae.
vno St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae. St. americanae.~~

Manana R. foliis ciliatis, calycibus stellatis pilosis.

Lysimachia non papposa, terra manana, leptoneuros, flore tetrapetala
rubello, foliis et caule hispidis femineis hispida Plukn. mant. 123.

Tab. 42 P. fig. 1.

Rhexia manana, foliis ciliatis Lin. h. V. per
humid. Carolina

Habitat in Mantandora, Brasilia

Caulis tetragonus: rami floriferi axillares et terminales bipollicares foliis
4-6 costatis apice bifidi vel trifidi.

obtusifolia O. ~~foliis~~ ^{stipulatis} sesquipedibus oblongis ~~dentatis~~ ^{obtusis} subsessilibus, caule hirsuto
floribus axillaribus sesquipedibus longispinis
Habitat in Amen

Rhexia bivalvis, glabra, decandra, foliis oblongis sessilibus obscure crenatis ^{obtusis} pedunculis ⁴⁰
terminalibus unifloris.

Melastoma bivalvis; caule alato, foliis brevibus ovatis obtusis trinerviis ses-
silibus Aubl. fl. Guian. pag 404. Tab. 155. fig. a.

Habitat in Guiana von Rohr ☉

Tota planta glabra, cinerascens.

Caules ascendens, simplex, tetragonus, angulis membranaceis, articulatus,
articuli unguicularibus, inferis radicantibus; superne ramos uno axil-

lari simplici summo, altero opposito, folio dimidio longior, uni- vel biarticulato, alato.

Folia opposita, sessilia, oblonga, obtusa, versus apicem crenis nonnullis
obscuris, crassiuscula, avenia, obscura trinervia, inferiora articulis
breviora, superiora parum longiora.

Peduncululi terminales, ramorum solitarii, caulis interdum terni, breves, uni-
flori

Calycis laciniis quinque, lanceolatis.

Stamina decem.

Capsula magnitudine seminis coriandri, bivalvis

trivalvis Mel. foliis lanceolatis sessilibus supra ^{glauca} ~~canaliculatis~~ punctatis, caule ~~alato~~ ^{et alato}

Herbaceo.

Melastoma trivalvis foliis linearibus acutis, capsula *trivalvi* Aubl. Fl. Gu. 1. p. 406

tab. 1556.

Habitat in pratis humidis Guiano

et tota planta

planta cinerascens
tamen glabra
inferne coccinea
nervos columbino

~~Caulis ascendens, ^{herbaceus} ~~sepe~~ ^{membranaceis} ~~bipedalis~~, glaber, articulat^{us}, tetragonus alis angulis
obtusis ^{inter} ~~angulatis~~, ^{superne ramo uno altero} ~~obtusis~~. Folia ^{superne} ~~sessilibus~~ ^{longitudine inter} ~~obtusis~~
lanceolata, ^{nodis} ~~intertextis~~ ^{acuta} ~~intertextis~~ ^{superne} ~~obtusis~~ ^{inferna} ~~obtusis~~ ^{suprema} ~~obtusis~~ ^{inter} ~~obtusis~~
subtus ^{intra} ~~intra~~ ^{supra} ~~supra~~ ^{glauca} ~~glauca~~ ^{punctis} ~~punctis~~ ^{numerosis} ~~numerosis~~ ^{impressis} ~~impressis~~, ^{trines} ~~trines~~
nervis triplo angustiora quam in procedente. Pedunculi ^{terminalis} ~~terminalis~~ ^{ramo} ~~ramo
ulorum ~~et~~ ^{caulis} ~~in~~ ^{flori} ~~sel~~ ^{triflori}. Laciniae calycis ^{lobulatae} ~~lobulatae~~
Stamina decem. Capsula ^{triloculari} ~~triloculari~~, ^{trivalvis}.~~~~

41

Rhexia ^{glabra} ^{Decandru} ^{lineari-}
Melastoma Trivalvis, foliis lanceolatis sessilibus supra punctatis, ^{integerrimis} caule alato
herbacea, pedunculi uniflori

Melastoma Trivalvis; foliis lineari-acutis, capsula Trivalvis Aubl.
fl. qu. pag. 406. Tab. 159: b.

Habitat in Guiana non Rohr. C

Tota planta glabra

Cauli ascendens, frithomou vel pedali, ^{inferne} ^(Crassie pennis columbae) articulatus, ~~tetragonus~~, articuli
rot unguitularis, tetragonus, angulis membranaceis, superne ramo
uno alterove.

Folia sessilia, opposita, lanceolata, integerrima, supra cinereo virescen
tia, et dispersa punctis numeris minuti oculo armato videndis, subtus
impunctata, obscure trinerviâ, laevita, triplo angustiora quam in
in bi valvi, inferiora articulis parum breviora, superiora sequentia

Pedunculi in articulis supremis et apice, solitarii, uniflori, longitudine
folii.

Calycis laciniis subulatis.

Stamina 10.

Capsula magnitudine seminis conandi

~~Rhexia~~

Rhexia longifolia, pilosa, decandra, foliis lanceolatis integerrimis triner quinque nervis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis foliis brevioribus. Habitat in America meridionali von Rich.

Caulis herbaceus, laxi, angulati, et pilis longis densis adpressis cinereo-flavescentes.

Folia petiolata, opposita, remota, tri vel quadri polliciana, pollicem lata, sursum sensim minor, lanceolata, attenuata, acuta, integerrima, utrinque adpressa pilis longis adpressis, subtus pallidiora, ^{nullo} ~~tribus~~ ^{tribus} triner via; nervi laterales supra basin in ramos duos parallelos divisi.

Petiolus ^{vix} pollicaris, pilosus, cinereo-flavescent.

Pedunculi bis bifidi, cum flore pedicellato in singula dichotomia, piloso cinerei, axillares oppositi, terminales terni, longitudine petioli: parvales pedunculum universalem squantes: pedicelli semiunguiculares.

Calyx oblongus, griseo-hirtus: Lacinie quinque, subulato, intus colorate glabra

Anthera longitudine filamentum acutiusculum incurva. Petala quinque, oblonga, calyce dimidio longiora, ciliata. ^{sufflexuosa} Stamina ^{vix} ~~parva~~ ^{longiora}, ~~structura congenerum.~~ ^{filamenta distincta, adentula.}

Capsula subglobosa, calyce brevior, apice hirta, quinque valvis. Valvulae ovate, acutae.

Receptacula seminum quinque, incurva, superne libera, scrobiculata, nigra.

Semina copiosa, minutissima

(Accedere videtur ad Rheum hupidam in Act. sci. hist. nat. Paris. t. pag. 100 e
Descriptione autem nunc non liquet num specie differat nec ne

glomerata R. foliis lanceolatis integerrimis sessilibus ^{tr} hirsutis ramisque oppo-
sitis, floribus terminalibus glomeris subaggregatis pedunculatis
Plectra glomerata, caule ramose hirsuto, floribus glomeratis
pedunculatis, calycibus hirsutis Rottb. Desf. pl. Surin. pag. 8.

Tab. 4. ~~Pl.~~
Habitat in pratis depressis Surinami.

Caulis herbaceus erectus, officinae Tetragonae, uti tota planta, pilis
fulvis adpressis, ramose hirsuti elongati ramosi. Folia, hinc
vix acuta, pollicaria remota, a pilis adpressis hirsuta. Pedun-
culus terminalis pollicaris 4-6 flori. Calyx ultra medium
pilis stelliferis hirsutus.

41-42.

obfcurum Solanum

^{inter planis} ^{ullosis}
foliis elliptico-lanceolatis sube pubtus tomentosis
racemis lateralibus, caule petiolatis, foliisque subter aculeatis

Habitat in Cayenna

fruticosa, inferne glabra, purpurascens, superne tomentosa.
aculeata: aculeis reflexis, ^{subter} glabris, paucis.

folia petiolata, bipollicaria vel ultra, utroque acuta, basi altero ^{marginati}

integra
delinatur

Cater^a parum brevior, margine plano, vix repanda, supra pilis stellatis rari-
bus adpressa, ^{int. eximie} subter teretibus et tomentosa, pubtus interdum aculeo cano
alterose parvo plerumque inermia & ^{subter!}

Petiolis pollicaris, tomentosis, aculeatis. aculeis subter latis, rectis, uno
vel altero.

Racemi supra foliacei, breves, nutantes, tomentosi.

Calyx laciniis quinque dentatis

Corolla extus villosa, quinquefidia, laciniis lineari-bus

manana *Rhexia foliorum ciliatis* Linn. l. V p. 357

Lysimachia non papposa, Terre manana, leptomeneus, flore setosa
petalo rubello, foliis et caule hispide ferruginea hispideis Planch
mont. 123. T. 420. fig. 1.

Habitat in maritima, Brasilia.

Calyx adpressus setis apice pellatis Linn. Spec

non vidi

Arisaema Rhexia floribus alternis axillaribus pedunculatis quinquefidis
Linn. Am. 4: p. 396 & S.V. p. 357.

Arisaema erecta ramosa, ramulis quadratis, foliis trinerviis ovatis
-crenatis oppositis, floribus singularibus Brown. Jan. 217. t. 22. fig. 1.

Habitat in America 2

Caules lignosi vixati. Rami ramuleque alterni, acute tetragoni
Folia opposita, subpetiolata, oblonga ovata, argute serrata, nuda
Flores axillares solitarii, pedunculati: pedunculo floribus brevior
re. Rhexia virginica folia lanceolata, hispida et peduncu-
li terminales trichotomi Lin.

uniflora Rhexia ^{pilis viscosis} foliis petiolatis ovatis serratis, floribus axillaribus
^{decandris} solitariis, caule dichotomo

Habitat in Cayenna Dr von Rohb. ex herb. Dr Linn

Caulis herbaceus, dichotome ramosus, ex alis quatuor decurren-
tibus tetragonus, pilis apice glandulosis ^{ut in foliis} adpressis, viscosis.

Rami filiformes.

diversa a Rothb.
breviorne pilis in calyce
non stellati

Folia petiolata, semiinquinulana, acuta, ^{apice adpressa} pilis raris ^{bu} depressis, obscure trinerviis, margine e pilis glandulosis ciliata, serrata: suprema angustiora, sublanccolata.

Petiolus folio brevior, pilis apice glandulosis ciliatus.

Pedunculi axillares et in dichotomia ramorum, solitarii, ^{et reversi} flexuosi.

Calycis pilosi.

Petalis lanceolatis.

accidit ad circipathum
tam sed nec in descript
nec in figuris aliquid
14 De pilis glandu
liferis com mura
notat metathesum

Stamina decem, petalis longiora ^{capillari} filamenta 6 super geminata geni-
^{culo oppositi} culata ^{et oppositi} geminis flans ^{et oppositi} crassioribus
Capsula subglobosa, magnitudine seminis Coriandri ^{habet ostia tribus}

gledinosa Rhexia folus oppositi in nervis lobus, f. lobus thyrsoides Lin Suppl. p. 216.

Habitat in nova granada f

Arbustula frondosa, melastomifolia; ramulis articulatis, alternatim canaliculatis. Folia petiolata, congestifolia, elliptica, integerrima, pollitana. Flores pedunculati vix folus longiores. Calyx monophyllus campanulatus, quadrifidus patulus. Capsula infera quadripartita f. quadrilocularis calyce brevior, obtusa, loculis perdistinguentibus, polypserma. Summitates ramulorum et calycis gledinosi Lin C. v.

elliptica

Fusoides Rheia foliis alternis costatis margine scabri Lin Suppl. pag 215 + P.V.
pag 3 57.

Habitat in Summano

Frutex pubescens uti pedunculati et fructus, quadripedalis. Folia pubes-
centia, confertiuscula lanceolata, vix digitalia, magis triunda,
et minutis pinnis serratis margine scabra. nervis pubes prominulis.
Flores axillares solitarii, pedunculati, vix foliorum longitudine, flavi
Perianthium fere superum, lanceolatum, acutum, patens, persistens
Petala subovata calyce duplo longiora sessilia. Germen inferum
villosum longitudine calycis. Stylus cylindricus longitudine staminum
Stigma recutitum semicolum. Capsula obovata tetragona
longitudine calycis apice inter calicem lacinulis quatuor
quadrilocularis?

virginica Rheticia foliis ^{stovaceo} ciliatis serratis sessilibus, calycibus glabris

Alifanus vegetabilis carolinianus Pluk. Amalth. 8.

Lysimachia non papposa, virginiana, tuberano foliis hispitis, flore tetra-
petalo rubello Pluk. alm. 235. t. 202. fig. 8.

Rheticia virginica foliis sessilibus serratis, calycibus glabris Lin. Spec. pl. p. 491.
S. V. p. 57.

Habitat in Virginia

Caulis prostratus, tetragonus, angulis membranaceis ciliis remota ciliatis
folia opposita, lanceolata, ^{longius mollis} internodiis longiora, sessilia, Innervia,
pilis vagis hispida supra, subserrata, inferiora obtusa. Pedunculus
terminalis, dichotomus. Flores ex dichotomia solitarii, subsessiles petalis
rubris: Antheris foliatis luteis

glomerata Rothb.