

# Rhinanthus

1. orientalis R. corollis labio superiore subulato incurvo
2. elephas R. corollis labio superiore subulato recto
3. Erysta galli R. corollis labio superiore compresso brevior.
4. tuxago R. calycibus hirsuto tomentosi, bracteis ovatis attenuatis serratis  
calyce longioribus, foliis obtuse serratis
5. capensis R. calycibus tomentosi, bracteis ovatis integerrimis longitudine  
calycis, foliis lanceolatis obtuse serratis
6. trifidus R. corollis faucibus patentibus, foliis trifidis
7. indica R. foliis sublanceolatis pilosis integerrimis
8. Roemeria R. foliis lanceolatis serratis pedunculis axillaribus oppositis
9. virginicus R. corollis faucibus patentibus, foliis sinuato-dentatis

*Troxago* R. calycibus hirsuto-tomentosis, foliis oppositis obtuse serratis, caule simplicis  
fimo Lin S. V.

*Antirrhinum folio dissecto* Bauh. pin. 211.

*Chamaedrys unicaulis pinnata* Bauh. pin 248.

*Troxago apula unicaulis* Colum. cyphr. 1. p. 199. T. 197. Monf. hist.  
in p. 427. f. 11. T. 24. fig. P.

Habitat in Palästina, Italiae montibus maritimis humantibus, inter  
juncos (in Barbaria andis an per. diversa?) O

Caulis erectus palmatus vel pedalis simplex saepe ramoso uno  
vel altero opposito, sulcosus ter inferne hirsutus. <sup>folia</sup> <sup>avincula</sup> <sup>opposita</sup>  
opposita sessilia, lanceolata, remote serrata. Spica  
terminali bipollicari imbricata. Bractea cordata  
attenuata ter inferius serrata summo sub cymis  
velut subtomentosa. Calyces fructiferi orati

caulis pilis parvis  
nanonibus

bracteis oratis attenuatis, <sup>serratis</sup> calyce longis

*Rhinanthus versicolor* Pant. d. pag. 208. huius forte pedunculis

*Rhinanthus?*

Pediculari orientalis annua p. hyllii folio, flore faescente Tournef. Cor. p.  
Habitat in Oriente herb. Desfont.

Caulis filiformis, palmatus vel parum ultra, simplicis formi, superne uti tota  
planta villosa v. pub. . Folia opposita, semipollicaria, suprema alterna, integra  
rima. Flores axillares, sespites, folio breviores. Stylus latio superiore parum  
longior

Longifolius Rhinanthus.

Pediculari cetera fructu maxima lutea Tournef. Cor.

Caulis erectus, villosus, tetragonus. Folia sessilia, sesquipedalium, remotissime obtuse serrata, nervosa, glabra, margine ore latis subulata. Bractea cordata, acuta, longitudine calycis, uti ille villosa

*Longifolius* *Rhynanthus*.

Habitat in

herb. Fusf.

Folia sessile, lanceolata, bipollucaria, remote obtuse serrata, glaberrima.

affinis *Truxagina*

orientalis R. corollis labio superiore subulato incurvo Linn. Spec. pl. pag. 1404  
Elephas orientalis, flore magno probofide incurva Tournef. Corol  
40. Ann. 2. p. 299. & 299.

Habitat in Oriente. herb. 4. 1.

Palyx quadrisfidus: lacina prima (sub rostro corollae) ovata; lobes  
tertius utrinque reflexi; quarta recta obtusa Linn.  
Pauis herbac. us, erectus, subumofus villosus. Folia sessilia, cordata  
acuta, obtuse serrata, villosa. Flori super ne, oppositi, solitarii pedun  
culati. Pedunculi capillares, uniflori. Palyx pilosus. Labrum superius  
Corolla curvatum, apice dilatatum

~~non vidi~~

elephas B. corollis Cabri superiore compresso brevior subululato recto Lin. Spei.

pl. p. 0407

Scordio affinis elephas obflorem Bauh. pin. 240.

Elephas campositarensum Col. Epiph. 1. p. 106. t. 100.

Euphiropia lutea, flombus elephantis caput cum proboscide referentibus Monf. bot. 3. p. 432. f. 11. tab. 24. fig. 14.

β Elephas orientalis, floe parvo, proboscide juncta Tournef. corol. 40. t. 3. p. 547

Habitat in umbrosis Italiae

Caulis erectus tetragonus superne villosus, rami folii flompen axillaris breves, simpliciter. Folia inferiora subpetiolata superiora sessilia, opposita oblonga nervosa obscure venosa pollicaria, <sup>remota</sup> serrata vel ultra serrata obtusa glabra pediculi <sup>superne</sup> axillaris solitarii, uniflori oppositi folio flora breviori. Calyx et pubescenti.

*Crusta galli* R. corollis labio superiore compresso brevior Lin. l. V. fl. Den.

a. *Pedicularis pratensis lutea* f. *Crusta galli* Bauh. pin. 163.

β. *Crusta galli angustifolia montana* Bauh. pin. 163. prod. 86

γ. *Crusta galli mar* Bauh. her. 3. p. 436

Habitat in Europa pratis ☉

Caulis fere pedalis erectus, ramosus. Verticillus, rami simpliciter  
folia simplicia opposita, lanceolata serrata, serraturis margine recur-  
vatis scabris, oblique nervosa, nervis oppositis, prolecanis et  
ultra: floralia basi latiora dentibus profundioribus attenuatis  
Calycis oppositi simpliciter late orati.



*Alectrolophus* R. corollanum labio superiore compresso breviori: aunculis truncatis, calycibus villosi

Hall. bot. no 314

melicy nondum vidi an me revera distincta species a  
*Rhizanthe cincta* galli

Caperis B. Calycibus tomentosis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis dentatis. Lin. L. V  
pag. 544 \*

Bucknera africana, foliis dentatis oppositis, calycibus subtomentosis fructu  
longioribus Lin. Spec. pl. pag. 879 \*

Habitat ad Cap. b. spec.

Planta facie Tortaginis ex speciatione nigra uti illa. Folia  
lanceolata utrinque dentibus 3. 4. spec. oblonga. Bracteis  
tomentosis ovatis parum acuminatis. Calycis tomentosi  
quadrisidi obtusi. spec. longior quam in Tortagine.

Congoladine calycis Negemini

foliis linearibus lanceolatis

serficolor R. foliis subcompositis lanceolatis lineariis serratis, serraturis distanti-  
bus, calycibus brevibus obtusis Lamour.  
Habitat in Barbana

in a Rh. Inxagine diversis? michi non nota

maximus R. foliis ovato-lanceolatis serratis pinnatis: supraculis alternis, calycibus  
sulcis acutis Lamk.  
Habitat in Babana

mihi hanc nota

42 ~~trifida~~ Bardha foliis oppositis trifidis. Rh. pantheris,  
56 trifidus Rhinanthus corollis laminae patentibus, foliis trifidis

Pediicularis orientalis supina foliis trifido flore magno flavo cente Tournefort  
fort. Coroll. pag. 9.

Pediicularis annua chamopityos facia Burbaam. Cent. 1. pag. 5. tab. 8.

Habitat in Armenia O

Caulis herbaceus, ascendens, simplicis spinus, subtomentosus, teres, spithameus.

Folia opposita, sessilia, approximata, pubescentia, nervosa, profunde trifida; ~~pubes~~  
laciniis linearibus, divaricatis, integerrimis, acutis, pollicantibus.

Flores ex omnibus axillis a basi usque ad apicem, solitarii, oppositi, sessiles.

Bractea linearis, villosa utrinque ad basin sui guli floris, figura et longitudi-  
ne lacinarum foliorum

Calyx ~~rotatus~~ rotatus, pubescens, inflatus, membranaceus, lineis elevatis, quadri-  
fidus: laciniis linear-lanceolatis longitudine foliorum

Corolla bilabiata <sup>calyx major</sup> ~~extus~~ puberulosa. Labium superius integrum inferiore  
acutum, porrectum: inferius longior, trilobum, ~~laciniis~~ laciniis lanceolatis. sauc  
aperta

Stamina filamenta quatuor glabra sub labio superiore. anthera basi bifida mi-  
micronibus bilocularibus, inferne aperta.

Stylus longitudine corollae, linearis, subullosus, stigma truncatum germen  
germen ovato-acuminatum. Stylus longitudine corollae, linearis, subullosus. Stigma  
nunciatum

Capsula ovata, acuminata, bilocularis, polysperma

[Lit. M.  
p. 45.]

( Capsula Battis fere ad Calyx Rhinanthi

indica Pl. foliis sublanco-latis pelosi integerrimis <sup>Len fl. zeyl. n. 2307</sup> Burm. ind. 131. t. 39. fig. 1.  
Hysopus zeylanicus Tenellus pratenfis Burm. zeyl. 122.

Habitat in Zeylona.

Herba perthamoa. Caulis erectus simplicissimus tetragonus, pelosi  
nervi. Folia opposita, ovali-oblongo-lanceolata pelosi  
bina, integerrima parva. Flores ex alis superioribus, simplex  
solitarii, oppositi, secundum unum latum versis. Calyx  
ventrosus compressus femiquadrifidus. Corolla 1 petala  
nogens. anthera bifida barbata. Capsula subrotunda  
compressa bivalvi, biloculari, dissepimento contrario  
hanc.

Burm. zeyl. ind. t. 39. fig. 1. hui non pertinere videtur cum  
folia serrata

~~B. Platanus~~  
non vidi

*Honigya* R. ? foliis lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus oppositis  
habitat in Andria orientali Honig

Caulis erectus simplex. palmatis vellosus. Folia sesplea opposita  
unquiculana, inferiora minus apicem versus serrata  
inferne integerrima. Pedunculi solitarii uniflori foliis  
brevioris, fructiferi patentissimi. bractea duo setaceo ad  
basi singuli calycis laevius calycis 5. setaceo.

figura Murman. tab. 39 fig. 1. huius potius auctor  
sede Honigya huius retuli verum tamen credo lupini generis



virginicus Pl. corollae faucis patentibus; foliis sinuato-dentatis. Gron. Virg. 192

L. V.

Habitat in Virginia

non vidi