

Rhizophora

1. gymnochera R. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis unifloris
calycibus multipartitis
2. conjugata R. foliis ovato-oblongis obtusifidis, calycibus seplebas
fructibus cylindricis subulatis
3. mangifera R. foliis lanceolatis ellipticis, pedunculis axillaribus subnao
is, fructibus subulatis clavatis
4. candel R. foliis oblongis obtusis, pedunculis bigeminatis folio
longioribus, fructibus subulatis
5. cylindrica R. foliis lanceolatis ellipticis, pedunculis subbi
floris, fructibus cylindricis obtusis
6. corniculata R. foliis obovatis emarginatis, pedunculis ter
minatis pluribus unifloris, fructibus anuatis abbe
natis

Candel *Rhizophora foliis obovatis, pedunculis bigeminatis foliis longioribus, fructibus*
tubulatis L. Sp. pl. 634. P. V. pag. 442.

Tierce - Candel Rheid. Mal. b. p. 63. tab. 35. Raii h. 1770

Habitat in limosis salis Indict.

arctius cicutifoli

Rami ^{articulati} inferne laces cortice fusco superne alternatim tuberculati posticajum

*Cicutifolius
rotundatus*

foliorum. Folia sesquialtera apicem ramorum conferta, opposita petiolata, obtusa

obtusata basi angustata vel obovata glaberrima, coriacea arenaria ante

germina sequi pollicaria. Pedunculi axillares solitaria sesquialtera apicem

ramorum angulati bis bifidi. Flores sessiles basi squamosi. Calyx ^{foliolis}

caricollatis ante et postea tetragonis

acuminata Rhizophora

Habitat in insula francica herb. Guss.

Rami teretes, cicatricati, crassitie pennis clypeos: ramuli compressi. Solea petio
lata, opposita, tripollicaria, ^{ovata} ~~ovata~~, acumine subulata fere unguiculata ter
minata, conacea, arenia, enervia

Calyx 4partitus. Petalaeque, intus villosae, calyci insertae. Stamina ♂. duo in
singulo petalo. Stylus unicus. Stigma unicum. Guss.

Gymnocliza R. foliis ovato-lanceolatis integerrimis, radice terro superimposita
Linn. S. V.

Pandel Rheed. Mal. 6. p. 57. t. 31. 32.

Manuum celsum Rumph. Amb. 3. p. 102. t. 60.

Habitat in India ripis salis

Folia petiolata alterna ad apices ramorum congesta
acuminata integerrime, supra nervis venosa subtus
enerviata. Calycis decempartiti, corolla longiores, lacini
lineati lanceolati

pedunculis unifloris

- Calycibus multipartitis

²
conjugata Rh. foliis ovato-oblongis obtusiusculis integerrimis, calycibus ¹⁸sespilibus,
fructibus cylindricis-jabulatis. Ca. fl. Dec. p. ~~447~~

Habitat in Andia;

Folia petiolata glabra, ~~roots oblonga~~. Calycis gemini sespiles
fructus longissimi nutantes

pentagona Rhizophora foliis ovato lanceolatis oppositis, fructibus penta-
gylatis, petalis decem. Lour fl. Cochinch. pag 297.

Habitat ad ripas Cochinchinae.

Arbor med. visis, ramis tortuosis. Folia integerrima, plana glabra. flo-
res rubri subterminalis foliis. Calyx campanulatus, 10 partibus. petala
oblonga emarginata, ciliata, calyci subaequalia. Stamina 20 calyci
inserta. Germen oblongum. Stylus subulatus. Stigma obtusum. Sili-
qua oblonga recta obtusa, continet conaeo glabro nucleos tereti

mangle R. foliis acutis, fructibus subulato-clavatis Linn. l. V
 mangle arbor pyriformis, fructu oblongo tereti summis ramis radiceosa
 Pluken alm. 241. t. 204. fig. 3.

• Candela americana, foliis laurinis Cat. car. 2. p. 63. t. 63.
 Rhizophora pedunculis bifidis trifidisque, fructibus subulato-clavatis

Rehndel Gaëq. hist. 141. t. 29.
 Rheed. Mangle pyriformis, cum pl. ignis longis, fidei indiae affinis
 mat. 6. n. 61. Mauh. hist. 1. p. 415.

Tab 34 Rehndel Rheed. mat. 6. p. 91. t. 34.
 mangium candelarium Rumph. amb. 3. p. 100. 71. 72.

Habitat in paludibus Caribaeum, Malabano. &
 Aerni venter cicutiati. Folia ad apices ramorum congesta
 petiolata, glaberrima, tri vel quadri pollicaria, integerrima
 supra nitida obscure nervosa subtus repulgentia exar
 vici. Pedunculi axillares solitarii uniflori vel biflori
 longior. Folia in planta knella primo anno opposita
 foliis lanceolato ellipticis pedunculi axillaribus
 solitariis unifloris bifidis subbifloris fructibus

Specimen a Surinamo
 genui Pedunculo
 Dichotome ramis

Candae. A foliis obtusis, pedunculis bigeminatis foliis longioribus, fructibus setulatis

Lin. l. v

Sierou-Kandae Rhed. Mal. b. p. 63. t. 35.

Habitat in India Salsis.

— oblongis

descriptio habetur inter Sprengeri

4
*
Eylendria fr. fructibus Eylendria obtusif. Lin. 1. V
Nan. Vandel. Rheed. Mal. 6. p. 59. t. 33.
Mangium minus Rumph. amb. 3. p. 106. t. 69.
Habitat in uliginosis Malabarae &
Solia lanceolata elliptica

folia lanceolata elliptica, fructi pedunculati sub biflori
fructibus

6
Corniculata R. foliis ovatis, floribus confertis, fructibus annuatis acuminatis
Linn. S. V.

manquam fruticosum corniculatum Rumph. amb. 3. p. 117. t. 77

Habitat in Moluccis

Rami fulcati glabri, folia petiolata alterna glabra, subco-
nata bipollicaria basi acuta, emarginata in nervis
nervoso-venosa. Pedunculi ex apice ramorum plures ter-
ter. unguiculati glabri, uniflori. Fructus sesquipollicar-
is attenuatis

Pouhaendel. Hb. mal. 6. p. 65. t. 36

foliis obovatis emarginatis, pedunculis terminalibus
pluribus, fructibus annuatis attenuatis