

Rhus

3d & cap 6-pai  
Thunberg glaber foliis pennatis, 3-4 pinnis  
rel. e cap-6-pai

corana Rhus folioli ovalibus; obtuse serratis subtus villosi internodiis extremis  
membranaceis

Rhus corana Dod. perempt. 779.

Rhus foliis ulmi Bauh. Pin. 414

Rhus corana foliis pinnatis obtusis serratis ovalibus subtus villosi.  
Linn. H. V. p. 292.

Habitat in Europa australi, Syria, Palestina;

Præcipue pelosi. Folia semipedalia pinnata 5-fida. Soleola oppo-  
sita simplicia sesqui pollicaria subtus mollia interiora minoria  
obtusiuscula basi indurata infima altero latere pagum  
angustiora. Petioli pelosi semper articuli duobus ultimis  
membranaceis alatis. Panicula elongata, contracta, terminalis  
longitudine sæpe foliorum. Bractea linearis obtuse villosa  
siccis

Dentatum R. foliis obovatis ~~indentatis~~ mucronato - dentatis glabris  
caule scabro Thunb. prodr. pag. 52  
Habitat in Cap. b. sp.

non ind.

alatum

R. foliis ovatis apice serratis, petioli internodiis omnibus alatis  
Thurb. prodr. fl. Cap. pag. 52  
Habitat in Cap. b. p. 5.

non vidi

Zonitum R. foliis <sup>obliq.</sup> varicatis ovatis obtusis pinnatis subtus villosis  
Saunders. prodr. pag. 52  
Habitat in Cap. b. Spei

mibi ignotum

eadem forte ac heterophyllum

radicans Rhus folioli subpetiolatis ovatis integerrimis caule radicante Lin. b. v.

neg. 293.

Toxicodendron amplexicaule, foliis minoribus glabris Dill. Elth. 390

β. Toxicodendron rectum, foliis minoribus glabris Dill. Elth. 389. t. 291.

fig. 375.

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis et rami hinc inde radicales emittentes: <sup>altero lateris angustioria</sup> glaber. Folia petiolo  
bipollucaria vel <sup>4</sup> lateralibus subsessilia: terminale petiolatum ellipticum acuminatum  
ultra glaberrimum + unum. Petiolus longitudine foliolorum, supra planus petioluli  
venosa acuta apice tomentosi. Panícula axillaris sesquipollucaris

toxicodendron Rhus foliolis petiolatis angulatis integrisque pubescentibus caulis  
radicante Lin. S. V. p. 393

Edera trifolia canadensis Corn. canad. 96. t. 97. Bamel. H.  
220.

Sitis canadensis Muell. phytogr. t. 60.

Arbor trifolia venerata Virginiana, foliis hirsuto Raj. h. 1799.

Habebat in Virginia, Canada &

similis h. radicante et foliis dentato angulatis, <sup>et</sup> serratis incis  
foliolis que sunt villosi ad altera supra glabra.

Waltheri varietas ex America boreali. Rami angulati, glabri. Folia longe  
petiolata: foliola inciso <sup>hirs</sup> pinnatifida, basi acuta: laciniis oblongis ob  
tusis dentatis subtus villosis supra scabriscula, basi integerrimis: junio  
ra inciso lobata utraque villosa. Petioli univales et palmatae superne  
villosa canescentes herb. Leston  
oratis

foliolis, utro

latis

aromaticum Rhus-folii-ternatis: foliolis sessilibus ovato-rhombicis inciso-serratis  
pilo hispidis Hort. kew. 1. p. 3 67.  
Habitat in Carolina 5

non vid.



leavedens Rhus foliis ternatis: foliolis sessilibus cuneiformi rhombeis in iis serratis  
his glabris Hort. Kew. 1. p. 360.  
Habitat in America septentrionali &

non vidi

villosum Ahus folioli obovatis sessilibus <sup>integris</sup> ramisque villosi floribus subracemosis  
Rhus villosum: foliis ternatis: folioli sessilibus lanceolatis lobis  
- ovatis integris pubescenti villosi, caule pubescente Lin. suppl. pag  
183. t. V. p. 293.

β foliis subternatis

γ foliis ramisque subtomentosis canis

Habitat in Cap. b. spici

Rami teretes purpurascentes. Foliorum petiolata <sup>et</sup> foliola integra venosa  
pollicaria, lateralibus <sup>et</sup> minoribus <sup>et</sup> villosis. Pedunculi et terminalis  
bipollicares axillares breviores. Flores sparsi solitarii terni fide  
celli rarius bif. triflori parvi. Soliola in ramulis junioribus  
interdum ovata subacuta.

an Rhus africana trifolium majus folio subtundo integro molli et trina  
no Platin. tab. 219. fig. 10?



incisum Rhus foliolis <sup>fr.</sup> plebis cuneiformibus, inciso-pinnatis <sup>fidis</sup>, subtomentosi  
venosis Lin. Suppl. p. 103. S. C. p. 294

Habitat in Cap. s. p. p. t.

Rami teretes glabri cinerascens <sup>eximio</sup> minutis elevatis <sup>scaberrimi</sup> <sup>folioli</sup>  
uniquiculatis. Tolia in apice ramulorum <sup>petiolata</sup> 2-3. <sup>Solcola</sup>  
<sup>uniquiculata</sup> <sup>neque elevatis</sup>

magis incisum <sup>ramis</sup> <sup>foliis</sup> supra lineata <sup>subtus</sup> <sup>albida</sup> <sup>terminale</sup>  
obtusius. Flores <sup>subracemosi</sup> <sup>panicula</sup> <sup>longitudine</sup> <sup>foliorum</sup>. Calycis <sup>lobis</sup>  
obtusius <sup>lineares</sup>

supra lineatis

cuneifolium Rhus foliis ternatis: foliis sessilibus cuneiformibus glaberrimis septem  
dentatis: dentibus multinatis Lin. suppl. p. 103. P. V. p. 293.  
Habetur in Cap-bono frei  
panicula axillares petiolo brevioris. petioli alati

~~1000~~

*Tridentatum* Rhoeo scandens, foliis ternatis: folioli incanis serratis: serraturis tribus ad  
quinque Lin. Suppl. p. 184. P. V. 294

non vid.

Oxyacantha R. foliis sessilibus cuneiformibus dentatis <sup>sub quinque dentibus obtusis ~~mutis~~</sup> utraque <sup>glabra</sup>

Habitat in Barbana

Rami teretes glabri cinerii puncti minuti elevati adpressi

Folia petiolata alterna solitula sessilia cuneiformia <sup>utroque</sup> utraque glabra epulvosa glauca <sup>utroque</sup> tenuissimis glauca nervosa unguiculata lateralibus minoribus integerrimis planis que apice 3-5 dentata dentibus obtusis petioli unguicula <sup>se</sup> marginati. Racemi breves ex apice ramulorum. Baccæ rubrae coriacea pappo parvis majoribus

*Succulenta*

*Crotophaga*

*S. foliis cuneiformibus carnosissimis vellosis incanis calycibus solitariis pedunculo longioribus*

*Silene succulenta*; floribus axillaribus solitariis pedunculatis; petalis bifidis; foliis carnosissimis, ovalibus, vellosis, sessilibus, subsessilibus, confertis patentibus primis Torff. de pr. pag 99

Habitat Alexandria ad Catacombas

Caulis plures decumbentes, digitales vel parum ultra folia secti. Folia inferiora minora basi in vaginam connata, superiora unguiculata frequentia obtusissima acutiuscula pedunculi ex alio supremo brevissimi Calyx pollicaris striati vellosi primis laciniis apertis patulis. Petala calycis longiora



lucidum *Rhus foliolis* ferebatur cuneiformibus Comtus Lin. L. V. pag. 293.

*Rhus trifolia* minor indica rotundifolia Com. hort. 1. p. 181. fig. 93.

*Rhus africana* trifoliatum minus glabrum, splendente folio subrotundo  
in cyro Pluken. alm. 319. t. 219. fig. 9.

*Rhus arborea* trifoliatum latifolium Burm. agr. 252. p. 91. fig. 2.

Habitat in Cap. b. frei?

Tota glaberrima folia petiolata. Soliola pmi unguiculata nitida  
Lone sedupa lateralia minus Panucula axillares et terminales  
folio parum longior

Integris

seminale P. foliolis ~~lanceolatis~~ ~~integerrimis~~ glabris, basi attenuatis, ~~pubescentibus~~ ~~4-6~~ nervis, ~~panicula terminali~~

Habitat in C. b. p. c.

Stem teretes glabri alterni. Folia petiolata alterna <sup>foliolo</sup> utrinque glabra venosa mucronata basi attenuata subsimplex intermedium pollicare lateralibus minoribus. Panicula ex axillis supremis et apice patens floris glabri nervi

*Corymbium Rhus foliolis* Lesq. tubus lanceolatis integerrimis levibus. Lin. St.

Spec. pl. pag. 1672. n. 5. V. p. 292

Habitat in C. b. p. 5

Tota glabra. folia Rami purpurea scabra. Folia petiolata. foliola  
lanceolata glaberrima gl. acuta cum mucronata basi acuta pollicaria  
lateralia parva breviora. Petioli longitudine foliorum. Pani-  
cula terminalis. Pedicelli foliiformes breves bracteae minutae  
suffultae

— Anaque acuti

angustifolium Rhus foliolis subpetiolatis linearibus caecolatis integerrimis subtus  
tomentosis Lin. S. V. p. 293

Rhus africana trifoliatum majus, foliis subtus argenteis acutis et margini-  
ne induratis Pluk. alm. 319. t. 219. fig. 6.

Habitat in Cap. b. p. 5.

Rami purpurascens folia petiolata. Soliola basi in petiolum attenuata  
pollicaria supra glabra. Panicula axillares et terminales  
parvae. Semina & bacca magnitudine pepere

paniculis axillaribus

Caneum R. foliis ternatis: foliis canicolato-subulatis elongatis utrinque glabris  
non ven. Suppl. pag 684. S. V. p. 294  
Habitat in Cap. b. p. 5

non vidi

Gangeticus *Evolvulus* foliis cordatis obtus mucronatis petiolatis villosi, caule diffuso  
pedunculis unifloris Lin. Am. Ac. 4. p. 306. n. 121\* s. V. pag. 299.  
<sup>Consolidida</sup>

Habitat in India

Caules procumbentes; ramosi, bipedales. Folia cordata, pollicis saepe latiora  
obtusa cum mucrone, petiolata. Venella folia biflorae hirsutissimi  
Pedunculi capillares breves Lin. l. c.

*Tomentopha R. folioli subpetiolati rhombici angulati subtus tomentosi*  
Linn. S. V.

Pluken. alm. 214. fig. 7

Habitat in Cap. b. frei

caud. foliis <sup>revolutis</sup> sessilibus linearibus subtus ferrugineis

Habitat in Cap. b. per. de Grest.

Rami teretes glabri. Stipes non petiolatus. Foliola sessilibus  
linearia acuta per se qui pollicaria mucronata supra rugosa  
fere ut in lido palustri. Panicula terminalis glabra



valloja P

Foris

*Cinchiflorum Peltus scandens foliis ternatis: foliolis integerrimis glabris Lin. Suppl.*

p-104. l. V. 294

Habitat in Cap. bono spei

non vid.



atrum - R - foliis ovato-oblongis, floribus polygamis Forst. fl. austr  
pag. 23.

non vidi

Seneb

P. foliis longe lanceolatis serratis subtus tomentosis albis

Forst. ~~fl.~~ Dep. pag. 206

Habitat in Arabia

non vidi

pentaphyllum R.

Dedit Desfont. Rhombus pentaphyllus L.

~~Larrea.~~

~~Polygonum revolutum presertim. Petala <sup>5.</sup> prothulata unguibus glanduloso  
ciliatis. supremum unguis latiori. Legumen foliosum planum  
isthomi indeceptum~~

Alnus nova-angliae  
arborescens  
carolinensis  
rigida  
obtusata  
incana  
corniculata Banks.  
fruticosa  
oxillata  
pubescens  
canescens  
albida  
angustifolia Gaige

Deest adhuc Concolor et Tormentum