

113. Rhynchopora Squamae paleaceae, in finae vacuae. Cor. o. Sem. l. coros-
natum stile persistente indurato, basi latitudine geminis

sed nunc - ex illi et ter. compresi Sem. compr.
Squam extenuari brevior
tela contractata purpurea

Diffusis subde

aureo! Ryachor poro corymbi laterali bis compedita terminalibus decim proposita
Scirpus pedunculis patentibus seminibus rotundis Vello superi pedunculis glabri,
corymbosus; Gramen quinta species Marx. hist. bras. 1. fide herbarii ex*exu*
culmo & rique sic minoris rostratum; ex aliis foliorum praedictis Schlebn. anaeth. 82.
tro folioso, T Schoenus Surinamensis culmo folioso & rique, pedunculis corymbosi, inferio
libris & impli ribus alterne, didactibus superioribus in umbellam aggregatis Rottb.
cibas: termi
nati prolixi, gram. 68-t. 21-f. 1.

Spirae bubula
ter. am. ac
amoen. av. 4.
p. 303. phys.
vay. 102.

Schoenus Surinamensis; culmo folioso & rique, pedunculis corymbosi.
inferioribus alterne distantes, superioribus confertes Swartz. fl. Ind. Orac.
1 p. 99.

Habitat in maloriis Surinamo, jamaico, India orientali, China?
terram hys Culmi sopra quadratis acutangulis
Syzygium angustifolia interdum laevi. foliis. foliis. laevis. glauca, ma-
lebris corymbosus gine conica que seminata, unquam lata. Vaginae pollicares et ultra
a tergo allatae. Pedunculi compresso subtriangulari, lati, spatiales inaequales, tenui. pedi-
cilli approximati, plenimque triflor. Semina stylus indistinctus. Semen
obovatum, punctulatum; Rost. allum eructus culum medio sulca excavatum, longi-

~~glomeratus 1. culmo & in quieto foliis, floribus fasciculatis, pedunculis laterali
bus geminis Lin. 1. v~~

~~Schoenus culmo & in quieto, pedunculis geminis lateralebus, floribus
conglomeratis Gron vryg.
Habitat in Virginia~~

non vidi

polyphylla 2. *Pyrrohopora* corymbis contractis astillanibus compositis terminalibus
et pedunculis villosis). hoenus *polyphyllus*; culmo trigono foliis, foliis carinatis Densitate
ribus que securis, specie dicompositis astillanibus Et amer. 2. p.

⁵ Habitat on Montserrat Ryan

in Paepa

~~Cupidatasi Sch. culmo vertibus februedi panicula Venuoshoma, linearis, bracteis
annularibus oblique brevissimis mucrone longissimo terminata. Pro 86.
gram. pag. 66. Tab. 18 fig. 1.~~

Habitat

Culmi plures Arcti Venae si recti sesquipedales vnde flavescent et
vagino ad basi culmi sanguineo glabro cylindrica mucronata
mucronibus. Semper in foliis convolutis statim rigidis bipinnatis
bus abeunt fibris speculo 4 ex inferiore dente rachis ~~latis~~ ~~et~~ superior
duo pinnato ~~sub~~ pinnatis 2 pedunculata alter ex his remota una ex altera
ramus specula unica redicellata duo in altero ramo pedunculus alter
bifidus ramii biflori cum specula pedicellata in medio 3 est dente sed in
3o ~~ramis~~ pedunculi alter bifidus alter bi bifidus 3 tris subpinnatis
foliorum subulatum ad centrum singulare dentem pinnatus specie longior et
bracteas flos subulato aristato ad basam pediculi pinnata. Speculo testa
subulata

Quaternis ad dentes rachidis

hinc decomposita pedicelli prob

maxime affini Schono comparari

Sparata 3.

Hynchosporum

Schoenus corymbis diffusis astillari bus compositi Terminalibus Compositi
t. d. redupliculis capillaribus, semi nibus vestro longioribus

Schoenus militaceus: Culmo triquetro folioso, paniculis laterali bus et Terminalibus, florulis 3-4 und. pedicellatis Lamprat illustr. 1. p. 137.

Schoenus sparsus; Culmo triquetro folioso: paniculus ex terminalibus
terminali opacae, laet multi floris; spiculis pusillis ovoides, omnibus distinctis et pedicellatis: Semine globuloso, transverso pubnugoso - striato; tuberculo terminali brevisimo. Mich. fl. bor.

americana 1. p. 35

Habitat in umbris Sylvarum Carolinas, Georgiae. Richard.

Glanis ^{integrale} ~~angusti~~ ^{spiculatum} Culmi acutis ^{angusti}, pallide virides. Culmo distans, ~~de~~ Culmo brevi ora, duas-tres linear lata, laxa, ex corporum marginie carnaque scabra, glauco-viridis. Corymbi astillares, pedunculati, solitarii. Diffusis pedunculis ^{de} setaceis, remotis, pedicellis uniflori, capillares; foliis brevi rotula setaceis. Ochreas trinitatis, flavo-ferruginea. Spiculea ex magnitudine seminis militare, ovatae, fuscæ

Henni floralis,

Grotello

~~Sic~~
Habitation Carolina Richard

habeo

hirsuta A. Rynchospora hirsuta, corymbis axillaribus ^{nudibriges} amplectibus terminalibus compo-
ditis, culmo foliisque filiformibus
Schoenus hirsutus; hirsutus pedunculis lateralibus terminalibus que pedi-
cellis racemosis trifloris est. Amer. t. p. 6

Habitat in America V. Rohr

Tota pilosa -
Tota pilosa. Culmi plures, spithamei; ~~filifl~~ ~~guttifl~~ ~~sola fl~~ culmo
hirsuta breviora. ~~Corymbi axillares~~ ~~terminalis~~ ~~compositae~~ ~~pedicelli capi-~~
lorum, utrū unguicularis, monosporangia. Spiculae parvae, sessiles. Equinae
oblongae, ferruginae, alba margine albidae, infima rara pilosa. Stylus profunde
bifidus. Setae plurimae

atillani Schoenus culms trigaeo globose, corymbi munni alternis arie
lanbus, fructu confertis La Mark T. Enc: pag 137

Habitat in Carolina

non vidi

micrantha G. *Pynchospora corymbri* diffusa axillaris & terminalibus compo-
pedunculis culmo foliis que filiformibus glabris,
capillaris Schoenus raniflorus; foliis culmoque & setaceis foliosis & tenuis: panicul-
lis late ranifloris; spiculis ovatis: semine obovata, rugosa; tuberulo apic-
itale abbreviato; scutellis multo brevioribus Meeh. fl. bor. Amer. I. p. 35
Habitat in Georgia Richard, in Porto ricos West.

Culmi spatha maei vel pedales, obsolete angulati, lasti. folia culmo
breviora, paucia, remotis pima, linearia, angustissima, testa, margine glabra
spicula: vaginæ via pollicares. Corymbi paniciflori, solitarii: pedicelli
submonostachyi. Spicas minutæ, flavescentes & qua mæ oratae. Semen obver-
sum, transverse rugosum: rostellum ovatum, via longitudine seminis. Setae
semine longiores

~~Cyperodes~~ S. culmo longo foliis, umbella terminali, fructus glomeratis

~~Sw. prod. pag. 14.~~

~~Habitat in Jamaica.~~

non vidi Diversa a Cyperode Retzi

6.

terminalibus spicis politanis, rostellum pennisimum longispicis,
 Costa 2. Rynchospora corymbis & simplicibus compositis ex culmo acutangulato,
~~# spicis soldonis~~ ~~spicis soldonis~~ ~~spicis soldonis~~ ~~spicis soldonis~~ ~~spicis soldonis~~ ~~spicis soldonis~~
Schoenus corniculatus; culmo triquetro folioso, corymbis alternis compositis
 lastiopimis, spiculio corniculatis aristatis Lamarck illustr. t. p. 137.
Schoenus longirostris, lati foliis: umbellis foliosis; spiculis fasciculata-
 viis: pennisimum compreso obovato, longiori mucronato; Betuli petiolaris
 brevioribus Mich. fl. bor. amer. t. p. 35

Habitat in Virginia, Carolina. Ex herbario Lamarckii rotundatis
Culmi trigoni, margine scabiosculi. Pedunculi superiores alligatos

~~inferiori extri-~~ quadripollinares, quinque - bettlori, [#]superiores ex pollinariis tri-
~~unus vel alter~~ triflori; ornatis lasti, ~~compressi~~ margini & labri. Bractea ad basin pedunc-
 ulorum et spicarum, in fina pollinarii, sensim rufa, tuberculata. Ovaria
 truncata, fusa. Spicae subulatae, maturae per pollinaria. Styles
 indicii. Semina obovata, compressa, magnitudine Cannabis; orbe armata
 punctulata; rostellum squamis dimidiis longior, & tuberculis minu-
 tis semis planis. Setae rigidulae.

~~Cyperoides Scirpus Culmo Tricquetro nudo, umbella simplici, spiculis oblongis, flo
bulis subulatis, ari floris reflexis Mont. 181. + S. V. p. 100~~

Habitat in India

~~Folio Lipp. stengofi L. Scirpi retrofasci flos flosculi casti reflexi. folia grami-
nea caninata. Culmi Tricquetri, nudi, corse, pedales. Involucrum prophy-
llum, umbella longior, foliolis gramineis. Umbella terminalis
simplici inaequali. Spicula pedunculata, plurima, ova-do-oblonga, flo-
tes. Floscule casti reflexi, subulati, conferti, fessiles. Squamis ca-
lycinis lanceolatis convolutis, imbricatis her-bis.~~

non vid. Kylleberg

7. axillares perimpliebus terminalibus costello longitadine seminis
triflora. 2. Rynchospera cymis subcompositis, culmo acutangulo scabro, spicis
subgeminis, ~~ratio seminis~~ longioribus seminibus longioribus.

Habitat in India orientali

4 marginis
scabri,

Culmo acut. trigoni. folia remotas margine scabriuscula. Pedunculi
atque remota, axillares solitarii, ^{posticale} terminalis ^{terminalis} que ad septem
trispicatis, spicis sessiles, semiunguicularis, teretes, attenuatae
basi folio corymbo longiore suffulti. Bractea setacea ad basim cum
quaque pedunculi et spicatis. Ochreas parvae, trinerviae. Specie
sessiles, semiunguicularis, oblongae, teretes, attenuatae. Stylos
dorsi. Semen obovatum, transverse rugosum; costella ^{costella} subula ~~longioris~~ semi
longioris. Setae semine longiores, retrorsum pilosae.

Schoenus ^{???} nigrosus, culmo folioso inquieto, pedunculis corymbosis distantibus, spiculis oras
vis acutis, reminibus undulato nigroso.

Habitat in America meridionali von Rohr.

Culmi plurimi, erecti, sesquipedales, ramos inquieti, foliosi, glabri, angulis
laurib. Culmo breviora,

Folia angusta, corinata, margine levia, glabra, pallide viridia.

Corymbi ex axillis supremis, tres vel quatuor, alterni, parvi Pedunculi
culi pollidares, folio breviores. Foliola nonnulla subulata ad basin corymbi
spicula parva, ovata, acuta, glabra, ferruginea, triflora. Squamo
ovata.

Semina oblongo-subrotunda, margine obsoletè cincta, transversim undulata
nigra, utriusque convexa.

Affinis Schoeno Surinamensi differt res spiculis oratis acutis, nec cylindrico.

subulatis: squamis oratis, nec lanceolatis: reminibus levibus nigroso-
^{bus} _{non rugosis} lacinibus. a Schoeno gracili Caleb Swartzii differt, culmo
cristato crassiore, foliis latioribus, corymbis non remotissima, spiculis
non ramos linearibus nec glumis linearibus.

fitiformis S. F. Rynchospora longibracteolata, terminalibus
axillaris simplicibus.
culmo obtusangulo
laevi foliisque filiformibus

Habitat in Porto ricco West le Dne

Pulmi pedales et ultra. Cilia remota, culmo breviora, spicæ marginata, exstorum
ne & calva. Cyathib. solitarii, axillares simplices terminali-
corpo
~~ete~~: pedunculi partiales inferiores semi-pollucares. Spicæ angustæ,
cony. vix unguiculares. Semen laeve, rotundum, ~~albo~~ semi-ovalis, semens longa
dines

~~met pampas Schaefer~~

Habita in Caroline sed Rch.

Culmi fimbriatae, foliis; rufisne crassiti penno columbina, glauco vnde
bi-pedales. Folia papaveris marginè scabra

habes

longo coarctatus

metr pants a 9. Rynchospora corymbosa stellaria ribes Verni simplicibus compositisque, ver
minutis decompositis, culmo cylindroformi
Schoenus in metr pants; foliis calmoque foliis angustis foliis us:
paniculis remotis; ramulis approximato-erectis; spiculis fusiformi-
bus: semine oblongiusculo, subrugoso, mucrone brevi; pedunculis brevibus,
duplo longioribus thick. fl. bor. amer. I. p 35

Habitat in Carolina Bosc.
Pulmī ^{bipedales, inferne rupite pennae columbinæ, obtusa anguli,} elongatis, obtuse trigoni, laeves. Solia remotissima, longitudine
internodiorum, glauco linearifloria #, glauco-viridia. Petiole
culi solitarii, capillares, superiores foliis longioribus. Spicæ parvae,
subulatae, non florae, fuscocerrugineæ: squamæ lanceolatae
exterioris carinatae #. Semen transversim undulato rugosum; rostrum
ovatum, acutum, semine dimidiis brevius. Setæ ^{clivis} adnatae tenui-
latae

II Superne magne picea
bra

~~4 Stylos bifidus~~

~~Care S. culmo trigono foliis capitulo laterilibus, glumis mucronatis, spicis ovaliis
et Thunb. prod. fl. Cap. pag. 17.~~

Habitat in C. frui

non vidi.

Betacea capillaris 10. Pryat hospora Corymbis axillaris Terminalibusque simplicibus
nauis floris, Culmo foliis que Betacea.

Habitat in America meridionali? Ex herbario Tussicien

Officina Polonica, filii & filiae. Tola in adulationibus, remoto, culmo brevior. Pedunculi
culi axillares et terminalis, (capillares) ^{politanus, longus & natus} Corymbia foliis breviori. ~~longior~~
brevior illares tanquam ex spiculae, quadrispicatae. Specie Terminalis
est Septemflosse per pedicelli Corymbis axillares pedicellis tribus-qua-
tuor, Terminalis est Septem- ^{celum} Specie Spiculum squamae ovatae.
Semini rostrum ordinum, acutum, longitudine Seminis. Setae bimina bre-
viores

Pray hospora
longior
spiculum squamae ovatae
seminalis

Raniflorus

Schoenius

Scirpus raniflorus; foliis culmoque & flaccis; paniculis tante ranifloris; spiculis ovalis: semina obovata, negosa; tuberculo apicillari abbreviato; & culis multo brevioribus Mich. fl. bor. am. I. p. 35.

Habitat in Georgia Richard, in Porto nico West

Similis praecedenti diversus: Culmo foliis que petiolaris: Corymbis seu culo panicifloris: spiculis minoribus: seminibus compressiusculo, mucrone tuberculato, nigro, terminalis. Specimen na e Porto nico non different nisi Culmo altiore. & foliis paucim latoioribus.

Glaucia II. Rynchosporon ^{Epicris} corymbosum fasciculatis approximatis solitariis, culmo acutis
grado, foliis linearibus.

Schoenus nugosus; culmo iniquo folioso, pedunculis corymbosis distantibus, spiculis
ovatis acutis, geminibus undulato rugosis. Lob. Amer. 2. p. 5.

Habitat in America meridionali von Prohr.

ex Hortum marginie plantinacula

Glaucia. Culmi plures, desquipedales, folia culmo breviora. Pedunculi superne eot

duabus articulis ultimi solitarii, transversaliter dividitis, pollicares; foliis

Styphelia ^{breviorer.} breviorer. Corymbi parvi contracti. Specae parvae, ovatae, acutae, geminane
aniflorae: squamae ovatae. Semina lenticularia, margine obsoleta cincta, man
versim undulato rugosa; ^{ello} rotunda crata, longitudine seminis. Setae semine longe
res.

~~Scaber S. culmo triquetro nudo capitulo terminali scaphi spiralis teretibus squar
rups involucris 4 phyllis Culmo longior erecto~~

~~Habitat in America meridionali~~

~~Culmi plurimi pale pollicares vel longiores Densitate minima
setacei. Tola fructuosa basi vaginante culmo altero. Capitulum
terminali scaphi piso duplo pro major. Involute non 4
phyllis, culmo longior erectus foliolis setaceis cataphylac-
tis faberianis indigentibus. Spiculae carinatae feminae
que culares vel palmari ultra teretes obtusa. Squamae
pubulatae pro apice rotunda~~

^{Spiculae corymbos corona 30}
fasciculans 12. Rynchospora ~~corymbosa~~ fasciculata, foliis linearibus, latitudine culmi

Schoenus fasciculatus angustius culte planifolius: fasciculus laterali bus ver-
ninalique, spiculis planis velatis, oblongis glabris; squamis mucronatis: setulis
gemine laevi duplo longioribus, purpureis pappulibus Mich. fl. bor. ame. l-p 32.

Habitat in Carolino Bosc.

^{anguli}

Glaucus. Culmi pedales, radice, acutæ ~~rigore~~, soleæ tria in culmo, remotæ,
caule brachiora. Perfoliati axillare, et terminales, solitaria vel gemina;

Spicae corymbosæ fasciculatae parvi, compoſiti vel decompoſiti; peduncu-

lii pedicellis super brevibus ^{tus} folium rotacum, corymbo parum longioris.

Spicae fasciculatae, juniora tubulatae, fuscae, semen laeve. Setae hispi-

dulæ

Schoenus

~~Habitat ad frigidum Magellanicum Commerci herbas /~~

~~Culmi plani adscendentis; palmaris vel ultior, inferne foliosi, Veneris, striatis
foliis filiformia, culmo bicolora. Specie terminalis 5 flora. Squamo lanosa
lato, ferruginea. Style longi apice hamata, subulati. Vagina stamino et stylem
involventia.~~

gracilis 13. Pynchospora sp. Specie corymboso fasciculata, foliis linearibus culo
filiformi latioribus.
Schœnus gracilis; culmo triquetro folioso longissimo filiformi, Specie
lateralibus pedunculatis Swartz prodr. 19. & l. ind. octob. 1. p. 107
Habitat in sylvis montium altis simorum jemaii et
mostine affinis praecedenti, diversa videtur culmo multo teneriore
foliis angustioribus, remotionibus: pedunculis remotionibus.
Culmo tri-pectinatus, lati. folia longit. sima. Pedunculi costillares
distans, terminales internum gemini; alter brevis simus; alter via semi-
pollicans.
Stylus viridis secundum cel. Swartz. Alio Specime ab ipso misso
stigmata tantum duo vidi.

unmittelbar E. um 1800 zu langsam, zu unruhig; jetzt langsam und
sicher

geniculatus.

~~Scirpus culmo rufi intermixto, spica ovato-oblonga, squamis ovato-subrotundis.~~

~~Fusca aquatica geniculatus; capitulis equisetis major Sloan
Cat. 37. Hist. 1. p. 121. t. 83. f. 3.~~

minus β Spica subglobosa

~~Fusca aquatica geniculatus, capitulis equisetis, minor Sloan.
Cat. 37. Hist. 1. p. 122 + 75. f. 2.~~

~~Scirpus culmo nudo, spica terminali subrotunda Lin. hist. cliff.
21.~~

glomerata 14. *Rynchospora* ^{spicis} corymbos ^{spicis} fasciculatis remotis & nisi germinatio, culmo obtus-
anguis, foliis linearibus

Schoenus culmo triangulari, pedunculis germino lateralibus, floribus conglomeratis
8. 15. sp. vix 9.

Schoenus glomeratus; culmo triangulari folioso, floribus fasciculatis,
pedunculis lateralibus germino linear. sp. vix 97.

Habitat in Armenia boreali

affinis R. D'Orbigny, differt: culmo altior, conspicua; foliis triple laciniosis,
pedunculis germino nec polianis: semina obovatum, testa breviore
culmum bipedalis sit ultra, obtus ^{angulus} angularis. stylus bifidus. Semina
~~laevia~~ nitida; radix ^{attum} longitudo seminis. Setae rufescens hispidas muni-
tatae.

14

~~Cladium s. culmo obtuso trinervio foliis lori, foliis antropum aculeatis, paniculis
diffusis, fructu in floribus sessilibus scandens~~ Sw. prodr. p. 19.

~~Cladium Brown. p. 114~~

~~Habitat in America.~~

~~Gaeck Sch. Pennamea~~

~~non vidi~~

Distantis 15. *Prenopspora Speciosa*
Schœnerr. Cymbo fasciculatis remotis 8 imis, culmo obtusangulo, foliis filiis
formibus Schœnerr. ac illaris; culmo triquetro foliosis, cymobis mininis alternis axillari-
bus, spiculis confertis Linnæus Illustr. 1. p. 137.
Schœnerr. Distantis; anguste foliosus; fasciculis subcapitato, distante
lateralibus et terminali: spiculis ovatis, glabris: semine lenticulari.
mucrone brevi; pedunculi illius longitudine. Mich. fl. bor. amer. 1. p. 36.
Habitat in Carolina Ricard.
Culmi pedales, obtusa ^{angusti} trigoni, vidi - glaucescentes, Dolia remotas 8 imia,
inter nodos brevi ora; ~~racemosa~~ fasciculata. Pedunculi axillares, solitarii,
solitarii. Spicae confertae in cymbo subcapitato, parvae, ovatae acutae
feminae: & quam maiores ovatae, acutae. Semen lenticulare, nigrum, nitidum,
laeve & pimum.

~~on the 1st of April
in the year 1800
at the age of 15 years
I have written this
in my notebook
and I have written
it again in this book
so that it may be
more legible and
easier to read.~~

Supinus

Cateriflorus

* *Scirpus glomeratus* ~~sessiliibus glomeratis - constatis~~
Scirpus spicis laterilibus culm & regulari

Scirpus supinus mi. *Scirpus madagascariensis* minor Retz. in Act. Acad. Lond. 202. p. 1253. fida herb. Val.
nimus, capitulis ^{Lantii} longlobatis, foliis

rotundis. Veretibus # *Scirpus lateriflorus*; culmis triangulari nudi, spicis subtenuis laterali
Tournef. inst. v. h. 520 bus, involucro monophyllo brevi Retz. obs. 14. p. 12. & 5. p. 16
Scirpus supinus; ^{inclusorum} habitat ⁱⁿ India orientali Hongkong, in Guinea Thonning

resistibus in medio. *Mastigne affinis* *Scirpo supino*
culmis glomeratis Culmi plures, spathamacei vel pedales, monophylli. Culis lanceo.
Lan. syst. veg. 101. Retz. Culmo breviora, linearis, basi vaginatis. Involutum monophylle
ab fl. germ. 2. p. 520 culmo ^{erumpente} majoris acumi. Culmum ^{erumpente} alatum. Spiculae versus medium vel
altius tres novas, sessiles, semivirgatae clares, oblongae, acutae.

Stylæ: Stylæ ovalae, acutæ, carinatae, testa lateribus purpureo
concolor punctatae, carina viride. Stamina una, stylus trifidus. Semina
negra. capsula ^{transversa} undulata rugosa. Setæ nullæ.

Scirpus lateriflorus Retz. sic Specie differre censit a L. supino, in
specimibus robustioribus ^{inspectato} culmus superne quidem angustatus videtur,
sed potius exinde quod evolutio collatur et inde his faciem alic
iam a naturali acquirit, in gradioribus vero et in venio omnino
et in supino. Involutum, quod nil est nisi squama inferior in asperam

capitellata 16. Pynchospora ^{Spissis} corymbosa ^{g. g.} fasciculatis approximatis, culmo filiforme
octangulo ^{Puberminatis q.}

Schoenoplectus angustifolius: capitulis proxime alternis,
erectis; spiculis oblongis: gemina bipartito, breviora mucronata;
setulis longioribus obtusis. Mich. fl. bor. amer. I. p. 36.

Habitat in Carolina

Habitat in Carolina w
Pulm. acuta angulata. Capitula breviter pedunculata, interdum
geminata. Semina ~~recta~~ ^{elliptica} semine perum longiore. Setae adropum
racatae. Michaux l.c.

triflora Rynchospora corymbosa complexibus, pedicellis elongatis in squamulis
trifloris, floribus distilibus, terminalibus foliis lanceolatis.

Habitat in India Orientali

Palmi erecti, glabri, ~~strobilo~~ ~~angulis~~ torquati, angulis levibus. Solia remota
carinata torquata, glabra, marginem seobnuscula, culmo breviora. Pedunculi
terminales gemini, alter brevior, triflorus; alterne longatus multiflorus;
torquati angulis seobnusculis: pedicelli approximati, 1-3 pollicares
caviter, s. C. filiformes. Culmum subulatum ad basim pedicelle infime
spine corymbo longior, ~~est~~ in sequentia breviora. Ochrea par. v. Virensato
spiculea his in apice pedicellarum, basi fo bractea setacea suffusa, ovata
attenuata, acuta

17. *Rynchospora apicis*
~~ciliata~~ *Schoenus* ^{oss} *Corymbos fasciculatus* Terminalibus, bracteis ~~ciliatis~~, foliis
obtusiusculis ciliatis
Schoenus ciliaris; foliis linearibus, obtusiusculis: fasciculo terminali; bra-
ctes brevis semis bracteolisque ciliatis: spiculis ovatis: Semine lepidulari,
laevi: Stylis brevissimis, persum hispidulis Mich. fl. bor. amer. 1.

p. 36

Habitat in Florida Richard

superior ad folia pupae pubescens

Glossus: Culmi pedales; filiformes, ~~capitula~~. Seta ad basin frequentia,
tria vel quadrata in culmo, pollicaria, remota, angustata, lanatula, cilia-
ta, oblongata. Capitula tria, Veroniana, breviter pedunculata fastigia
centra, interdum tria ex ala superiore. Spiculea ex pedicellatae, oblongae,
acutae, parvae, fuscæ: & quemadmodum ovatae, mucronatae. Semen lenticulari,
ovato armato pendulato striatum, ^{lunatum}, ~~lunatum~~ brinovo terminatum. Setae bre-
ves, ciliatum

rostello

Semine brevipes

Differ a reliquo foliis culmi brevibus

Distant Schoenius

Habita in Pasadena Red-Bark qui communis

18. *hynchospora* wymboso
alba Schoenw. Spicis fasciculatis, te culmo foliisque setaceis

Gramen junceum leucanthemum Ger. emar. 30

Cyperus minor palustris hispidus paniculis albis pallaceis Moris. hisp.
hist. 3. p. 239. Sect. 8. t. 9. f. 39

Gramen Cyperoides palustre leucanthemum Schenck 2. gram. 503. t.
11. f. 3.

Schoenus albus; culmo triquetro folioso, floribus fasciculatis,
foliis setaceis Lin. sp. 98. veg. 98. Bl. Dan. t. 320. Polluk pal.

n. 39

pusc. us. 3. Cyperus minor angustifolius palustris, capitulis fascis pallaceis-
moris. hist. 3. p. 239. Sect. 8. t. 11. f. 40

Schoenus falcatus; culmo tereti folioso, spiculis subfasciculatis,
foliis filiformibus capillaris Lin. sp. pl. 1664

Schoenus petiolaris; culmis numerose aggregatis longisque foliis-
setaceis, stricte erectis; spiculis rufis, tereti-ovatis, pauciter in copi-
tulum terminata collectis: in volvuo Diphyllo, a Cetero floribus longiora
Shwill - fl. par. 19

?620 100

Habitat in Europa paludibus turfosis ^{pae more - & alii per folia.}

Radix repens. Culmi ^{pae more - & alii per folia.} spithamei, filiformis, tectorum, ascendentes, unicolori. Culmia duo. Vicia in culmo, remota, inferioris paucpe longitudine culmi, superiora breviora, filiformia, canaliculata. Pedunculus ex-
stans foliis superioribus et apice, solitarii interdum et apice folium
modo, solitarii. Spicæ fasciculato corymbosæ, oblongæ, acutæ,
acutate fuscæ; foliolum unicum vel duo sub fasciculo terminali, fasci-
culo longioris. Squamae ovato-lanceolatae, acutæ. Stylus bifidus. Semen
obovatum, rostrum ^{citius} longitudine seminis terminatum. Setæ pluræ, semine longiores.

Hallenii jam suspicavit quod Rhoeas.

?620 100 in 1859 100
91. bot. 100

rhoeas sanguinea L. sanguinea L. sanguinea L.
rhoeas sanguinea L. sanguinea L. sanguinea L.

cephalotes 19. Rynchospora Specie ^{glomeratis} glomeratae caput globoso - capitatis

Schoenus cephalotes; culmo folioso, rigidus; involucro tetraphyllum, deflexo,
capitulo oblongo, terminali. Rottb. grana. C. t. 20.

Habitat in Surinamo. Rolander, von Rohr 4

aintanguli Culmus altus, ~~racemosus~~, crassitie peniae columbinas, ~~racemosus~~.
Solia sesquipedalia et ultra, semi pollicem feret lata, margine ca-
rinata scabra. Involutum Tetraphyllum, longissimum, de-
pendens. Capitulum magnitudine nucis jieglandii, ovato-polylobosum
Specie oblongae flori ferare puberulae, acutae, fructiferae oblongae
obtuse, crassae: Squamas ovatae, acutae, granatae, tonicae, griseae.
Semen sublenticulae, fusco transversim undulato striatum, for-
fuscum, margine flavum flavo cinctum; ^{rostello} coccineum semi unguicul-
lare terminatum

+ pubniflorae

anundinaceus S. Culmo compresso foliis, fructuis paniculatis

Habitat in nova Caledonia Fabriani

Culmis compressis anciis non marginatis corbis folia
longissime marginae atrocolatae siabra panicula semipedalis
erecta. Statice tubulosa ferruginea in folium breve
subulatum deponente pedunculi posticale et pedicelli
gemini est eadem statice specie foliata parviflora
fusca orlane obato lanceolata acuta

^{foliis}
Habitus. Pulmi erecti; trigoni, nodosi, simplicissimi. Oalia carinata. Coni
pedunculati; astillares simpliciores; terminales magis compositi. Pedunculi
compositi pars brachii univariatae. Pedunculus communis inter flo partialies angulatas,
^{vaginula integrae.}
Rostros ^{flexuosa} foliis: partialies inferiores superioribus altioris, compressi, & obtusati: folio
seminalium ad basin peduncularum partialium et pedicellosum, plerumque rotundum.
brimum ^{aristis vel ad basim} ^{seminalis}
H. ^{aristis} ^{seminalis} ^{glomeratae} Specie juvencor. subulatae, matutinae cordatae fuscæ. Capitata sola est quae ad
monocotyledoneas. modum florandi a reliquo recedit, ceterum omnibus simili.

Halleni jam dudum monuit, quod Schoenus fuscus cum a plurimis aliis Schoenüs
differt idoque cum ad Scirpos velutilit, in diuani restrum ^{aristis vel ad basim} ^{seminalis}
vel apicem ^{ad basim} ^{glomeratae} notam characterib[us] sic congeneri. Quod squamee inferiores va-
cuae sunt, character hanc ^{certe} ^{est} mox mosaenti, datur anim Schoenii squa-
misi paniculibus vel pluribus festilibus, at in Scirps varia squamee in pan-
iculis pluribus. Diversificatio vero longe posterior em praebet, at cum tot species
tam quod illam non quod habitum inter se conservavit et in illis ad
a reliquo Schoenos Scirpos different, nescio cur non licet sum esse ut
proprium genus tradere, scadente Cal. Richardi qui in p[ro]sp[ec]tando
generibus vestigia fusciae insipit

Character naturalis

Pul-Glomeræ paleaceæ, infimæ nativæ, superiores glomerifloræ, univalvis, in pan-

ris brevioris, mucronatae

1810mp. - 28^oD

Per. et nulla

Itam. Filamentum unicum, duo vel tria
divisum vel bifidum

Pist. Germen minutum. Style ~~bifidum~~ ⁱⁿ interne persistente, basi ladiudicata,
apice germe his

Itam. obvatum vel lenticulare, convexitate ^{base acutum, apice obtusum,}
undulato-negrum, apice coronatum ^{rostro tuberculato, ut plurimum transversum}
^{entia} inferiore parte stylis persistente et
cum semine deciduo, ovata conica vel subulate, compresso.

~~admodum in perditis
et longis nevrose
et fornicatis ramos
et foliis exstinctis
et raro floribus~~