

Ribes

* Caule inermi

- 1 rubrum R. racemis glabris pendulis, floribus planiusculis, bracteis flore brevioribus
- 2 pubescens R. racemis villosis elongatis pendulis, bracteis villosis longitudine florum
- 3 alpinum R. racemis erectis brevibus, bracteis flore longioribus pedicellis que
villosis: pilis glandulosis.
- 4 petraeum R. racemis florentibus erectis, fructescentibus pendulis
- 5 nigrum R. racemis villosis, floribus oblongis foliis subtus villosis pilis
- 6 resiniferum R. racemis foliisque glabris, foliis subtus resinosis punctatis
- 7 flondum R. racemis pendulis, floribus cylindricis, bracteis flore vix breviori
baysis hirsutis
- 8 glandulosum R. racemis erectis, floribus planiusculis, pedicellis calycibusque
villosis pilis glandulosis (forte inter 4. 5. collocanda cum aliis differ
entia)

* * Caule aculeato

9. *Dacantha* R. foliis obovatis superne dentato incisivi racemis multifloris
10. *reclinata* R. ramis subaculeatis reclinatoris, pedunculis bractea triphylla.
foliis lobatis
11. *grofulana* R. ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, bracteis hirsutis
12. *confusa* R. ramis aculeatis, bracteis glabris, pedicellis bractea monophylla.
13. ~~*oxyacanth*~~ R. ramis undique aculeatis
14. ^{thoides} *cyrospati* R. aculeis subaxillaribus, bracteis aculeatis racemosis.
14. ^{thoides} *oxyacanth* = R. ramis undique aculeatis

adda in differentia reclinatora inflorescentia

ex herbo Paris.

Rami: ramis glabri, nubescentes, adpressi aculeis aciculatis rubentibus. Folio-
resque pollicaria, petiolata, oblonga cuneata, glaberrima, estrosum in ipso pro-
to serratis obtusi, glandula parva flava terminatis. Racemi pollicares per-
duli. Baccis glabra hab. Guss.

prostratum
mazellanicum) pedet la manri

reticulatum Presb.

Habitat herb. La Marckii

La Marckii

trifidum Rubes.

Habitat in Carolina herb. Rub.

Ramuli, uti folia glabra et pedunculi pubescentes. Folia 3 loba glabra,
inæqualiter serrata. Racemi erecti. Pedicelli uti calyces glandulose villosi.
Flores parvi

Lithum Reber

Habitat in Syria herb. Desfont.

Rami teretes, penna anserina crispaver, glabri, teretes, cortice cinereo, inermes. Rami
li breves, interdum plures simul collecti, ramulopi glabri, tenello villosi. Folia in
apice ramulorum aggregata, unguiculata, vel parum ultra, scabra, subtusque
loba, inaequaliter dentata, supra lineata, subtus nervosa, utraque, uti petioli
et basi & petalis brevibus hirta. Racemi terminales inter folia, longitudine
globorum 5-7 flori. Baccae globosae, rubrae, minores nb. ~~albae~~ alpinae. Stycula
ovata, con cavo, pili glandulosi

procumbens *Ribes inermis* racemis erectis, floribus planiusculis, foliis ob-
tusis lobatis, caule procumbente. Willden. sp. pl. pag 1154

Ribes polycarpus grossularis fructu Am. meth. 197.

Ribes inermis, caule procumbente, racemis pendulis, bacis mar-
tis Gmel. fl. pb. 3. p. 173.

Ribes procumbens inermis, furculis procumbentibus, racemis pedic-
ulis, floribus planiusculis monogynis Pallas. fl. 105f. 2. p. 55.

Tab 65

Habitat in Siberia 5

non vidi

fragrans Rubus enorme, racemis erectis, corollis campanulatis, foliis obtuse trilobis,
caule adscendante Wild. spec. pl. pag. 1155

Rubus fragrans enorme, paniculis ramosis erectis, foliis subquincunariis
lobatis, racemis fructiferis erectis Pallas Nov. act. Petr. 10. p. 377

Tab. 9.

Habitat in Siberia 5

non vidi

triste Rubus inermis, racemis pendulis, corollis planis, foliis squelobis Wad
Spec: pl. pag. 1185.

Rubus triste inermis furculis simplicibus, supra folia feris racem
feris que, racemis pendulis Pallas nov. act. petr. 10 pag 370
Habitat in Sibira 5

non vid.

~~Toxatela~~ Ribes aculeis fraxi, foliis cuneiformibus obtuse trilobis, racemis erectis
Wieg. Mus. pl. p. 1157
Ribes saxatile ramis fraxi fraxi, racemis fructiferis erectis Pall. Nov
act. Acad. Petrop. 10. p. 376.

Habitat in Sibero 5

non vidi

1 ribnum R. inermis, racemis glabris pendulis, floribus plani usculis
Lin. S. V. Flor. Dan

Grosulana, multiplici acino, s. non spinoso hortenfi rubra Bauh. pin.
455.

Ribes vulgare acedum Bauh. hist. 2. pag. 11.

β. Grosulana hortenfi, fructu margaritis simili Bauh. pin. 455.

Habitat in Norvegia et Suecia borealibus.

Corticis purpurascite superne cinerascens. Folia quinque loba
utrinque glabra obtuse serrato incisiva interdum ^{non mucrona} mucrona subtus vix
velut pilis aliquot. Petioli in spontanea basi per pilis rarioribus
ciliati in celta vix pubescentes. Racemi pediculis in fructifero
non recurvi, pedicelli vix villosi. bractea minuta ovata.
Petaea oblonga

Spicatum. Ruber, enorme, spicis erectis, petalis oblongis, bracteis flore brevioribus
Smith. Fl. Brit. pag. 264.

Ruber spicatum Rolson in Act. Soc. Lin. Vol. 3. pag. 240. Tab. 21.

Habitat in fylvis Angliæ borealis

Folia R. rubri, ad lobis et serratis acutiora; subtusque magis tomento-
sa. Spica semper erecta. Flores brevissimi pedicellati, rubido-fu-
sca. Bractea ovata, exigua, ut longitudine pedicellorum, apice
reflexa. Petala uncinato-oblonga. Bacca globosa, colore et gustu
R. rubro similes Smith h. c.

2 pubescens R. inermis racemis pendulis elongatis, bracteis ^{concoloribus} longitudine florum sub villosis

Habitat ad fretum magellanicum &

Habitat sub alpini. Folia triloba supra ~~atenuis albis~~ ~~et~~ ~~glabra~~ ~~et~~ ~~glabrescens~~
glabrescens. lobi ovati inaequaliter serrata, crispata quam in
v. elapsis. Rami cinerei superne uti petioli et pedunculi villosi
dimeris. Racemi bis. tripollicari. Flores brevissimi pedicellati
germen leviter villosum

ab alpino differt racemis longioribus pedunculis bracteisque villosis
summe vero pilosis - glandulosis

Folia basi ^{sub} cordata, petiolata, ovata, glabra 3-5 lobis: lobi obtusi
subtus pallidiora, nervi villosi. Rami glabra herb. Fus. an eadem
cu antea descripta

3 alpinum R., enorme, racemis erectis: bracteis flore longioribus
L.V. Facq. fl. austr. 1. T. 47. fl. Dan. Tab. 968.

Grospulana de Sanctis ballis Bauh. pin. 455.

Grospulana vulgaris, fructu dulci Bauh. pin. 455.

Ribes alpinum dulce Bauh. hist. 2. p. 93.

β. Ribes montana, corymbis sapore Bauh. prod. 160. Am. acid.

1. p. 170

Habitat in Norvegia, Suedia, Helvetia, Anglia, sylvibus fereis.
Rami tenues purpurascens nitidi. Folia petiolata, trifida glabra laciniis
ovatis serratis. Petioli ciliati. Racemi breves pollicares: florentes erecti
fructu feni reflexi uti bractea pilis glandulosis. bractea canaliculata
flore longior. Corolla saepe quadrifida, plane

alpinum

glandulosis

racemus

p. ediculis, pilosis

Culta

fructu herbam presmum

4 petraeam Br. inermis, racemis florentibus erectis, fructiferae pendulis
Faequ. Infr. 2. p. 36. F. rar. 7. 39. S. p. 243.
Habitat

quomodo differt ab alpino? mihi ignotum

5. *nigrum* R. inermis, racemis pilosis, floribus oblongis Linn. S. V.
Fl. Dan. 4556.

quosquilana non spicosa, fructu nigro Bauh. pin. 455.

β. *Ribesum nigrum pennsylvanicum*, floribus oblongis Willd. Ellth. 324.
T. 244. fig. 315.

Habitat in Norvegia, Helvetia, Suecia, Pennsylvania &

Cortex cinereus. Folium tri- vel subquinq. fida supra glabra
acute dentata subtus leviter villosa. Petioli subinervi basi pilis longis raris
inervi ^{pubescentibus} ciliati. Pedunculi pollicares vel ultra. Stipula subulata lon-
gitudine fere pedicellorum. Calyces pubescentes petala ovata

Aliam nescit Dr. Bellardi: Folis subinervi tenellis uti Squama
gemmarum punctis raris florifera

bracteis castaneis pedicello brevioribus

buo

7 florum R. inermis, racemis pendulis, floribus cylindricis, bracteis flore vix
brevioribus L'Herit. pl. n. 4.

Ribes nigrum pennsylvanicum, floribus oblongis Willd. Clth. 324. 7 274,
fig. 315.

Ribes americanum Mill. Dict.

Ribes nigrum β. Lin. Spec. pl. pag. 291.

Habitat in America septentrionali 5

Rami teretes purpurascens, venelli villosi. Folia trifida laciniis
lanceolatis incis serratis petioli uti folia juniora pubescentia
Paniculi folio longioris, tripollicari pubescentes. Flores distantes. Bractea
caere subulata longitudine fere flori

folia trifida

venosa Jacque.

glandulosum R. inorme, floribus racemosis planiusculis, pedicellis calycibusque
pelosis: pilis glandulosis Hort. kew. 1. p. 279

Ribes glandulosum

Web. Dec plant. m. cogn. p. 2. tab. 7.

Ribes prostratum

L'Heritier Herp. nov. p. 3. t. 2.

Habitat in America septentrionali

Racemi cortice cinereo glabri. ^{utroque glabra} folia petiolata quinqueloba lobis
ovatis obtusiusculis inaequaliter inciso-serratis. Petiolus basi dilata-
tus dilatatus. Racemi erecti laterales praesertim infra folia utriusque
pelosi glandulosi. Flores parvi

redum ②

9 *Diacantha R. foliis incisae aculeis geminis ad gemmas den* *suppl. p. 157. +*
S. V. p. 242.

Grosularia daunica montana, uve crispo folio Ann. vith. p. 190
Ribes diacantha Pall. St. 3. p. 722. T. 7. fig. 2.

Habitat in Daunia

Rami teretes cortice uncinati. Spinae duo aculeares oppositae
ad gemmas ^{recti} interdum unus vel alter in ramis praesens. Folia
obovata ^{multinervi} ^{obovata} basi acuta superne dentata - in cava
glabra subtus simpliciter venosa. Rami folio breviores
multiflori. Baccae glabra sublaevae

Diacantha R. foliis obovatis superne dentato incisae

10 reclinat^{us}. R. ramis subaculeatis reclinatis, pedunculis bractea triphylla
Lin. S. V.

grosularia spumosa sativa altera, foliis latioribus. Bauh. pin. 455.
Habitat in Germania, Helvetia &
~~Caeis~~ ~~grosful~~ uro crupo. Petala oblonga.

mea dubia

11 *grosularia* R. ramis aculeatis, petalorum Edis pelosi, bacis hirsutis
Lin S. V

grosularia fructu maximo hirsuto margaritarum fere colore Raj
hest. 1404.

Habitat in Europa &

~~Cortex ramorum cinereus. Folia trif. & subquinquefida laciniis subincisatis
obtusis vel quadridentatis utraque pilis raris minutis adpressis
aculei gemini in tuberculo infra gemmam validi recti & laevissimi
ser. Pedunculi vix longitudinae petioli pubescentes. Flores gemini vel
tres. bractea ovata brevis. Germen tomentosum sane canescens~~

Cortex cinereus. Folia trif. & subquinquefida pilis raris minutis prosteris
ad marginem lobis apice obtuse dentatis in ipsi. Spino duo vel
3 infra gemmam, subulato pinnatifido apice & laevissimo
Petioli pelosi. Pedunculi mutantes pubescentes unif. biflori. bractea
minuta ovata in medio. Corolla tubulosa germen pilis glandulosis
uti pari superior pedicelli copiosis adpressis petala lineana

2 ura crispata R. ramis aculeatis, baseis glabris, pedicellis bractea mono-
phylla Cen. S. V. Fl. Dan tab. 546.

Grosularia simplicis acinis vel spinosa sylvestris Bauh. pin. 455.

Habitat in Europa boreali

Cortex ramorum ^{et papyratus} cinereus. Folia tri vel subquangrefida, laciniis apice
rotundatis ^{et papyratis} vel quadricrenatis utrinque pilis minutis raris
petioli veluti ^{et papyratis} ^{interdum tres} adpressi. Aculei gemini in tuberculo infra gemmam, valis, fla-
vescentes. Pedunculati vix longitudine petioli nutantes 1-3 flori. bractea
ovata basi in pedicello et altera sub flore. Flores campanulati. Germen
vellosum etate glabrum petala laciniolata

Cult.

1710 *Oxyacantha* ¹⁰²⁴ ramis undique aculeatis Lin. S. V

Grisebana *Oxyacantha* foliis amplioribus, a J. Hudsoni Pl. Hudson. 1701.
212. J. Ell. Cl. 166. t. 139. fig. 116

Habitat in Canada ⁵

Rami ^{nunquam teretes} teretes undique adpressi aculeis conopisimis acerosis inaequalibus. Costa
petiolata 5-loba lobis ovatis serratis inaequaliter incis, obtusi supra
pili unispermis minutis. Petioli inermes pilosi. Racemi pediculi
4-5 flori calloso bractea minutis pedicello brevior Calyx hirsutis glanduloso
teretis