

# Ricinus

1. inermis R. foliis peltatis peltatis subpalmatis serratis, petioli glandulosis, fructibus inermibus
2. communis R. foliis peltatis subpalmatis serratis, fructibus echinatis
3. tananuis R. foliis peltatis repandis
4. mappa R. foliis peltatis integerrimis
5. divi dios R. foliis cordatis acuminatis petiolatis integerrimis

portoricensi Ruinus folio peltatis ovati integerrimis glabris.

Habitat in Porto rico herb. Qu. 5

rami glabri, cortice pallide rufescente, ciliati. Folia superne,  
peltata, bi-tripolliciana, sparsa, ramum acuminata, subquinque nervia,  
obscure venosa. Petiolus longitudine fere folii, plerumque folio infra basin  
insertus raro in ipso margine. Pedunculi axillares, folio longiores, pri-  
mum trifidi, dein ter dichotomi. Pedicellus in dichotomia. Calycis laciniis  
lineares, acuta, glabrae. Petala calycis triplo longiora. Capsula piso  
duplo major, globosa, glabra.

Ricinus

Habitat in India orientali herb. Gesl. 5

Rami tomentosi. Folia pithamsea dulcia, peltata, ovata, acuta, integer  
rima, attenuata, supraglabra, subtus incana tomentosa, venosa. Spica ver  
minalis tomentosa, & multifera elongata. Capsulae magnitudine fere  
muci Conyli, tomentosi, setis plurimis tecti, quadriloculares, spermo

arborescens Pinus? foliis

Habitat in insula Bourbonia Commeson herb. Mus.

Rami teretes, glabri, cortice cinereo, ciliati, cum tuberculo supra axil-  
lari. Folia superne, semipedalia, ovata, acuminata, integerrima, ner-  
vosa venosa, venis obliquis inter nervos, costa subtus villosa, axillis saepe  
nervorum saepe tomentosi. Stipula subulata. Petioli longi, folio tamen  
breves. Racemi axillares, longitudine petioli. Flores parvi, distan-  
tes. Calyx glaber  
sanctus foliis ovato-lanceolatis valde attenuatis.

communis R. foliis peltatis subpalmatis serratis <sup>lun</sup> & fructibus echinatis  
Ricinus gallicus palmo Christi Lobel. herb. 392.  
Ricinus vulgaris Bauh. Pin. 439  
Ricinus albus Rumph. amb. 4. p. 92.

✓ Ricinus lividus Jacq. Misc. vol. 2. pag. 360  
Ricinus africanus maximus, caule geniculato villositate Tourn.  
F. R. II. 542

Ricinus ruber Rumph. amb. 4. pag. 92.

In hortis B. in solo natali India utraque, Africa &

Folia in quinque vel 6 lobis. Divisa lobis ovato lanceolatis  
glabris serratis. Pedunculis ex apice. Flores in racemof  
moficuli plerumque inferne pedicellati. Seminei superne  
in axillis pedicellorum moficulorum subsessiles. fructus echinatus  
Antheram sulculo se aperunt claudunt, iteratis vicibus, pa  
gula vice pollen emittant Ruch.

medicus R folio palmatis septemlobis: lobis lanceolatis; infimi divarica  
tis Foye fl. amb. pag. 164

nisi cytotus nonne eadem ac communis?

inermis A. foliis peltatis subpalmatis serratis, petiolo glanduloso fructibus  
inermibus Haerq. Musc. vol. 2. p. 362. L. V. pag. 263

non vid.

*Tanaisius* *R. folio peltatis repandis* Lin. I. V.

*Tanaisius minor* Rumph. Amb. 3. p. 190. Tab. 121.

Habitat in India

non vidi



mappia. foliis peltatis indivisis Lin. l. V

Solum mappia Rumph. amb. 3. p. 172. Tab. 100

Habitat in Ternateis, Moluccis.

Crampi superne ~~ramentis~~ subinerafientes. Folia ovata acuminata  
la multinerviâ glabra, integerrima. Pedunculus ramiflorus  
Flores sessiles per intervalla glomerata parvi

La manhu herb Guaf. folia subtus villosa, mollissima denticulata. Ra-  
icem axillarem compositi. Polypis lacinis lanceolata dentata herb Guaf.

*acuminata elongata*  
Drosera Piccinus foliis cordatis acuminatis pectolatis Hoff. prodr. pag. 67.

Habitat in Tanna.

Folia multinervia nervi ~~tonent~~ mollebus supra glabra integer  
nona. Pedunculi maris ramosi ~~tonent~~ floris parvis minutis  
foeminei ~~foeminei~~ brevi pedicellati plures in axillis foliolorum duo  
num oppositorum. Foliole ovatae subdentatae.  
folia in mare acuta

Descriptio descriptio fractus

Cylindroca 11

Boehmeria

apetala Rivinii foliis basi petiolatis obovatis integerrimis Lou. fl.  
c. v. pag. 505.

Habitat circa Cantonem Suanum.

fructus 4 pedali. Folia basi rotundata, glabra subtus albicantia, sparsa  
petioli longi. masculi flore et foeminei in eadem planta. ♀ calyx 3 partibus  
trigynatus 3. perisperm. und versa canoso, reflexa. Capsula villosissima, 3 loculari  
1 sperma.

non vidi.