

Rivina

1. humilis R. racemis simplicibus, floribus tetrandris, foliis pubescentibus ovatis
2. Loxa R. racemis simplicibus, floribus tetrandris, foliis glabris ovatis
3. octandria R. racemis simplicibus, floribus octandris dodeciandrisve, foliis
lanceolato ellipticis glabris

*Cat. folia. Ruina racemus simplicibus corymbosis floris baccis piceis, foliis
lato-oratis levibus. La Mark. T. E. pag. 324
Habitat in Madagascar*

non vid:

oblonga

Secunda R. foliis ovatis acuminatis obsolete denticulatis ciliatis, racemis
elongatis, calyce bipartito bilabiato flor. Peruv. 1. pag. 65. Tab. 102. fig. a.

Habitat in Andium nemoribus.

Caulis suffrutescens, bipedalis, erectus; inferne vix glaber, superne angulatus
paucum ramosus, lentius pubescens. Folia alternis, petiolata, oblonga et
utrinque glabra. Petioli purpurei lentius pubescentes. Racemi axilla-
res terminalesque, solitarii simplices, floriferi laxi breves, fructiferi
erecti longi. Flores initio sparsi, dein secundi. Bractea subulata, com-
mune ad basin pedicellorum, apice squamis minutis ovatis, caducis. Calyx
in flore albus, in fructu viridis, irregularis, bipartitus: lacina superiori
brevis, ovata, concava, integra, inferiori semitripida: laciniis ovatis
intermedio productiore. Germinis lentiforme, vix pedicellatum. Semen
unicum lentiforme ex pulvere nigro nitidum farinosum fl. Peruv.

[Rivina]

lati folia Bursera

Habitat in Madagascar herb. Desfont. 5
Rami teretes, glabri, pumtati. Folia petiolata, alterna, 3-4 peltati, ellipti-
co-ovata, acuminata, utrinque acuta, glabra, venosa, integerrima. Racemi
axillares, pedunculati, folio breviores. Flores parvi. Bacca (Capsula) glo-
bosa parva, glabra. Calycis lacinae ovatae, in fructu fere parum longius
patenter

brachyensis *Rurina* racemis simplicibus, floribus tetrandris, foliis ovatis
undulato-nerviis, caule sulcato Wied. spec. pt. pag. 693.

Rurina brachyensis foliis cordatis glabris, floribus pinnatis
tetrandris Norcia in Lest. bot. Ann. 6 H. p. 63.

Habitat in America

non vidi

2. octandra R. racemis simplicibus; floribus octandris dodecandris ve Lin. S. V
p. 165 & Jacq. Am. acad. 4. p. 305.
Rivina scandens racemosa, amplioribus foliis, baseis violaceis
Plum. gen. 40. ii. 241.
Rivina fermentosa, fermentis crassioribus, foliis ovatis, floribus purpureis
Dodecandris Brown. gen. 149. tab. 23. fig. 2.

Habitat in America calidioribus
Tota glabra. Ram. teretes. & olea petiolata, ^{alterna} ^{lato} canaliculata utraque
acuta interdum obtusiuscula mucrone terminata bipolli-
cari et ultra subarenia integerrima. Ramuli floriferi, axilla-
ris longitudine petiolorum squamula una alterave ^{superi} adpressi-
angulati, apice ^{3 foliis oppositis} triplicifolii. Peduncululi ex apice domi-
conum solitarii. Flores ^{3 foliis oppositis} alterni copiosi. Capsula cuneiformi
teretiusculata. Bractea subulata in medio pedicelli

Canaliculata

humilis R. racemis simplicibus, floribus tetrandris, foliis pubescentibus

Amaranthus baccifer, circa foliis Com. hort. 1. p. 127. t. 66.

Solanum barbadense racemosum minus fructuosum Pluken. alm. 353. t. 112. fig. 2.

Ray. h. 3. pag. 349.

Burna humilis racemosa, bacis purpureis Plum. gen. 48.

Prescia tomentosa Mill. Det.

Habitat in Canhoi, Tamasco, Barbados & orata
Tomentosa incana. folia ^{racemosa} petiolata integerrima sesquipollicina
villosa mollia pubescentia. Petioli cavi, racemi terminales tan-
dem oppositifolii foliis triplo longioribus. pedicelli penduli et bracte-
ati, bacis globosis

2 *Cornish* racemus simplicibus, floribus tetrameris foliis glabris Lin. Mant. 41.
S. V. p. 165

Solanoides americana, cernua foliis glabris Tournefort in Act. par. 1706

Persea foliis ovato-lanceolatis glabris Mill. Dict.

~~Habitat in~~ America;

similis praecedenti diversa vero quod tota glabra