

Robinia

1. pseudoacacia R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari pinnatis, stipulis spinosis
2. violacea R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari pinnatis, caule inermi
3. sepium R. inermis, pedunculis racemosis, pedicellis floris, foliis impari pinnatis, pennis ovatis acuminatis
4. hispida R. racemis axillaribus, foliis impari pinnatis, caule inermi
- 5
- 6
7. Caragana pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, foliolis oblongis, petiolis inermibus
8. nervosa R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, foliolis oblongatis nervosis glabris, spinis stipularibus patentibus
9. spinosa R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis subtisjugis, foliolis lanceolatis acutis, stipulis petiolisque spiniferentibus
10. Chamlaque R. pedunculis unifloris subsolitariis, foliis abrupte pinnatis byzigi foliolis cuneatis, petiolis stipulisque spiniferentibus

Caragana

11. *Calodendron* R. pedunculis axillaribus trifloris, foliis ternatis: ^{netiolatis} foliolis lanceiformibus
 pinnatis cuneatis, petiolo spinescentibus
12. *Frutescens* R. pedunculis simplicibus, foliis ^{cuneatis} quaternatis ^{netiolis} subquadratis, ^{netiolis} pinnatis spinescentibus
13. *pygmaea* R. pedunculis simplicibus, foliis ^{netiolis} subquaternatis. foliolis linearibus hi-
 pedulis.

argentiflora Robinia racemis pedicellis bifloris, foliis impari pinnatis, foliis oblongis
glabris, corollis leguminibus tomentosis.

Habitat in Guinea Herb. 5

Inermis. Rami verat, glabri, fusci cinereo punctati. Solia petiolata, trijuga: folio
la petiolata, opposita, caetium tripollicare, velypa minor, sape obtus acu
minata, glabra, subtus nervis vellosis, supra subarenia. Petiole uti pedun
culi tenuiter tomentosi. Pedunculi axillares, solitarii, longitudine folio
rum: pedicelli brevissimi. Calyx obsoletus dentatus, campanulatus,
ferro viridis. Petala extus tomentosa, argentea. Legumina lanicolata,
interdum extus serpens latiora, minorata, compressa, tripollicaria,
et illis dentis ferro viridis tomentosa.

Arbor magnitudine fagi. Stipula filiformis breves deciduae. Legumina inter
dentis supra assue inlocutamentis. Semina 4-8, compressa.

affinis Robin. molli an eadem

acuta Robinia? racemis axillaribus terminalibusque compositis, foliis impari-
pinnatis, leguminibus verticibus acutis tomentosis.

Habitat in Guinea West

Inermis. Rami teretes, glabri, cortice cinereo. Folia quinquemura; foliola pedis
lata, opposita, exteriora ^{ovata-oblonga} sesquipedalium, interiora minora, parum acuminata,
obtusiuscula, venosa, supra glabra, subtus pubescentia e tomento
venis primis. Stipulae subulatae, parvae. Stylis brevis pedicellati; pedi-
celli uniflori. Calyx obsoleta dentatus. Corolla glabra. Legumen exil-
is densis ferrugineis fusis tomentosum, verticibus.

~~interiora~~ ~~oblonga~~ ~~parva~~
~~foliola~~ ~~oblonga~~

figura foliolorum desideratur

divaricata Robinia, racemis axillaribus ~~terminatis~~ ^{simplicibus}, pedicellis geminis unis floris, foliis impari pinnatis, ^{foliolo ovato-oblongo} leguminibus oblongis

Habitat in Guinea Thonning, Fruct. 5

Arbor statura Fagi, inermis. Rami teretes, glabri, cortice cinereo. Folia tri vel quodrijuga: foliola petiolata, opposita, inferora ovata, minora, exteriora ovato-oblonga pollicaria, subacuminata, utraque glabra, obtusa, obscure venosa. Racemi axillares. Stipula utraque, lineari, decidua. Racemi solitarii, laxi, longitudine foliorum. Calyx campanulatus, squedentatus, glaber. Vestitulum intus pubescens. Legumen magnum oblongum, compressum, densim latius obtusum cum acumine, intus pulpa exsuta in loculamentis divisum. Semina 4 Thonning.

longifolia Muspenda

Habitat herb. La Martini

Tota glabra. Rami inferne teretes, folia terna, sessilia, sive pollicaria,
lanceolata, basi versus sensim parum angustata, supra arenis, mi-
me nitida, subtus obscure venosa, acuta. Stipula ovata, acuta. Corym-
bus terminalis, densus, compositus. Calycis lacinie lineares. Ductus line-
arum quinque elevati.

Madagascari

Mus. long. foliis reticulato ternis, confertis, lanceolatis, oblongis, capsula
cordato striata, coronata 4. 0. 3 93.

polyantha Robinia racemis terribilibus compositis, foliis impari pennatis,
Cymenibus lanceolato-oblongis

Habitat in Guinea Honning

Stem canis sericus oryzalis. Folia latiora obovata, 4-5 juva
foliola brevissima petiolata, ~~est~~ 3-5 pollucina, oblonga, parum acu-
minata, venosa, glabra, rigidiuscula. Stipulae acutae, marascentes.

Pedunculus universalis pedalis, terreus, subpubescens, erectus: partha-
lor 20-40, 1-3 pollucinae, busum benzoin breviores, multiflori, pedicelli
breves, solitarii. Bractea brevis ad basin pedunculorum et pedicellorum
et sua ad basin calycis
calyx campanulatus, pubescens, 4 dentatus. denta superiori latiore. Corolla
alboidacea. legumina ^{en} compressa, pubescentia. Honning

pedicelli an uniflori

[= R. cyanescens]

Tocoyena Aubl.

Habitat Cayenne d. d. d. Richard 5.

Rami obscure 4-anguli, glaberrimi. Folia petiolata, spithamea, opposita, lato oblun-
go, acuminata, subtus ovacea, aranea, nitida, subtus pallidiora, subnervosa. Sti-
pula laterales; ovata-lanceolata. ^{Complanata, longi} Pedunculus terminalis, ^{pedunculatus, 3-lobus} erectus, ramosus. Cal. 5
que dentatus. Corolla 4-5 pollicari. Saux villosa. Stylus clavatus. Anthera ver-
sus basin horizontaliter filamentis inserta. Corolla laciniis lanceolata.

speciosa

herb. La Martini

Legium Rolinia enervis, pedunculis racemosis: parvialibus bifloris, foliis impari
pennatis, pinnis ovatis acuminatis Sw. prodr: pag. 106.

Habitat in Montserrat in Pyren.

Rami glabri, teretes, inferne grisei, superne flexuosi fusci.

Folia petiolata, alterna, pennata cum impari, quadripuga: foliola
opposita, petiolata, bipollicaria, interna minora, latera ovata, late
gemina, acuminata, acumine obtuso, utrinque glabra, vix vero
sa, subtus pallidiora


Petioles teretes, teneri.

Racemi axillares et terminales, solitarii longitudine foliorum,
multiflori, Pedunculi teretes, fusci: ^{partiales} ~~pedicellati~~ ^{prospici} filiformes
biflori: pedicelli pedunculo parviali conjuncti. Flores magis purpurei

Calyx campanulatus, subinde geminus, glaber.
Vexillum emarginatum.

Stamina filamenta 10., omnia connata

Legumen compresso foliaceum utriusque stylo in Pyren.



Robinia mollissima

mollissima Protinia pedicelli rami bifloris, foliis impari pinnatis, foliolis ovatis villo

si.
Habita in insula Trinitatis ab Ryan &.

Fructus. Rami teretes, cortice fusco crassiflora, albido punctati, ramum flexuosi, superne flavido tomentosi.

Folia petiolata, alterna, pinnata cum impari, quadrijuga. Foliola petiolata opposita, ^{ovata} terquipollicaria, interiora minor, terminalia reliqua majora et oblongo-ovatum, supra nitidiuscula vix tamen glabra, subtus villosa et molliora, acuminate: acumine obtuso; supra nitidiuscula tamen vix tamen glabra nervosa nervi ^{longe} flavescenti, subtus villosa et molliora nervi exstantibus venosa.

Petoli omnes villosi subtomentosi. Scipulo forte deciduo.

Pedunculis axillares, solitarii, longitudine foliorum, tomentosi. Flores copiosi pedicellati. pedicelli brevissimi biflori.

Calyx campanulatus, tomento fusco, truncatus, vix dentatus.

Corolla vix ellum, subrotundum, unguiculatum, emarginatum, marginibus rariis erectis, basi subcordatum margine ^{extus fere} cuncto utraque dente obtuso brevi.

Ala erecta longius unguiculata, oblonga. Carina dipetala: petalis alis angustioribus et brevioribus, unguiculatis.

Stamena filamenta 10, omnia connata, unicum basi tantum distinctum

Stigma subtile villosiusculum

allano Rob. panos Aub. distincta videtur stipulis magnis, foliis pluribus; pedicellis longioribus calycibus siccis, si modo figura et descriptio fidentia

pygmaea Rob. pedunculis simplicibus, foliis quaternatis sesquibus Linn

L. V. p. 668 + Rei. pl. pag. 1044. 4

appalachi frutescens minor angustifolius cortice aureo am
man. mth. 202. 8. 35.

Robini frutescens pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis
subpetiolatis Hort. Ups. 212. ~~est~~ Rob. pygmaea culta

Habitat in Sibiria

позанс.

glycyphyllo Robinia

Habitat in Martinique herb. La Mart.

Caulis fruticosus, erectus, ramosus, glaber. Folia petiolata, pinnata cum impari, 7-juga.
Foliola petiolata, opposita, pollicaria, oblonga, glabra, venosa, subtus glauca, mucronata.
Stipula subulata. Racemi axillares, plures, bipollicares. Flores copiosi.
Pedicelli uniflori. Calyx coloratus, tubulosus, obscure bilabiatus, squedentatus: dentibus
oculo armato villosulis. Corolla glabra. Legumina bi vel tripollicaria, recta, pedicel
lata, pedicello calycis longior, mucronata, compressa, linearia. Filamentum 10 lin
distinctum.

viscosa Robinia micemj pedicellis uniflori, foliis impari pennatis, Stipulis
setaceis, ramis ^{pedunculisque} viscosis
Habitat in America boreali ex hort. de Colo. 5

Trunci Rami teretes, furci, punctati, glabri, viscosi. folia 7-8 juga: folia
la interna aeterna, externa opposita, petiolata, ope lentis raris
minutisque villis adspersa, obtusa, mucronata, pollicaria, interna
ra menora. Stipulae patentes, unguiculares. Racemi axillares, folio
breviores. Flores sparsi, magnitudine Robiniae hispida. Pedicelli
et pedicelli viscosi

nanacoco Rodinia

Habitat in Guana ex herb. Tur.

Rami validi, angulati. Folia 6 puga. Foliole subsessilia, oblonga,
basi subcordata, quadrupolliciana, internodia minor, remota
supra glabra, subtus villosa, incana, reticulata, acuminata.
Petioli florescenti tomentosi. Stipula ovata, unguiculares, inter
glabra, extus fusco tomentosa.
Aliud specimen folioli fere pediculi subtus sericeo.

Strata Robinia

La Martk. illust. herb. 606. fig. 2.

Habitat in Martinique herb. La Martk

Rami teretes; cortice cinereo, glabri, juniores villosi-canescentes. Folia petiolata, pennata cum pari, octojuga: foliola subpetiolata, opposita, unguiculata exteriorum minorum, oblonga, glabra, subtus villosa. Squela subulata. Flores antequam folia in ramulis retustionibus. Pedunculi aggregati, uniflori, unguiculati. Legumina linearia, compressa, pedicellata affinis maxime *Rob. florida* ad petioli apicem subsuavescentes.

Panacivio R panicula spicata terminali foliis impari pennatis
tomentosi, stipulis subtundis Aubl. fl. gu. pag. 760.
Tab. 307.

Habitat in Guiana &

Rami articulati, alternatim ciliati, ciliis utrisque et strobil.
bus. Rami ciliati, bi-3 pollicares. Pedunculi ferrugineo-
tomentosi, tetragoni, post caput florum obtuse dentati. Pedicelli
alterni uniflori. Calyx crispus, longitudinaliter rumpens in
4-5 lacinas, una quales. Legumen pedicellatum glabrum
Petioli supra, uti folia subtus incani, costis et petioli subtus
sordide grisei herb. & s. f.

pendula *Robinia inermis*, foliis imparipinnatis, ramis deflecto
pendulis, racemis pedicellis geminis unifloris Ortega. Dec. pag

26.

Habitat in Regno Peruviano &

Rami juniori lanuginosi: folia 6-8-juga: foliola ovata

Racemi folio duplo breviori

non vidi

1. Pseudo-acacia R. racemis, pedicelli uniflori, foliis impari pinnatis, stipulis pinnatis
L. n. 1. 5

. Acacia affinis virginiana fruticosa, filiqua membranacea plana

Platn. alm. 6. p. 73. t. 4.

Habitat in Virginia &

Rami venter glabri. folia 3-8-juga: foliola opposita petiolata
ovalia, glabra, pollicaria, vix mucronata, venella ferruginea.

seta utrinque
supra ad
foliolum

Peduncululi axillares solitarii, foliis brevioribus: pedicelli sparsi
stipula parva rigida subsessilis legumen

Culta

folia mihi videntur pari pinnata, ^{vel} absque terminali foliola saltem

4 hispida R.

racemis axillaribus, foliis impari pinnatis, caule inermi Linn.
Mant. 101. & S.V.p. 660.

Pseudo-acacia hispida, floribus roseis Catef. Car. 3. p. 20. & 20.

Robinia foliis impari pinnatis: folioli ovatis, ramis pedunculis
que hispida Mull. ic. 163. t. 244.

Robinia racemis axillaribus, pedicellis unifloris, foliis im-
pari pinnatis, caule inermi Gaerth. h. 211. d. 179. fig. 101.

Habitat in Carolina, Cartagena & pedicellis

Rami uti petioli caeser, pedunculi et calycis flos coriacei
rigidi adpressi. folia 5 juga, foliola subopposita ovata
pedicellata pollicaria ^{ut supra} extensa versus majora, supra glabra
subtus pallidiora mucronata. flos ad singulum foliolum
petioli partiales villosi. Sepala setacea semiunguiculata
flexiles. Racemi axillares foliis breviores. Flores purpurei
speciosi

Culta

Differentia nil valet

2 violacea B. racemis pedicellis ^{bifloris} unifloris, foliis impari pinnatis, caule inermi
Lin. S. V. Gaiqu. bot. 210. t. 177. fig. 49.

Pseudazacia floribus violaceis Plum. spec. 19.

Habitat in America calidioribus

foliis 2-5 pinnis hirsuta ovata obtusa, emarginata, petiolata
opposita, bipollicaria. Racemi axillares semper alii: pedunculi
pedicelli breves, biflori numerosi. Calyx campanulatus in 5 lobos
legumen oblongum compressum alutem, uniloculare bivalve
semina reniformia compressa. Gaiqu.

non vidi

Gaiqu. in hac specie pedicellos esse bifloros dicit in sequenti
vero unifloros

3 *Lepium* R. ^{unifloris} nervis, pedunculis racemosis; parthalibus bifloris; foliis im-
paripinnatis, pinnis ovatis acuminatis Sw. prodr. p. 106.

Robur *Lepium* Fairb. hist. 211. tab. 179. fig.

Habitat in Hispaniola;

Rami teretes. folia 3 pinnis ovata obtusa apice attenuata, nitida
integerrima bipollicinaria, petiolata. Calyx campanulatus
cervicis quinque cinctus. Legumen compresso-planum.

Plantam ex India habui forte eadem Diversa tamen ut videtur calycibus
oculis
quinquefidi villosi subpinnis laciniis superioribus ovatis. bractea
gemina ad singulum calycem subulata. Filamenta omnia
conserta. Germe villosum.

mollis Robina

Descript quare inter amari

Mico Rob. *Spica axillari foliis impari pennatis, ramis
scandentibus* Aubl. fl. Gu. pag 771. tab. 300
Habitat in Guiana 5

non vido

5.6 Florida Robinia pedunculis simplicibus unifloris, foliis abrupte pennatis,
petiolis stipulisque inermibus. Tab. LXVIII. LXX
~~fructum pulcherrimum~~
In insula Krabben Eiland Dicta Cimerici (legit ab West)
Frutex pulcherrimus; tempore florentis aphyllus, floribus
sordum totus tectus.

Rami teretes, glabri, purpurascenti-cinerei, punctati, glabri.
Solia ~~petiolata alterna~~, inferiora a gemma proterenti anni post
caesum florum, plerumque duo vel tria, approximata, digitalia
foliis vix unguiculatis; superne et in rami junctibus
~~petiolata alterna~~, ~~remota~~, dimidio longiora, foliolis vix polli-
cariibus, omnia pennata cum ~~paris~~ petiolata, alterna, pun-
nata cum ~~paris~~, 9-10 puga. Foliola breviter petiolata, opposita,
glabra, oblonga, venosa, mucronata, interiora parum minus
ia.

Petiolus inermis. Stipula lanceolata, parva, attenuata, iner-
mis, flexilis, persistens.

Pedunculi quatuor vel quinque a singula gemma, unguiculati,
capillares, uniflori, sub flore geniculati
Calyx cyathi formis, glaber, margine integro. Ad lentem villosus

Corolla magna purpurascens: Unghes petalorum longitudine calycis
germen glabrum

~~foliis ovatis
rami teretes, glabri, cortice fuscopurpureo, angulis
infra dehiscentibus. ramuli alterni, foliis, unguibus
foliis brevioribus, e squamis imbricatis laevibus.
lobis versus apicem ram~~
habitat in insula St. Thomae Americae in West. I.
fruticosa multicaulis, stipulis minutis
radice racemosa, nodis villis unidentatis, foliis abrupto punctatis: foliolis

56 Squamata Robinia racemis pedicellis unifloris, foliis abrupte pennatis: folio
li ^{proalibus} pinos mucronatis, stipulis ^{res. v. l. inermibus} pinosis Tab. ~~LXXVI~~ LXIX
Habitat in insula s. Thome Americae In West. 3

Rami Verdes, glabri, cortice purpureo ^{griseo}, inferne aphylli,
saepe versus apicem foliosi, infra folia squamati. Ramuli
alterni, pollicares vel breviores, e squamis ^{ovatis acuminatis} ~~tetragonis~~
imbricatis tetragonis.

Folia versus apicem ramorum, alterna, distantia: ramulorum ex
ipso apice ^{petiolatis} vel parum infra, interdum solitaria interdum 2. f. 3;
omnia ^{est v. m. l. t. i.} pinnata cum pari, novemnervia. Folcola brevissime petio-
lata, alterna, unguiculata, ~~in quibus~~ ^{est v. m. l. t. i.} ramulorum parum minor,
~~et~~ longa parum minor, utraque ^{omniter} glabra s. subtunda, etia
que glabra, nitida, simpliciter venosa, ~~et~~ subretusa, costa
ultra folium in spinam excurrente.

Petiolus inermis. Stipula pinosa, unguicularis, rigida, spinosa, erecto-patentes
persistentes. Peduncululi axillares, solitarii filiformes, pubescenti. Pedicelli
quatuor vel quinque, distantes, sub flore geniculati, Bractea parva

1*

lineari ad basin pedicellorum

[Calyx glaber: laciniis lanceolatis

legumen compressum, dispermium lineare setum acutum interdum
subarticulatum, interdum inter semina coarctatum, di f. 5 per
ma

[Ltr. L. pag. 89.]

sepiaria R.

Robinia sepiaria Gaerth. coll. 1. p. 103

Habitat in Florida O

Stipula subulata
to
Caulis erectus, teres glaber 3-7 pedalis superne ramosus. Folium primum cau-
linum simplex ovatum, integerrimum obtusum brevissime petiolatum. reliqua om-
nia pinnata sine impari petiolata alterna, sesqui pedalis 20 puga. foliola
oblonga obtusa mucronata, integerrima pallidiana opposita, glabra, brevi-
sime petiolata. Pediculi axillares, solitarii, graciles, foliis brevioris, 15 flori-
cola lutea legumen fuscescens franosum albidum inflatum oblongum
longe pedicellatum, compressum, utraque acuminatum, ad femina toto-
rum, uniloculare bivalve. Gaerth.