

Rondeletia

Leghämödia Schreberii hinc pertinet secundum Tuspea

buxifolia et parviflora

Corolla monopetala, extus cinereo villosa. Tubus galeiformis, ^{parum} superne ampliatu-

Limbi lacinis oblongis, obtusis.

Stam: filamenta quatuor, brevissima, tubo superne inserta. Anthera linearis, tubo
inclusa.

Germen inferum, globosum, villosa-cinereum. Stylus linearis, sursum versus in-
crassatus, basi villosus. Stigma obtusum

Capsula magnitudine Piperis nigri, globosa, villosa, calycis coronata, bilobula

ni.
Semina plurima

(an *Rondeletia pilosa* Swart: prodr. pag. 41 ?)

lucifolia
obovata Rondeletia lucifolia, Rondeletia
foliis obovatis glabris, floribus tetrandris axillaribus solitariis.

Habitat in Montserrat St. Bryan?

Rami glabri, articulati: articuli bipollicares, superioribus versus sensim minores, inferiores
veretibus, superiores compressi subtrigoni, supremi compresso-angustati, apice dilatati. Ramuli oppositi, patentes, breves.

Costa subpetiolata, opposita, pollicaria, obovata, utraque glabra, nervosa, sub
venosa, in extremis, margine parum reflexa, subtus pallidiora, basi acuta
acumine obscure terminata.

Petiole brevissimi

Pedunculi axillares, solitarii, oppositi, petiolo parum longiores, uniflori, rarissime
in axillis ultimis triflori cum folio utraque parvo, medio utraque bractea mini-
ta canescens autem quatuor

Calyx superior: laciniis 4., linearibus, obtusiusculis, persistenibus, in fructu reflexis

Corolla tubus canescens, filiformis, vix unguiculari. [#] Limbus quadrifidus?
Laciniis oblongis, brevibus, obtusis.

Stamina. Filamenta vix ulla. Anthera quatuor, lineares, erecta, apice parum ultra
tubum porrecta.

Pistillum. Germen inferum parvum, oblongum. Stylus longitudinis tubi. Stigma subtrifidum;
^{laciniis aeternam parum brevior}

Capsula magnitudine Piperis nigri, globosa, canescens, utraque sulcis exarata,
calyce reflexo coronata, bivalvis, biloculari, disperma

Sept 10/17

pubesca Bon foliis petiolatis ovatis utraque pubesce, pedunculis axillaribus foliis
oppositis trifidis, floribus tetrandris Sw. prodr. pag. 41.
Habitat in Jamaica

virgata B. foliis petiolatis cordatis subrotundis, ramis lateralibus filiformibus pa-
rentibus floribus apice trifidis, floribus confertis tetrandris Sw. prodr. pag

41.

Habitat in Hispaniola

americana *Rondeletia foliis sessilibus, panicula dichotoma* Lin. *Spec. p. 245 **
L.V. 212

Rondeletia aboefcostini facie Plum. *gen. 15. F. 142. fig. 1.*

Habitat in America ty

Arbustulo folia opposita, sessilia, lanceolata. Pedunculi communes
solitarii, longissimi nudi, apice formantes corymbum dichotomum,
in cuius singula dichotomia fl. sessilis, cum involucro diphylo. Lin.
Spec.

~~micrantha~~
~~parviflora~~

Rondeletia foliis lanceolatis ellipticis racemosis supra glabris racemis
decompositis ^{remorosis} ad marginem revolutum

Habitata India orientalis Nonny 5

Rami teretes oppositi ferrugineo villosi tomentosi. Folia
quadrilobata opposita, tri-vel quadrinerviata elliptico lanceola
ta acuminata utraque acuta, integerrima, axemina oblique ner
vosa supra glabra subtus villosula profertim in nervis, obfure
venosa stipula utraque acuminata ad presse basi in membranam
intra folia connata. Racemi axillares et terminales
decompositi bractea lineari ^{pyramidalis} ad ~~bases~~ ⁱⁿ ramorum racemi et
plorum. floris copiosissimi. Calyx perianth. 1 phyllum squedenta
rum superum. Corolla monopetalata tubus hypocrateriformis tubus
cylindricus lineari glaber limbus laciniis squae oblongis subreflexis
filamenta nulla anthera squae oblonga inter lacinas corollae
germen inferum globosum stylus longitudine corollae stigma
compressum plane bilamellatum reflexum latum.

obovata R. foliis petiolatis subovatis obtusis Lin. Spec. pl. 1671. t. v. p. 212

Rondeletia odorata Jacq. non vid.

Dipserma R. foliis petiolatis ovalibus obtusis - Jacq. hist.

non vid.

~~afiatra Cord. foliis petiolatis oblongis acutis Linn. S. V~~

~~Pup. Rheed. Mal. 2. p. 37. T. 23.~~

~~Habitat in Malabar, Zeylona. †~~

Thyrsoides R. foliis oblongis membranaceis, subtus pubescentibus, Thyrsis lateralibus

Sw. prodr. pag. 41.

Habitat in Jamaica

Tomentosa R. foliis ovatis acuminatis tomentosis, pedunculis tripartitis axillaribus
brevibus Sw. prod. r. pag. 41.

Petepi 3. Brown. Jan. 144.

Habitatio Jamaica

umbellulata R. foliis lanceolato-ovatis, sub-hirsutis, pedunculis axillaribus
foliatis, apice trichotomis, floribus confertis in pedic. pag 41
Habitat in Samaria 5

incana R. foliis ovato-lanceolatis subtus incanis, scabris; pedunculis axillaribus
simplicibus trifloris Sw. prodr. pag 41.
Habitat in Jamaica;

non vid.

hista Rondeletia foliis petiolatis, oblongis acuminatis ramis hirsutis pedunculis longitudine foliorum
hab in Gamala ty

Superne alter Ramis teretibus hirsutis petioli pedunculi et nervi foliorum subtus
nati compressi tolia opposita petiolata, oblonga, acutissima acuminata
supra glabra subtus pal. lineata secundum nervos; subtus pallida
patentes bipolliciana et ultra
petiolus semper unguis alaris.

Stipula utraque una cordato ovata acuminata.


apice compressus Pedunculi axillares oppositi longitudine foliorum structura ram
ubi Pedicelli bis trifidis foliolis lanceolatis. structura ramorum sub prima diversura
Pedicelli triflori floribus subsessilibus bracteis linearibus ad basin
Calyx hirsutus quinquefidus laciniis lanceolatis.

Capitula globosa utraque sulcis, pilosa magnitudine pisi laciniis c

hista R. foliis ^{lyronata} petiolatis ovato-oblongis acutis pilosis. pedunculi ^{trichotomi} axillaribus 4. theca
in fructu maturo Calyx facile diffidit ^{non vero} ~~in~~ fructu ad nascent
in Calycibus superis

ex Hort. Regis hinc Rondeletiam habui sed nomine odorata hinc simillim. floribus flavo
trophis foliisque acutis non vero obtusis ut hab. charact. Odorata

aliam communicavit Dr Torfeith. in nullis aliis diversa nisi Pedum floribus
racemoso paniculatis, Pedicellis oppositis bis divisi per trifloris unifloris



herpata R. foliis ovatis acutis herpatis, pedunculis axillaribus trichotomis catis, flori-
bus herpatis Sw. prodr. pag. 41.
Habitat in Jamaica;

Trifoliata *Rondeletia foliosissima* Linn. Spec. pl. 1671 & S. V. pag. 212 Jacq. herb. T. 43.

Rondeletia atropurpurea, Vini facie Ehrh. p. 15.

Habitat in America,

Folia terna, petiolata, lanceolata. Pedunculi foliis breviores, nec ut in
Plumieriana longirostris Spec. l. c.