

Rosmaninus

Cpr. inequalis, ^{gen. n. Schreb. n. 49} labio superiore bipartito. Filamenta longa, curva, simplicia cum dente.

1. officinalis R.

5.
5. C. Rosmaninus. Pal. 2 labiatus; labio superiore integro. Cor. ringens; labio superiore bipartito. Filam. longa, curva, simplicia cum dente.

officinalis 1. Rosmarinus foliis sessilibus - Widen. Spec: pl. 1. p. 126.
latifolia foliis linearibus obtusis, utrinque viridibus Mill. Dict 2
Rosmarinus sylvestris major Card. hist.

Rosmarinus officinalis Lin. Syst. Veg. Riv. t. 39

angustifolia B.

Rosmarinus Fuchs. Hist. p. 470 ^{hist}

Rosmarinus foliis linearibus, marginibus reflexis, pubescentibus
Mill. Dict. ~~nat~~

Habitat in Hispania, g. narbonensis, Italia, Helvetia, Orientis,
africis, septentr. collibus, in Istria montanis inque Japonia

et quodam
indext ~~in~~ pedalis: Rami erecti, stricti, tetragoni, canescenti;
rudimenta ramulorum ex axillis foliorum. folia opposita, sub
tus nymphaea. Rami pauciflori, breves, ex apice ramulorum
lateralium: pedicelli oppositi, canescenti, uti calycis.

~~fruticans Gasmium foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis angulatis
L.V. 56. ~~Herb. Borgh. Spec. pl. 9. 4.~~~~

~~Gesnerii species Aug. Polemonium monspeliense Gesn. ad. Lob.
Trifolium fruticans Dod. pempt. 571.~~

~~Gasmium luteum, vulgo dictum balliferum Bauh. pin. 390.
Habitat in Europa Australi, et toto Oriente h~~

~~fruticans G. foliis alternis ternatis, ^{in lobis} lobis obovatis cuneiformibusque obtusis
ramis angulatis, caeciniis ^{alternis} lyciniis subulatis H. Kerst. 1. p. 9~~

~~rami glabri et lineis decurrentibus glabri folia glabra, unguiculata.
Paniculi terni alterni simplices. Caecina corolla oblonga obtusa~~

chilensis ^{Rosmarinus} foliis petiolatis molin. hist. nat. Chil. pag 134 +
Habitat Chili †

noedi