

Prothöllia

pannonica *Rottböllia spica* Veret. tubulata erecta, gluma calycina bivalv^{or}
lineari foliis planis

Habitat in Hungaria Nitaubel hort. Hafn. ad vultu quatuor Venue

Culmi sesquipedales Veretes inferne subramosi; geniculis coloratis
folia linearia, tri vel quadri polliciana. Ligabro ligula lan-
cedata membranacea. Spica pithamda. Florenti alterni-
val vilo calycino margine membranacea

~~pedunculata erecta~~

~~Scitula test. nervis. Rottböllia a basi, alio die, culmo spatio semipollicem remota at
inflorescentia. Culmi sesquipedales, tubulati, erecti, gluma calycina bivalv^{or}
lineari foliis planis. Ligabro ligula lan-
cedata membranacea. Spica pithamda. Florenti alterni-
val vilo calycino margine membranacea.~~

Rottböllia spica Veret. tubulata erecta, gluma calycina bivalv^{or}
lineari foliis planis
Habitat in Hungaria Nitaubel hort. Hafn. ad vultu quatuor Venue
Culmi sesquipedales Veretes inferne subramosi; geniculis coloratis
folia linearia, tri vel quadri polliciana. Ligabro ligula lan-
cedata membranacea. Spica pithamda. Florenti alterni-
val vilo calycino margine membranacea.

umbellatum Piper foliis cordatis subrotundis acutis venosis, spicis umbellatis L. V. p. 74. 21 Spici
^{pl. 1743. 17}
Saururus arborescens, foliis amplis cordatis non umbellatis Plum. Am. 53. t. 73.
Habitat in Domingo

^{subrotundis}

Foliis cordatis multinerviis petiolatis, spicis umbellatis
^{petiolatis} nervis villosis

Differentia
pl. multatis Foliis cordatis subrotundis multinerviis venosis, spicis umbellatis.

^{amplissima}
Folia magna maxima longius gerant, basi sine profundo, integerrima
multinerviis, nervis tredecim ^{in basi et basi super basi} ~~superioribus elevatis villosis, venosis, acuta~~
Petiolus tomentosus ^{in gnis} ~~versus petiolum~~ ^{non a basi}, alia duo alter
nae versus medietatem folii ^{supra} ~~panem~~ ^{his elevatis} omnes villosi,
venosa, acuta. Petiolus tomentosus.

incurvata R. spica tereti subulata, gluma calycina subulata adpressa
bipartita Lin. Suppl. 114. P. Prag. 124. fl. Dan.

~~Oglopsi incurvata~~ Lin.

Gramen myuros erectum minimum arundinaceum Holm. mus. 70 t. 59.

gramen colicicum maritimum, spicis articulatis Monf. hist. 3. p. 102.
p. 8. t. 2. fig. 8.

gramen colicicum, spicis articulatis erectis Scheuchz. gram. 43.

+ Habitat in Danico Anglia et Europa australi paludibus maritimis

O.
Oglopsi incurvata, spica subulata multica lori incurva, calycibus
unifloris. Lin. spic. pl. Prag. 149 07

culmi plures ascendentes a digitali rursus pedali ramis filiformi-
geniculis in fractis. Gluma angustissima. Spica axillari et
terminali digitali et ultra plerumque incurvata interdum
recta

filiformi Rothböllia spica Tereti subulata subcompressa exorta
gluma calycina bracteae orbiformi patente Wild. spica
pl. pag. 464.

gramen junceum nodosum minimum capillare Barul.
w. 11648. 117. fig. 1.

gramen Colicicum minimum, spica gracilibus & flexis
Mond. gram. 43. fig. 30.

Rothb. filiformis

Roth. Catal. bot. 1. p. 21.

Habitat in Europa australi 2

non vidi

gangetis. *Rottbolla spica filiformis*.

Nadus gangetis spica recurva *Lin. l. V. pag. 70.*

Habitat in Gallia Narbonensi: Narbona.

Culmi filiformes geniculati basi ramus ex alio inferioribus articulis
ad medium vaginis foliorum. Verti, Tolei setacea pollicana. Spica bi
pollinaria. Fere nactis alternim. Cavatus valvula lanceolata
acuta

gangetis N.

an a *Rottbolla incurva* divers.

aliata Roll. *ballia*

Habitat in Tava herb. Thauri

Culmi teretes, glabri. Folia linear-lanceolata, longa, basi unguem lato, margi-
ne glandulose serrata, seta 1-2 in singulo glandula; vagina glabra, piloso-cilica-
ta. Spica fasciculata, 2-3 pollicares, teretes. Floresuli solitarii, lanceolati,
acuti, glabri, nervi

triplicoides Protobollii.

Habitat herb. La Martini.

Sacris dimidiata. Flosculi solitarii. Folia linearia.

repens R. fucina teret. subulata. gluma calycina univalvi. indurata. Test.
fl. a. p. g.
Habitat

non rdi.

villosa Rob. ^{valvulae brev} fructu terminalibus digitatis secundis villosis Cal. compressis
valvulae ~~floribus~~
culmo simplicii

Habitat in Arabia orientali.

Culoni plures erecti pedales glabri venusti. Folia plana margine scabra
saepe raris pilis natis ciliata. Saginis compresso. Spica digitalis
purpurascens 2-3. rachis valde flexuosa striata. Calyx bilobus
valvulis compressis ciliatis altera exteriori linearis angustior patens
interior erecta nasculani latiori Styl. 1. Stigmata 2.

Thomoa Nar Bot spica pubulata recta, foliis pilosis

Thomoa² Nardus spica filiformi recta utrinque incurvata Lin.

Suppl. p. 105. S. V. pag. 102

Habitat in India orientali

Calam^{us} esposito^{us} longitudine ut dicitur filiformes simplicis^{is} fini erecti vaginis
tecti. Foliis ~~pubulata~~^{spicato} unguiculata vel parum ultra forata et pilis
varionibus adpersa vaginis forata compressa spica terminali pollicans
vel parum ultra brachis plana flexuosa alternatim convexa glorio
curvitate prozula supli

Prothollia forte

anastata A. spica tereti filiformi, calo glumæ calycinis anastati

Nodus anastatus calycibus anastatis Lea l. V
gramen exile arundinaceum minimum, acumine reflexo Boiss
mus. 2. p. 74. t. 57. Scheuchz. gram. 41.

Gramen punicum nodosum minimum capillare Barr. ii. 117. Fey.

Habitat Promo.

Culmi plures pyramidei simplices teretes filiformes glabri vaginis foliorum
terti. Sola fetida bipollicana. spica tereti filiformi 3-4 pollic.
angustis ^{canis} tubulato attenuata articulata: articulat. unguiculantibus flor
lespi ad basin singuli articuli valvula ^{altum} anastata

Prothollea

Languinea Rothb. panicula, spicis anfractis alternis simplicibus pedunculatis, florum bract.
vea catenuli ciliata Retz obs. 3. p. 254
Habitata China

non vidi

municata Kottb specis Versicoloris plumbis longe pedunculatis, calycibus ciliatis - aculeatis

neridni bifidus Retz off. 3. p. 247

Oxylonis municata, specis muticis plumbis longe pedunculatis, calycibus

ciliatis - aculeatis Retz off. 2. p. 277

Habitat in India orientali

non vid.

Covis Rottb. pedunculis longissimis, spica florulis binatis lateralibus, calycibus
ovatis impunctatis lobibus biter. obj. 3. p. 11.

Habitat in Tranquebaria

gramen pallide viride vixit vagina covis glabra. Spica laterales et
terminales subulata & alvula longissima lineari obtusa. floruli
geminati alter

Spencei R. spica verticibus solitariis pro glumis impunctatis, foliis est
aggregatis internodiis basi pilosis. culmo angustis.

Habitat in India orientali.

Culmi glabri articulati. articulis bipollicaribus compressis angustis
subcompressis folia ad genicula aggregata basi exteriore glabra
interiora basi villosa. spica palmari. valvula glabra lanceo-
lata obtusa. totum gramen purpurascens.

1-2. hirsuta Rottböllia hirsuta spica subulata hirsuta, flosculis hermaphroditis pa-
teritibus, sterilibus pedicellatis adpressis

Triticum agilopoides Torr. Desf. pag. 26. no 94.

Culmus pedalis et ultra, anatus, alternatim et cautus, Rami
non semper interdum plures ex uno geniculo.

Folia involuta, no. di. uspula, bipollicaria, apice flavescentia,
ultimum spathaceum. Vagina foliis latior, subfulcata, fauce
pubata.

Spica terminalis, solitaria, subulata 3-4 pollicaris. Rachis flexuo-
sa, articulata, latere unico convexa, altero concava secundum
flosculos, hirsutia sericea mollis tota obfusa, excepto latere cano;
dentibus bifloris, altero sessilibus, patens, alter pedicellatus adpressus q-
uatuor ad singulum dentem, intermediis sum pedicellatus est

Involucris

Gleba bivalves, ovata. biflora. Valvula inaequalis, exterior plana
+ pilis longis ciliatis ovata, acuminata; acumine bifido, laciniis inaequalibus. Interior
convexa, canalibus dorso et apice pilosa, acuta interna.

Perolla altera mascula, altera hermaphrodita. Valvula lanceo-
lata hyalina

26
30 36

Anthera lineares

Signata penicilliiformia

+ Flos pedicellatus sterilis; valvula lanceolata, inaequaliter ciliata, integra.

Ad Rottbölliam gramen pulcherrimum amandan et racemum articulatam
et flores ^{ante} anthesin in castrata Rachidis reconditos. Gluma calycina in Rott
bol. dimidiata stam. bivalvis, biflora est aque ac in hispida. Flos sterilis in
reliquis Rottböl fertilis est parum super alterum, in hispida vero pedicello
elevatur. Ceterum species omnino idem cum reliquis Rottb.

Cochinchinae p^o ^{Steudera} Loureiro fl. Cochinch. pag. 51.

Habitat Cochinchinae.

Culmus spicati, rectus, teres, solidus, articulatus: rami pauci obliqui.

Folia lanceolata-subulata, caninata, aperta. Spica subulata, simpliciter
solitaria axillaris. glomeruli fragili clausi intra spica dentes exsertati.

Culmus perenni.

Species Mart. Collo.

non vidi.

^{atenuat}
exaltata R. spica tereti-filiiformi undique flosculosa, glumis ovatis obtu-
fis, vaginis punctato-hirsutis Ben. Suppl. p. 114. & L. V

Habitat in India

Gramen altum culmo solido fano. vagina striata punctis elevatis
setis terminatis. Spica solitaria laterali et terminales palmatis et
ultra Veni ~~et~~ apice attenuat. ^{crassitie pennae columbae} folia glauca viridia

atenuat

latifolia R. specis Veretibus subulatis foliis lato lanceolatis margine
serrulato pectatis

an *Aphonum* muticum *Forsteri*

Habitat in insulis maris pacifici Tabuini

Culmi crassitie penne cygneae glabri vagueti. Silli sequipolli

cum latib. pedalis multiseria margine siobemima glabra

Specis laterales et terminales solitarii crassitie penne
anpenne valvula calycina lanceolata

punctata Roth. fruis teretibus pedunculis fasciculatis subsessilibus, flosculis soli-
tariis alternis, calycibus punctatis Retz. obs. 3. p. 24
~~in aequo exaltata dicitur~~

Habitat in India orientali

^{in eadem videri}
Culmi alti teretes tripedales et ultra teretes folia glabra longa
plana vagina glabra teretibus. Spica laterales pedun-
culata 2. 3. Digitales tenuiores quam in e. h. est altata valvula
calycino oblonga obtusa.

confertur cum corymbis eadem enim ipse videtur.

Corymbosa R. spicis aggregatis lateralibus filiformibus; floribus bipariis
parentibus, foliis basi ciliatis Len Suppl. p. 114. LV. p. 124.

Aquilops exaltata. spicis filiformibus muticis corymbosis her
mont. pag. 575*

Habitat in Malabaria ad foras agrorum

Calmi oxyali erecti simpliciter, glabri striati, tenaces, geniculati: ramosi
foliis 2-3. folia angusta pedalis. Spicis ^{superioribus} lateralibus sive 6 aggregato
remoto; sterilibus purpureo subrotatis digitalis. vaginata: valvula extensa
oblonga obtusa Len

Asperulata. A. pruri Vahl. - subulatis pubescentibus Ca' Mark. Pers
A. 2. p. 105. albescentibus

non est

~~rectinatus Eleusine spica lanceolatis subperinatatis alternis in micrum
digestis, spiculis infloris calyce mucronato brevioribus La Mark~~

~~T. Enc. pag. 203.~~

~~Cynopini perinatatus~~

~~Habitat in Ind. orientali~~

~~affinis Rothbollii no 27 Retz off fasc 3.~~

Eleusine amanda La Mark Cynof. hinc, Duru. Egyptus India
Craconus

triplicoides Rothb. fructu subcompresso secundario glomeratis adpressis rufis
tonis, foliis acuto convolutis La Mart. T. Enc. pag 205 Tab
48. fig. 1-6.
Habitat ad Serram Lemam.
an Rothb. Compressa her

non ad.

Retzi
compressa Rothb. fructus compressi pluribus fasciculatis pedunculatis, calycibus
albis Retz. off. 3. p. 24. (compressa Retz.) non
Habitat in China

non ind.

compressa R. spica compressa subulata, gluma calycina canaliculata plana
indurata Lea-Suppl. p. 114. N. pag. 124.
Habitat in India

non vidi.

Coelohachis A pua tereti unilaterali: flosculis geminis altero pedicello
calyce ~~trilobato~~ Torst. fl. austr. p. 4.

non vidi

dimidiata R. spica dimidiata compressa lineari: latere exteriori aggrega-
to flosculis, interiori lavi nudo her. suppl. p. 114. S. V. p. 124

Panicum dimidiatum
gramen bermudense fumentaceum, foliis brevibus obtusis, spica
crassiuscula compressa antrosum geminis vespis granifera Platin

244. p. 6

Panicum dimidiatum spica dimidiata secunda, rachis lineari membrana
eius extrosum flosculis aggregatis her. spec. pl. pag. 144

Habitat in India

inter Panicis Collocari

Dimidiata Rottböllia spica dimidiata compressa lineari. latera exteriori aggregato flo
culoso: interiori lavi nudo Lin. S. V. p. 124.

Habitat in Montserrat de Bryan.

Culmi longe repentes, adgenicula radice anter, glabri. Rami ad singulum geni
culum, solitarii, ad apicem plures, erecti, digitales, binodes, glabri,
compressi inflexi, striati.

Folia opposita, culmi duo, inferiora plura, patentissima, linearia, bipolli
ciana, obtusa, vaginæ folio dimidio breviora, compressi, striati,
~~ne striati~~
(glabri) ad primum aditulum d. f.ocha, vaginantes.

Spica terminali, plerumque solitaria, interdum gemina, pedunculata,
Culmo dimidio altior. Pedunculus bipollicaris superne
in rachide dilatatur, Rachis flexuosa, compressa.

Flores alterni, duplici serie, flori alter ad marginem, alter interior
in foveola secunda lateri, ovati, acuti.

Calycis triflori, Trivalvis. vulvula ad exteriori brevissima, duo aequa
ter. Flor alter ad apiculus alter hermaphroditus.