

Fragaria

1. lucida R. foliis ovatis ~~subintegerrimis~~ nelloso
2. rotula R. foliis ellipticis, ~~subintegerrimis~~ ciliatis pubescentibus
3. glabra R. foliis lanceolatis glabris
4. hispida R. foliis lanceolatis hispatis
5. pallens R. foliis lanceolatis tomentoso-pubescentiis
6. Virginiana R. foliis ovatis glabris pedunculis axillaris subtenuis, floribus trigynis
7. polyandra R. foliis lanceolato-ellipticis rademis axillaribus

my Nigella Royana

Habitat herb. in Manihis pubescente, centia busi advenata
folia ^{tenui} ^{rotato} oblongas, glaberrima, rami villosi superne. Pedunculi axillares, folita
ri, uniflori, longitudinaliter foliosum

an glabra ha?

4 Herpetia Royena foliis lanceolatis hispatis Lin. S. V. p. 410

Saphylocladum africanum, folio lanuginoso rosmarinii Cathore Boerh. Legde

^{2.} p. 235.

Arbutus foliis lanceolatis integerrimis hispatis Hort. Cliff. 163.

Habitat in C. b. freit.

Ramuli tomentosi, canes center, folia lanceolata, basi angustata. Pedunculi

li longitudine folii herb. La Myrt.

Virginitatem hirsutae forte ib. sed ramuli purpureo castab. glaberrime

Pedunculi folio duplo breviores. Folii subtr. villosa.

non ad

2 villoso Royena foliis ellipticis juncoribus villopi ciliatis ramos villoso
Royena villoso foliis cordatis oblongi pubescentiis. Lin. L.V.

p. 410*

Royena fabra Buxan prodrom. foliis ovato lanceolatis fabris
Habitat in cap. bone peit.

Imulus ~~Ar.~~ lucida differt ramis, petiolis brevissimis foliis juncoribus villopi. foliis ell oblongi, in inferioribus interdum basi subcordatis.

~~Tolka fabronacea inter se prima pollicaria et ultra. Pedunculi
tempore queculantur axillares foliis uniflori tomentosi. bractea bina
ovata acuta tomentosa longitudine fere calycis opposita
ad basim calycis. Flores nudantes longitudine petioli, tomentosi.~~

Dubito num mea vel villoso vel lucida

an vere diversa a lucida praesumen enim per hoc nomine ex hortis Ratae
vomit non differt

Lueda Royena foliis ^{ovatis} scabriusculis
~~oblongis ciliatis~~ pubescentibus villoso ~~ciliatis~~
Staphylo-dendron agri-anum semper-virens, foliis splendentibus Com. hort.
1. p. 187 t. 96
Pistacia agneana Pluti. alm. 290 t. 63, fig. 4 t. 317 fig. 1.
Staphylo-dendron agri-anum, foliis singulari lucido Herm. parad.
232 t. 232
Royena lueda foliis ovatis scabriusculis Linn. S. V. p. 410
Habitat in Cap. b. p. 5
Rami teretes pubescentes.

ellipticis pubescentibus villoso ciliatis
rami superne villoso

3) Glabra Royena foliis lanceolatis glabris Lin. S. V. p. 410
Vitis idaea otheopica, ^{hirsutis} ^{myriodonis} foliis, ^{albis} florebus dependentibus Conrad. Hort. L. p. 125.
t. 65.
Vitis idaea otheopica, myriodis foliis, florebus dependentibus Plat. alm. 341.
t. 321. fig. 4.
Habitat in Cap. bona specie
Rami teretes exsiccati siccione ramuli villoso. Folia brevis sine petio
laeta approtensa, utrinque acuta avenia, pubescens, semiquaternaria
utrinque nuda vel planum majora. Pedunculi ex aliis foliorum ramulorum omnes basi
longitudine foliorum, uniflori. Flores mutantes

5 pallens Royena foliis lanceolatis tomentosis pubescens.

Hab. stat. in Capitono pte T

Rami terete virgate glabri purpureoantes apice tomentosi

Ramuli alterni sparsi. Solia grasa & basi attenuata suspiciles
feminae unguicularia, mollescens acutiuscula. Flores pedunculat.
attillares solitarii nutantes. Calyx quinquefidus cavinus ovato
obtuso corolla extus crenulata

6 trigyna Royena folis ovatis glabris pedunculis axillaris sub vernis floribus

Trigynis

Habitat in Insula Borbonia & Comoren Thoin

Rami teretes glabri cinereo-punctati. Sola petiolata obata in
terram conadre pollicina vel panum ultra, Petoli breves
ferruginei glabri pedunculi axillares petiolo panum concreto
plenumque verni. Cappula globosa 3 locularis polyperma

est Royena sive Comorense a summi ex Erythroxylon

Polygama polyandra Royena foliis lanceolato elipticis racemis axillaribus, floribus
diosciae
Royena polyandra foliis ovatis subtus tomentosis, staminibus plurimis
Lin Suppl. pag 240. I. V. p. 410

Habitat in Capite bono spicis

Rami verentes superne sub pubefientes planta dioica & folia ovata
& subtus villosa subacuta, pedunculis petiolato triplo concordis, foliis
nec tomentosis folia lanceola sequipollitaria coriacea, venoso reticulata
integerrima obtusifolia brevisime petiolata racemi astil
laxis breviter vix lemuunguiulari tomentosi. Flores conferti
brevisime petiolata pedunculati distantes. Calyx corolla
duplo boenior estus villosa et tomentosa. Corolla villosa pro
festim superne. Germen hispeditissimum album. Styli tres

Polygama polyandra Lin