

Rubus

Rantana similis
Specimen Rubo rosp folio vis in herb. Guss. Sic.

Coryli folius Rubri

Rubus montanus repens; sarmentis Corymbosis et rotundis, spinulis tenuissimis exasperatis, amplo coryli folio, flore albo, fructu crassore nigro Michel.

Habitat in 4 talia herb. Mus.

Rami teretiusculi, uti petioli, costa foliorum subtus et pedunculi adpressi aculeis filiculatis, saepe semilinguiculatis, subrecurvatis, interspersis setis

^{ab} # supra Corymbosis hupedi, uti calycis. Folia ternata vel quaternata digitata, petiolo ^{lateralis myriophylli} simplex
saepe trilobis: foliola cordata, acuminata, 4-5 pollicaria, inaequaliter serrata

serraturis mucronatis, supra glabra, subtus villosa. Stipula subulata.
Flores paniculati: foliola linear-lanceolata, ad basin pedicellorum, semi pollicaria. Calycis lacini ovata, valde acuminata; acumine unguiculari, extorsum saepe dilatato.

conyli folium R. foliis subquinatis subtus pilosis: Cataractibus sessilibus, aculeis re-
tiusculis, Calycibus fructus inflexis Smith. fl. Angl. 2. pag. 544.

Rubus major fructu nigro Schmedel. Ic. Tab. 2.

Habitat in Saxibus anglis

Caulis flagelliformis, longos semi, fragilioris, arcuato-patens, rubri, ter-
retiusculi, aculeis retiusculi. Folia quinata vel ternata, ^{foliola} inaequaliter.
serrata distincta, supra glabrescens, subtus nequaquam incana, info-
lio ternato extus lobata. Sinuola setaceo vel laccedato. Petioli pilosi
aculeati. Panicula multiflora. Calyx villosus, patens, maturiscente frui-
tu inflexus. Fructus fusco sanguineus, roseo coctus Smith

Rubus

Habitat in Cap. b. frei Herb. Mus.

Rami angulati, pubescentes. Aculei compressi, sparsi, subcurvi, in petiolis magis recurvati. Folia pennata, 3-4 paja: foliola petiolata, ovata, bipollicaria, extus brevior, attenuata, incisa, inaequaliter serrata, venosa, venosa, supra villosula, subtus glabrata. Petioli villosi. Pediculi axillares, solitarii, uniflori breves. Calycis lacini lanceolata, valde attenuata, corolla longior, villosa.

Rubus

Habitat in Bonana Com. mes. herb. Mes.

Primi, petioli et folia subtus incani, aculeati uti cortex foliorum subtus.
Folia terna et simplicia: foliola in ternatis oblonga, simplicia subordi-
ata, acuta vel obtusa, 2-3 pollicaria, inaequaliter serrata, supra villosa,
splendens, uti nervi subtus. Stipula petiolo. Flores non vidi.

Andantius Rubus

Habitat herb. musf.
Rami teretes, venis sine villosi. Tolia quinata: foliola petiolata, oblonga,
pollicaria, lateralibus minoribus, remote grosse serrata, basi integerrima, glabra,
venosa, acuta. Petioli, uti pedunculi aculeati. Racemi axillares, subcompo-
siti: pedicelli remoti, filiformes, aculeati, semi pollicares

Rubus.

Rubus spinosus, sarmenti ad summum dense molli & brevi tomento obductis,
glor. rubro, fructu parvo nigro. Michx.

Habitat in Italia herb. mix.

Rami super ne teretes, uti petioli, foliola subtus, pedunculati calycibus vellosis
natis. Aculei non, sparsi in petiolo, raro ^{sub} in foliolo, ^{sub} recurvi.
Folia quinata vel ternata: foliola 2-3 pollicaria, oblonga vel oblongo-
subrotunda, acuminata, serrata, serraturis mucronatis, supra gla-
bra, remote ciliolata, subtus nervosa, subvillosa, uti petioli.
communis uti foliola quinata glaber. Racemus ter minalis compositus
offensu fruticoso

parviflorus Rubus foliis ternatis: foliolo subuneatis subtus incanis, ramis &
retibus aculeatis

Rubus creticus triphyllus flora parvo Tournef. Cor. 43.

Habitat in Creta herb. Gusf. 7

Rami superne incani; aculei sparsi, recti, basi canescentes. Solia petiolata
foliola lateralia triplia, terminalia petiolatum, pollicare, lateralia parum
minora, subpleiata, inaequaliter serrata, supra parum lineata. Petioli fili-
formes, pollicares vel ultra, canescentes, aculei recurvi. Stipulae seta-
osae. Racemi terminales, simpliciter. Pedunculi aculeati. Siliola
calypis ovata, acuta, incana.

vulpinus Rubus foliis quinatis ternatisque villosi, caule angulato fere aculeato.

Habitat in Canada herb. Qu. 3

Rami glabri, angulati, pubescentes. Solia petiolata: foliola bi-3 pollicaria, petiolata, ovata, intermedium subcordatum, attenuata, inaequaliter serrata, lateralia internatis extus bifida, subtus villosa cum costis aculeata. Petioli univesales superne, uti pariter villosi-subnervi, aculeati: aculei recurvi.

Rubus

Habitat in Tava Commerf. herb 4. p. 5

Folia 5-6 pollicaria, basi cordata, simplicia, quinqueloba, villosa, supra glabra, rugosa, nervi subtus aculeati, inaequaliter serrata. Petioli; ut caulis aculeis glabri, recurvis, aequae ac rami, pedunculi calycisque hirsutissimi. Pedunculis axillaribus, ter dichotomi, terminalibus racemosis: pedunculi parvulis bis divisi, pedicellis unifloris, divaricati. Bractea lineares, pernatifidae: Calicis subulatis. Flores majores. Calycis lacinae ovatae, acutae, intus incanae. Petala alba

pyrifolius Rubus

Habitat in Sava Commerf. herb. Fus. 5

Rami teretes, fusci, subullosi. aculei parvi, recurvi. Folia petiolata, al-
terna, bipartita, pollicaria, oblonga, remota, acuminata, utrinque glabra, ex-
cepto costa subtus et junctura, serrata, basin versus integerrima. Petioli villosi,
subnerviis. Racemus terminalis, erectus, compositus, elongatus. Pedun-
culi communis aculeatus: parvales subnerviis, remoti, inanis, apice
~~saepe trifida~~ ultimi duobus. Flores pedicellati. Calycis foliola
orata, attenuata, inanis, apice saepe trifida: laciniis setaceis. Dru-
sus purpureus.

apicifolius R. foliis quinatis ternatis sub intermediis subpinnatis
in his subtus villosis caule petioloque aculeatis
Habitat D D & Dr Schumacher

an varietas fruticosi?

Rami angulati glabri superne subpubescentes aculeis
frequentibus validis compressis. foliola omnia
petiolata in his subpinnatifida intermediis
quinatis pinnata profunde in his serrata serraturis
acuminatis supra lanata subtus nervosa villosa
costa subtus aculeata. Racemus terminalis subro-
mosus lacina calycis integra vel trifida Anagy-
riacho sulca attenuata

Lobri folius Rubus tamen tofus, foliis pennatis: foliolo oblongis

Habitat in Andica orientali herb. Aug

rami incani, teretes. Aculei rari, sparsi. ^{vel raris} Solia petiolata, quinato-pinnata,
foliolo petiolata, opposita, nulli cana, ~~aculei~~ ut in nepa villosa, subtus
incana mollia, subin aequaliter argute serrata, acuta. Petioli incani,
palmari, subaculeati. Stylis subulata. Racemi axillares et terminales,
breves. Calycis lacina lanceolata, incana.

rospo foliis Rubris

Habitat herb. Insul.

vellosi. Aculei rari sparsi in caule et petiolis. Soliola fimbriata, subullo
sa, attenuata, inferiora quinata vel 7nata pennata, superiora ternata.
Stipulae setaceae. Peduncululi axillares et terminalis uniflori

elongatus Rubri

Habitat in Tara Commerf. herb. Gusf.

Rami teretes, canescentes, aculeis parvis adpressis. Folia cordato-oblonga, acuminata, subtus incano-tomentosa, inaequaliter denticulata, supra obtuse venosa, subtus magis. Racemi axillares, simplices, terminales compositi elongati. Flores frequentes, saepe 2-3 ex eodem puncto. Calycis foliola ovata, uti pedunculi inermes, incani. Flores albi. Fructus ruber Commerf. Bractea semiunguicularis, extrosum incana.

Trinatis. Rubus

Habitat in America boreali herb. Rub.

Rami teretes, glabri; aculei frequentissimi purpurei, alii majores recurvi,
compressi, alii aciculari recti. Folia petiolata, quinata in ramulis, foliola
lespidea vix pollicaria lateralibus minoribus, oblonga, serrata, basi versus integerrima
acuta, utraque glabra, supra nitidiuscula, obsolete leucata. Petioli supra sulcati
ubi pedunculi aculeis acerosis adpressi. Sepala linear-lanceolata. Pedunculis
etiam brevisimis lateralibus, solitariis, potentissimis, pollicariis, apice
forescentes. Calyx cernens.

Stingopus rubis

Habitata Carolina herb. rub.

Rami teretes, et pedunculi stipitoli adpressi aculeis fetidis plerumque, interdum paucioribus, saepe quoque costa foliorum pubes. Folia petiolata, quatuor
pinnata vel ternata - foliola ovata, attenuata, terminale bipollicinare, cetera
lea parum minor, cordata, inaequaliter serrata, supra glabra, subtus mi-
no tomentosa. Stipulae pubulatae. Pedunculi axillares, triflori, terminales
racemosi quinqueflori, viscosi. Calycis foliola lanceolata

obovatis Rubus

Habitat in Carolina herb. Rub.

Caules procumbentes, uti petioli adulescens basi aculeatis, teretes, glabri. Ramis
cineris. ^{folia} folia pollucina - stipulae lineari-lanceolatae. Pedunculi 3-4 flori

aculis Rubus

Habitat in Sphagnosis ad fretum Hudsoni herb. Rich.
Caulis brevissimus, inaequalis, herbaceus, glaber. Folia petiolata, ternata, folio-
la sessilia, obovata, vix semipollicaria, nervosa, utrinque glabra, subtus pallidiora.
Petiol. semipollicares. Stipula ovata, catagemma. Flores var. masculis, solitarii.
bracteiforme pedunculatus, pubescens. Calycis foliola lanceolata

Rubus

Habitat in insula Bourbonica Comerson herb. Thoreni +

Rami teretes, tomentosi, uti petioli et pedicelli ad pres. aculeis recurvis, parvis
folia 5 natis vel 7natis, ^{pinnate} suprema floralia simplicia: foliola petiolata
opposita, sesqui pollicaria, ovato-oblonga, venoso subrugosa, villosa, subtus
canescentia, terminalia saepe involta, acuta, serratis mucronatis. Stipulae
subulatae, unguiculatae. Racemi axillares et terminales, folios breves:
pedicelli interdum biflori. Calycis foliola lanceolata, mucronata.

Grandens Rubri foliis Vernatis glabris extropium sublobatis, caule inermi
Habitat in Canada hort. Parf. herb. Fusj.

Rami purpurascens, glabri, inermes: ramuli herbacei, vellofoli. Folia
petiolata: foliola subsessile, ovata, grosse serrata, pollicaria et ultra, atten-
nuata, acuta; intermedium utraque acutum, laterales extus sublobata
vel trifida. Stipula oblonga, integerrima, unguiculari. Calycis foliola
canicolata, attenuata

Rubus?

Habitat in Tara Commerf. herb. 4 w. 5

Rami subtetragoni, scabri & squamulis numerosis sponis subulatis minutis, inermes. Folia petiolata, alterna, elliptica lancolata, sive bipollicaria, acuminata, basi rotundata, serrulata, utraque glabra excepto costa subtus, transverse nervata remote nervosa, subtus pubescentia serosa. Pedunculi axillares gemini e ramulo brevi, bipollicares, scabri, triflori. Bractea oblonga, concava ad basin pedicellorum longitudine quadriflorum. Calyx setis adpressis hirsutus. Petala saepe emarginata. Calycis segmenta 3^o subrotunda. Stamina circa 20, basi petalorum inserta. Styli 5. Gynaeum

Arbutus

Habitat in Gava Comnes. Herb. Guss. 7

glaber. Ramis purpurascens, teretibus, adpressis aculeis raris. Folia petiolo
la, inferiora ⁷ nato pennata, superiora ⁵ nato opposita, suprema simplex. Folio
petiolata, opposita, ovata, bi-pollucaria, glabra, attenuata, acuta, oblique nervata,
subtus tenuis pime costa et pallidiora, serrata, serraturis acuminatis, interdum
subtus in costa aculeis recurvatis. ⁴ Stipula subulata. Panicula termi
nalis, flexuosa, inermis. Pedunculi parthales patentissimi, dichotomi. Brac
tea linearis, apice stipiteo trifido. Calycis lacinae lanceolatae, alte nudo
extus inermis.

axilli petiolorum villosi

vulpinus R.

Habitat ad A. Desfont

Folia ternata vel quinato digitata an R. villosa spec. d. d. d.
fus.

gland ulosus Rubus

Bellad. app. ad fl. Ped: noy. 24

Rubus hybridus. folus quinatis ternatis simplicibusque, caulis spinis rubro
velto permixtis, fructibus cymosis hirsutis Vill. fl. Delph. 2. p. 599?

Habitat in Sabaudia 5

Caule non spinoso rubro villoso. v. rufo. Calyces pilosi v. rufi. Petala utraque
v. rufi. foliola oblonga sessilia. pedicelli rari bylloni

non vidi

rofo folius R. foliis quernato pennatis Vernatis, utraque vradibus ~~set~~
velloso, caule petiolisque aculeatis, flonibus solitarii Smith
plant. ined. 3. pag 60. tab 60.

Habitat in Insula mauritii ;

Caulis fruticosus romopus Rami pau villosi su sordida ca
nescentis uti petroli adpressi aculeis flavescientibus
recurvis. folia petiolo petroli ^{villosi} pubescentis. foliula
ovata attenuata villosa rorombu adpressa rai inoquali
ter argute serrata acuta terminale sesquipollia
ve lateralia sespilia dimidia minoru. Stipulo
setaceo pedunculati axillares 1-2 unguiculari
villosi uti calycis extus. ~~foliata~~ ^{capitulo} calycis lonicolata
attenuata intus incana

Plantam hunc similes e cap. 6. spec in herb. Mus. vici

idous R. foliis quinato-pinnatis Vernaticis, caule aculeato, petioli canali-
culatis Lin. S. V. fl. Dan. 788.

Rubus idous spinosus Bauh. pin. 479.

β Rubus idous fructu albo Bauh. pin. 479.

V. Rubus idous Lewis Bauh. pin. 479.

Habitat in Europa lapidosis &c.

Rami teretes glabri apice villosi uti juniores folia petio-
lata alterna remota. foliola ovata supra ^{ovata acuminata vel serrata} glabra ^{crenata}
subtus tomentosa, in profunda serrata interdum aequaliter
serrata inaequalibus subtus nervosa avenia. Petioli suba-
culeati. A. pulo pedice. Racemi ex apice ramulo rum-
borei simplicis folio laciniis calycis laciniolato inaequali
valde attenuato

folia ovata acuta

subtus inaequali

Aliam dedit Dr. Schumacher pedunculis pedicellisque valde acu-
latis an modo varietas vel acid catali?

canadensis R. foliis digitatis densis Vernatisque, caule inermi
Speci: pl. pag. 707 & Mel. C. U. T. 223.

Habitat in Canada.

Caule subpurpureo. Folia lanicolata utraque nuda
venisima argute serrata. Bractea lanicolata stipu-
lo linearis acuta rem.

non vidi

austriaci R. foliis quinatis ~~pinnatis~~ ternatis quo, caule petiole que
aculeatis, racemis axillaribus simplicibus, flentibus divisi
Linn. fl. austr. pag 40

Habitat

Rami seretis glabri. Folia reticulata ^{acule} ternata vel quinata.
foliola ovata oblonga aequaliter paucis serrata basi versus
integerrima serraturae acuminatis, venosa, oculo armato
villis aliquot ^{in ramis} vix pollicaria lateralibus minoribus aculeis
nervi recurvi. Racemi axillares ^{multo} foliis longiores. pedicellis
aculeis frequentibus. flores ^{me} minores quam in reliquis ^{aculeis}

Serratulæ R. folio quinatis ellipticis acuminatis ellipticis anguste
serratis utrinque villosis, caulibus petiolisque aculeatis Hort
Parr. 2. p. 210 sub nomine R. villosi

Habitat in America septentrionali &

Rami petioli et peduncululi villosi costaque aculeis glabris
siccis recurvis adpressis folia ternata vel quina
to digitata foliola omnia petiolata utrinque molliter
villosa attenuata inaequaliter serrata nervosa venosa
bipolliciana et ultra intermedia majora ovata oblon
ga lateralia elliptica in foliis ternatis extrorsum
lope lobocincta ovata supra interdum glabra stipula
subulata. Racemi terminales simpliciter bracteae lan
ceolatae lacini calycis ovatae acuminatae villosae
margine incano

— ternatis

Fructuosus R. foliis quinatis Ternatisque, caule petiolisque aculea-
tis fl. Suec: 4444 S. V.

Rubus Cam. exot. 741.

Rubus vilgans f. rubus fructu nigro Bauh. pin. 479

β Rubus vilgans major, fructu albo Raj. angl. 3. p. 467.

V. Rubus flore albo pleno. Magnol. hort. 155.

Habitat in sepibus prope montes maximis Europae

Rami, petioli, pedunculi et pedicelli adpressi aculeis glabris flavescen-
tibus vestiti. Folia ternata vel quinata suprema inter

flores, per interdum simplicia supra glabris subtus venis subvillosis
interdum utroque vnda interdum subtus vnicam foliola

ovata petiolata terminalia majora cordato ovatum lateralia
sape biloba in foliote acuminata attenuata per inaequaliter

seriata serraturis obtusis mucronatis. Racemus terminalis
pedicellis ramosis paucis calycis ovata. Stipula lanceolata

ovatis subnatis

— ramis angulatis

d folius lacini-
tis herb. Lus.
e flore albo.
hort. monsp.

hippidus L. foliis ternatis nudis, caulibus petiolisque lipidosis frigus rigidulis

Lin. Spei: pl. pag. 7064

Habitat in Canada &

Caulis teneres longi pro umbente lignosi uti petioli
adversi ^{vel magis aculeati aciculans} petiis ^{varioribus} rigidis ^{interdum} glabri. Folia petio-
lata remota. Stipula ovata: la inaequaliter serrata ^{basili}
versus integerrima, utraq; glabra: interdum ^{pubescentia} subtus ^{peti-}
una alterare in nervis la polliciana subopacis latera
lia vix petiolata. Suprema floralia sessili oblonga. flor
stipula lanceolata attenuata floes racemosi vel ^{et axil-}
lis foliorum floralium ^{latius} setos aculeati subpubescentes uniflor
floes penduli. ^{lobis} ~~foliis~~ calycis lanceolata intrinsecis
tomentosa

Rami teretes, purpurascens. Aculei rari in spaci frequentes
interjectis aliis setiformibus. Stipula petiolata, ternata: foliula gla-
bra, oblonga vel ovata, vix semipolliciana, profunde serrata, acuta
scula. Petioli, uti pedunculi aculeati hab. Desf.

calycibus nudis.

parvis foliis trifoliis ternatis subtus tomentosis, caule hirsuto petiolisque aculeis re-
curvis. Lin. Sp. pl. p. 70 74

Rubus moluccianus parvifolius Rumph. amb. 5. p. 100. t. 47. fig. 1.

Habitat in India

Caules fruticosi teretes inani. Folia subtus albo tomentosa
senesca, Petioli subtus recurvato-aculeatis. Cadyces
tomentosi in racemum digesti her.

non vid.

occidentalis R. foliis Vernis subtus tomentosi, caule aculeato, petioli
Verehio. Lin. Spei. pl. p. 7064

Rubus caule pubescente leviter aculeato, foliis Vernatis, fructu nigro
Gron. voy. 2. p. 70

Rubus foliis longioribus subtus molli lanugine obductis et incanis,
flore et fructu minoribus Swan. hist. 2. p. 109. V. 213. fig. 1.

Rubus idem fructu nigro virginianus Willd. Ellh. 327. V. 287. fig.

Coleola polluciana 319.

et ultra, sive Habitat in Canada;

tenuissimum venosum Paulo Texe lavis, aculeo recurvis nebula coerulea obducta qua
inqualiter anguste nota ab Aedo primo inventu dignoscitur. Petioli teretes, aculei
ferrata. Pedunculi recurvi. foliola ovata inciso serrata laterales fissilia. ^{supra angulata} Rarissimi
a Hill avertit 3 foliis terminali fructus nigro vel rubro.

breves. 5 lora ~~hami teretes, superne villosi. aculei proci, recurvi. foliola~~
terminales ~~rareno~~ ^{oblonga semipollicon a vel pollicon a} inter medium petiola
si. aculei ~~frequentum supra glabra~~, lineata avenia, subtus incana nervosa, ar
ter in pedunculis ~~guta serrata, basin versus integerrima, laterales altero latere~~
herb. Desfon ~~angustiora~~ Petioli breves, aculeo uno altero armati. Stipula
caeruleolata. Pedunculi axillares, solitarii, aculeo uno altero
foliis longiores, incani. Calycis lacinis ovatis, incane

Jamaicensis R. foliis ternatis subtus tomentosis, caule hirsuto petiolis foliisque
pubescentibus recurvato-aculeatis. Lin. Mart. 754. V. p. 475

Rubus foliis longioribus subtus molli lanugine obductis & nuncians
flore et fructu minoribus Sloan. h. v. 2. p. 109

B. Rubus flore albo pleno Magn: hort. 175.

Habitat in Jamaica proximeque t

foliolum intermedium ^{super} Prami Verster villosi subinciani uti petioli et peduncululi acis
parum longius petio
latum, f. interdum ^{super} Cui recurvis frequentibus adpressi. Folia petiolata ^{super}
semipolliciana ^{super} Ternata. foliola oblongo subrhombica breviter petiolata ^{super}
vel pollicis omni ^{super} supra glabra secundum nervos lineata subtus ^{super} venosa
intermedium f. semipolliciare vel parum ultra ^{super}
lateralia dupl. dimidio minor. #. Chalcibus ternatis ^{super}
pedicelli ut ad unum ramosi ^{super} calycis foliola ^{super}
versus integerrima ^{super} ovata utrinque tomentosa ^{super}
lateralia altero ^{super} stipula angusta lineari canaliculata attenuata ^{super}
latere angustiorum ^{super}
petioli breves, aculeo uno alterove armati. Stipula lanceolata. Pinn
culi axillares solitarii folio longiores, unum aculeo uno alterove
- h. v. Desf

Triphyllum R. foliis ternatis subtus tomentosis. folioli ovatis incisè dentatis,
ramis petioli pedunculisque villosi aculeatisque Thunb. fl. jap. p. 215 *
L.V. p. 475.

Habitat in Japonia 5

Caulis glaber suffruticosus aculeatus. Rami debiles flexuosi erecti
aculeati villosi. Folia petiolata: foliola obovata subangulata
dentibus magnis setiferis dentata supra glabra. Flores in ramulis
terminales subpaniculati. Calycis tomentosus hirsutus. Theob.

non vid.

copius R. foliis Vernatis subnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato ten
ti. fl. p. 442 S. V

Rubus minor Dod. pempt. 742.

Rubus repens, fructu copio Bauh. pin. 479

Habitat in Europa dumetis &c.

Rasae canescens ~~subnuda~~ ^{tenax} aculeis aciculantibus adpressi.
Folia petiolata alterna Vernata. Petiolus canescens uti cauli
aculeis aciculantibus. foliola ovata acuta inaequaliter serrata
supra lineata glabra, subtus villosa mollia in termedium
sesquipedicem vel majus lateralibus minoribus simplicibus latere
exterioribus lobis saepe acuta. stipulae lanicolatae. Racemus
terminalis brevis simplex. Pedicellis canescens adpressi. aculeis.
pauca recurvi et pili purpurascens glandulosi. ~~foliola~~
Cobinea
calycis ovata alternata utrinque incano

subtus villosis

palmatus R. foliis cordatis palmato-5lobis glabris, caule petiolisque aculeatis Thunb. fl. jap. p. 474 S. V. p. 475

in Gthys Kempt. am. ex pag. 707

Rubus microphyllus fruticosus, aculeatus, glaber, foliis simplicibus cordatis ovatis obtusis sublobatis, pedunculis solitariis unifloris Lin. suppl. p. 2634

Habitat in Japonia

Caulis erectus bi-vel tripedalis. Rami teretes purpurei flexuosi, aculeati aculeis frequentibus. Folia plura e gemma petiolata cordata, oblonga palmato tri-vel squelida utraque glabra, venosa venis villosis, patentia, pollicaria vel ultra. Lobi tres, saepe simpliciter terni in tres divisi lanceolati acuminati acute et inaequaliter serrati, intermedie longiore. Petioli capillares aculeati aculeis recurvis; flores e gemmis inter folia, pedunculati solitarii. Calyx villosus lacinis lanceolatis. Corolla maxilla alba unctus lutei sordidi Thunb.

~~*Rubus microphyllus* suppl. an idem non vidi.~~

odoratus R. foliis simplicibus palmatis, caule inermi multifloro multi
floro Hort Cliff. 1924 1. V

Rubus odoratus Corn. canad. 149. 4. 150.

Habitat in Canada &

Caules ^{maxima} tri-4 pedales rami vertes hispidi pilis glandulosis purpureis
folia petiolata basi cordata, ^{vegeta} tri-5 lobis: lobi ovati acuminati
si inaequaliter serrati subtus pilis minutis raris in
venis. Stipula lanceolata, Racemus terminalis ^{colle} pedunculatus
si saepe ramosus pilis conopsea glandulosis purpureis rufis
tus. ^{calicis} Calicis calycis ovato-acuminato ~~et~~ exilis piloso glandu-
luloso intus glabro margine albedo tomentoso

lobatis

uniciflori: foliis simplicibus cordatis incisis glabris, caule erecto aculeato
Thunb. fl. jap. pag. 217 + l. V. p. 476.

Habitat in Japonia 5

caulis glaber, purpureus, aculeis sparsis patentibus. Folia e gem-
ma plura, cordata ovata, rotundata raro acuta sublobata serrata
nervosa nervis elevatis, utrinque glabra inermia pollicaria.
Petioli glabri, recurvato aculeati, patentes longitudine foliorum.
Pedunculi capillares inermes aculeati glabri axillares solitarii
uniflori. Calyx extus glaber intus albo tomentosus

villosus R. foliis simplicibus cordatis acutis aculeatis, caule erecto petio-
licque aculeatis Thunb. fl. jap. pag. 2104. L. V. p.

Rubus conchifolius fruticosus, aculeatus, tomentosus, foliis simpli-
cibus oblongis cordatis serratis, pedunculis solitariis unifloris
Linn. suppl. p. 2634

Habitat in Japonia &

Cauli erecto tomentosus, aculeis paucis, patentibus recurvis. Folia corda-
ta ovata sublobata serrata villosa venosae nervi dorsali aculea-
ta, pollicaria. Petiolus recurvatus aculeatus. Flores axillares
solitarii pedunculati. Pedunculus tomentosus unguiculatus.

— pedunculis solitariis unifloris

conchifolius Linn. suppl. 2

non vid.

Japonicus R. foliis simplicibus cordatis oblongis acuminatis duplicato
serratis, pedunculis solitariis uni floris, caule inermi glaberrimo
Lin. Man. Suppl. p. 263. S. V. p. 476

Rubus japonicus inermis futeiculosis, foliis cordatis oblongis penna
tis Lin. Man. 245 4

Habitat in Japonia 5

non vidi

paniculatus - R. folius quinatis terminalis que oblongis subtus inia
nis ramis petiolisque nervibus floribus paniculatis

Habitat

Dedit Dr. Schumacher Fahl

Rami subangulati superne iniani foliolo petiola
ta pollicana parum acuminata supra lineata
glabrum subtus nervosa obscure venosa argute
ferrata. Hipula subulata. Panicula terminalis
pedalis patens. Bracteae lineares infida lac
ina calycis iniano ovata

elongatus Rubus foliis simplicibus cordatis acuminatis duplicato crenatis
subtus tomentosis, caule aculeato, calycibus obtusis Smith. plant
verd. 9. pag. 62. tab. 62.

Habitat in Java.

Caulis teres, pubescens, minute aculeatus. Folia petiolata ^{ovata} cordato-ob
longa, acute crenata supra laeva subtus venosa. Petioli foliorum bre
viter pubescentes inermes. Panicula terminalis elongata tomen
tosa flexuosa multiflora alterne ramosa. Pedicelli conferti vel
solitarii breves superne paululum incrassati fereis arcuati. Brac
tea oblonga concava, extus pubescentes, apicea dentata, decidua
Calyx fere squesidius extus fereus. Pet. Smith.

non red.

pyrifolius R. foliis simplicibus ovalibus acuminatis serratis basi nudis
caule aculeato paniculato, petalis minimis Smith. ii. pl. ined.
3. pag 61.

Habitat in terra

Caulis fruticosus, subflexuosus teres, leviter hirsutus, aculeis par-
vis recurvis. Folia petiolata, basi oblonga venosa venis
utroque hirsuta. Petalis breves hirsuta. Panicula termi-
nalis erecta, multiflora pubescenti. Pedunculi dupli-
pedice lili teretes. bractea oblonga, multifida pubescenti-
des. Calyx profunde 5fidus lacinus ovatis acuminatis
ex venibus apice trifidis utroque tomentosis Smith

Juncus R. foliis ternatis nudis, flagellis septantibus herbaceis P. V

ray fl. Lon. t. 134. Gaeyh. Lind. 245

Chamomilla juncalis Bauh. pin. 110.

Habitat in Europa collibus paludosis

Caulis anguste sulcato angulato villosus aculeis raris
foliola ovata venosa glabra subtus in nervis pilis minutis
virescentibus acuta ^{in nervis} acute inaequaliter serrata. Stipulae
lineares. Calycis ^{in nervis} in apice pauci uti Calycis glabri. Lami-
nis calycis ovata

pedatus R. foliis pedato quinatis incisè, pedunculis filiformibus medio
bracteatis, calycibus glabrisulis Smith. pl. ined. 3. pag 69 Tab. 69.
Habitat in America boreali

Radices fibrosae & geniculi cauleis. Caulis pro repens. Veris iner-
mus glaber. Folia erecta petiolata. Siliola breviter petiolata
obovata acute crenata, venosa utraque v. media ad venas subter-
futa externa saepe hinc obsolete lobata Petioli glabriusculi
nervei longissimi. Stipulae binae subtendae. Conicariae.

Fl. Pedunculi filitani filiformes longitudine petiolorum super-
ne pubescenti uniflori 1/3 rantes binae oppositae versus medium
pedunculi subtendae glabrae. Calycis siliola oblonga, reflexa
utraque dente uno alterove mucosa levissima pilosa nec
tomentosa. Petala obovata Smith.

antiquus R. foliis ternatis, caule inermi unifloro fl. Sw. n. ^{fl. Dan. tab.} 468. ₄₄₀₄

Rubus humilis flore purpureo Barb. Cent. 5. p. 13. v. 26.

Rubus caule unifloro, foliis ternatis Len fl. Lap. 207. v. 5. p. 2.

Habitat in Europa septentrionali, Sibiria, Canada &

Caulis simplex adscendens palmaris vel parum ultra selesor-
mi oculo armato vix pilosus. Folia petiolata 3-4 in caule
ternata foliola ovata acuta equaliter fere serrata pinnu-
tis venoso subtus pilis oculo armato pilis raris
in nervis pollicari lateralibus fissis. ^{calicis} foliola calycis
lanicolata attenuata stipula oblonga

stellatus R. foliis simplicibus lobatis caule inermi erecto unifloro
laciniis calycinis lanceolatis acutis Smith. v. pl. ined. p. 3.
pag 64.

Habitat in America boreali

Caulis simplex erectus herbaceus foliosus teres inermis pubes-
cens? folia 3-4 in caule alterna petiolata patentia
basi cordata, triloba acuta inaequaliter serrata rugosa, supra
nuda, subtus pallidiora venis pilosis. Petioli filiformes pilosi.
caulem plerumque superantes. Sepala bina ovata acuta
membranacea. Pedunculus terminatus brevis solitarius
flos ruber ratione planta magnus. Calyx basi tuberculatus
multinervosus pubescens laciniis septem vel 8. Longispermis
lineari-

— lineari — lanceolatis

Chamomorus R. foliis simplicibus lobatis, caule inermi unifloro
Lin. S. V. p. 4764 fl. Dan. tab. 1. fl. Suec. 4494

Chamomorus foliis nubes Bauh. pin. 400.

Morus norvegica Till. absciss. 47. T. 150

Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus Lin.
fl. Lapp. 200. T. 9. fig. 1.

Habitat in Europa boreali in paludibus uliginosis, & rupibus

24
Caulis simplex erectus ut Methamorus ^{substratus} ~~substratus~~ ^{ovulo}
armato leviter pubescens. ^{lesquifolletis are} folia ³ ~~in~~ ^{caule}
petiolata remota tri-^{lobata} ~~foliolata~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ
argute serrata. Stipula oblonga. Calycis ⁵ ~~foliola~~ ⁵
ovato-lanceolata ~~allopipula~~

Trifidus R. foliis simplicibus inciso-trifidis glabris, caule inermi Thuab fl. pag.
pag. 217 & S.V. pag. 426.

Habitat in Japonia

Caulis herbaceus flexuosus erectus. Vires subimpleta, purpureus, glaber
Folia petiolata, cordata, subrotunda, utraque glabra, fere palmata
lobi incisivi inaequaliter serrati. Flores e gemma cum folio pedunculati
lobi solitarii, pedunculo simplici, varice bifido. Petioli et pedunculi
vellosi. Calyx albo tomentosus per Thuab

Sanctus R. foliis simplicibus ter natis que subhis tomentosis, caule petio-
lusque aculeis recurvis Schrab. Dei: 1. Tab. 11

Rubus creticus triphyllus, flore nardo Tournef. corol. 43.

Habitat in Creta palästina 5 herb Tournef.

Caules angulati, ⁱⁿ juniori superne magis tomentosi, aculei recur-
vi reflexi. Folia superna et inferna simplicia
foliola lateralia septem ovata impar rhombeum duplo
fere major omnia crenata: crenis apicem versus duplicatis
basi simplicibus acutis subtus ~~ere~~ alba tomentosa supra
viresca pilosa. Petioli angulati vel canaliculati. ^{Stipuli}
lobatae. Racemi terminales et axillares. Pediculi
angulati aculeati. Calyces acuminati pediculi

R.

Habitat ad fretum magellanicum herb. Gusf.
sub nomine an. Dalibanda Lin.
differe videtur a R. geoides. Repens. Folia simplicia et ternata
foliolum ^{sterognonale} ^{ubi} simplicia cordate oblancea, venosa pectus puberula
lata, utraque glabra, pollicaria vel minor, lateraliter triple
minora, rotundata, inaequaliter serrata. Flores fere sessiles in radice
pedunculo tomentoso, albi.

geodes R. foliis simplicibus ternatisque obtusis serratis
natis, foliolo impari maximo Smith pl. ii. med. t. tab 14.

Habitat ad fretum magellanicum:

repens Planta digitali decumbens. Folia petiolata, conferta, simplicia
vel ternata cordata subrotunda inaequaliter serrata venis
venis subtus pilis minutis raris, anguiculata latera
ca minima subrotunda. Petiolus folio longior pilis minu
tis raris prope dilatatus ferrugineus. Pediculi axillares
et brevior.

Alca: in herb. Just. foliis ternatis et simplicibus

repens

~~foliis ternatis, uti folia simplicia cordata oblonga, venosa
subtus subreticulata, utrinque glabra, pollicaria vel minora, late
ralia triplo minoribus, rotundata inaequaliter serrata. Flores sessile
in radice, pedun~~

— cordato subrotundo

Salibarda R. foliis simplicibus cordatis indivisi evenatis, scapo apophyllo
uni-floro Lin. Spec. pl. pag. 700. x

Salibarda Spec. pl. ed. 1. p. 491.

Habitat in Canada.

Radix repens. Stolones repentes herbacei. Folia vixla, obfusa venosa
pulis raris adpressa. petioli pulsi longitudine foliorum. Corolla
alba. Semina sive ovata nuda, Lin. habitus Rubi

non vid.

herbarii R. Solus Vernatus ovatis glabris ramis teretibus petioloque
pedunculis que hispida ^{aculeatis} aculeatis calycibusque hispida glandulosa

Habitat Dedit de Schumacher 7. omnia glandulosa
Rami petioli pedunculi pedicellique feti concisissimi

Folia remotis aculeis que recurvis adpressi. Soliola sessilia bif
lima tripolliciani serrata serraturis pinnatis aculeis utri
que glabra costa subtus aculeata. ^{tripulo pubescente} Racemi axilla
res et terminales pedunculati ^{cellis} pollicares 1-2-3 flori
bractea paniculata lacinis bincoloris attenuata
extus fetu nigri hispida intus incani

an varietas hispida. calycis vero non longe ut in illa
et rami simul aculeato