

Rubecchia

1. laciniata R. foliis compositis laciniatis
2. triloba R. foliis pinnatis: inferioribus trilobis, superioribus indivisi
3. digitata R. foliis in senibus compositis, caulinis quinatis ternatisque: summis simplicibus
4. hirta R. foliis pinnatis ovatis serratis hirtis, foliolis calycinis linearibus receptaculo conico, paleis lanceolatis
5. purpurea R. foliis lanceolato-ovatis dentatis glabris nervosis, radiis petalibus fideo pendantibus
7. amplexicaulis
8. angustifolia R. foliis oppositis linearibus integerrimis
- * 6. fulgida R. foliis oblongis lanceolatis triplicinerviis denticulatis hispidis foliolis calycinis oblongis, receptaculo hemisphaerico

medea Rudbeckia foliis ovatis oppositis serratis, ^{radi} corollis trifidis Spreng. Cat

H. Hall. pag. 80

Habitat in America boreali &

amplexicaulis Rudertia foliis ^{alternis} cordato lanceolatis amplexicaulis alternis
lobis.

Habitat.

Planta primo anno florens, tota glabra

Caulis ^{herbaceus} erectus tripedali, raris hinc et inde ramosis, teris, striatus

Folia alterna, <sup>bi-
tripollicaria</sup> basi amplexicaulia, indivisa, lato lanceolata
basi cordata, venosa, glaberrima, subtus glauco viridia, acuta
superius inferius a medio versus apicem serrata: serraturae parvis
remotis: superiora integerrima margine omnia ^{antra recurvata} margine tenuissimo serrata
lato oculo armato videnda, fere inferiora subobliqua

Pedunculi ex apice ramulorum, solitarii, uni flori erecti
filiati sub flore crispis

Calyx perianthium duplici ordine exteriori triphyllum patens
interius tandem reflexum foliis lineari lanceolatis
marginibus dentibus minutissimis membranaceis ferebris
interius brevissimum 3phyllum foliis ovatis acutis apice leviter

fructibus ter purpurascens, lobis vixis vixis flavescens, tubellis vixis pube
Corollula radii octo, ^{flori} ligula oblonga 5dentata supra bilobata,
dente intermedio minore extus lineis nonnullis obscuris

virescentibus. ^{radice vridi} Diffusi tubulosi tubo medio gibboso, inferne ^{virescenti} super
ne ^{remise} persistentes per purasque lacinis revolutis. Stigmatat^{us} Duo reflexa
ore latis villosa, purpurea
anthera artus purpurei

Palea corae lineares inferne angustiores concava carinata superne
purpurea apice vixida mucronata.

Samina purpurea obscure tetragona, purpurea, pappus nullus
nisi marginem elevatus integerrimus

Recepticulum subulatum sesqui pollicare, nane
ubi pedunculum superne.

Mathucata Rudbeckia

Habitat in Cardena herb. Ruth.

Caulis herbaceus, ascendens, simplex, tetragonus, que latis peli adpressis. Folia
semipollicaria, inferna approximata, in petiolum attenuata, oblonga, superiora
remota, sessilia, obsolete crenata, obtusa, aculo armato peli raris adpressis. Pedun-
culus terminalis, elongatus, uniflorus. Calycis foliola oblonga. Corolla minor
quam in horto

Inloba Rad. foliis spatulatis: inferioribus trilobis, superioribus indivisis lina. S. R.

p. 702

Chrysanthemum annuum majus virginianum, foliis laciniatis et herbatis
umbone nigrescente Monf. hist. 3. p. 19. n. 37.

Chrysanthemum cannabinum virginianum herbatum, discis magno, petalis
aureis radiato Pluk. alm. 100 t. 22. fig. 2.

Habitat in Virginia ♂

Caulis paniculatus multiflorus

Obeliscotheca Infido folio Vaillant

Rami teretes, striati, superne pilosi. Folia superiora sesquialia, sesqui-
pollicaria et ultra, sensim minorum remote, lanceolata, subtriplicata
rima, et nunquam pilosa subtus pallidiora, inferne serrata, superne indivisa
rima, venosa. Pedunculis terminalibus ramorum, solitariis unifloris
Calyx simplex foliola lineari. Petala semipollicaria, apice lutea
inferne supra aurantiaca, disco atropurpureo herb. Mus.

perfoliata Rudbeckia foliis alteris, ovatis-lanceolatis cordatis
subperfoliatis Caran. G. vol. 3. pag. 27. tab. 252.
Habitat in Mexico 6

~~non~~ diversa videtur ab amplexu auli

Cacimata R. foliis compositis laciniatis Lin. S. V. p. 702

Doronicum americanum, laciniato folio Bauh. Pin. 516.

Aconitum helianthemum canadense Corn. Canad. 178 & 179

Chrysanthemum americanum perenne, foliis divisis delictis videntibus, ma-
jor. Monf. hist. 3. p. 22. f. 6. & 6. f. 53 et 54.

Habitata in Virginia et Canada ?

Caulis sulcatus glaber. Folia petiolata inferna squelota
superiori involuta supra omnia fiata
inferna serrata superna integerrima Radicum
li elongati uniflori.

Specimen herbaria pro descript. insuffici.

hista N. foliis spatulato ovatis Triplineris serratis hirtis, ^{foliis calycis lineantibus} rec. eptaculo conico, paleis
cuneolatis Hort. Kew. 3. p. 251

Chrysanthemum helenii folio, umbone floris grandiflora lo prominente
Pluk. n. alm 99 t. 242. fig. 2. Mont. hist. 3. p. 23.

Obeliskotheca integrifolia, radio aureo, umbone atro rubente Dill. Elth.
293 t. 210. fig. 205.

Rudbeckia hista: foliis indivisi spatulato ovatis, radii petalis emorgi
natis Lin. S. V. p. 702

Habitat in Virginia, Canada ^{prope} uno alterove flore
Caulis ^{longus} et folia hispida scabra, ~~folia superiora lanceolata vel oblon~~
ga, remote dentata, ~~suprema integerrima remota.~~ Palyx hirti
dus foliolis equalibus. Pedunculus terminalis uniflorus

Caulis simplex ~~hispidus~~ ~~van~~ flore uno alterove folio hista
Corollula radii fulvi flavi et fus cinereri. Folia hista ~~una~~
minus scabra quam in insperante. Paleis apice hispido

purpurea R. foliis lanceolato-ovatis ~~alternis~~ ^{glabris} dentatis multi nervi
radii petalis bifidis pendentibus.

Pedunculis virginianus latifolius; petalis florum congesti
nis purpuriscentibus Mon. hist. 3. p. 47. f. 6. 7. 9. fig. 1.

Chrysanthemum americanum; doronicifolius, flore persici coloris
umbone magno prominente ex atro-purpureo vire. Stans
fulgente Plukh. Alm. 44. t. 21. f. 4. 1. Cat. Carol. 2. p. 59. v. 59.

Rudbeckia purpurea foliis lanceolato-ovatis alternis
indivisis radii petalis bifidis Lin. l. v. p. 782. Mill. Bot.
t. 224. f. 3. 1.

Habitat in Virginia Carolina

Caulis tripedalis simplex fuscatus glaber. Tota pubes
pallidiora brevior, supra scabra pilisque rariis minutis
ad marginem prostratis adpressis, radice calice petiolato elliptico
lanceolato multinervi caulino sessilibus 5 f. 3 nervis
lanceolata elongata. Pedunculus terminalis uniflorus.
foliolo calycina ovato lanceolato subulato. Pappi
loci cavo subulato longitudine flosculorum

angustifolia R. foliis oppositis lineariibus integerrimis Lin. Spic. 12. pag. 1287
S.V. p. 702.
Purshii foliis lineariibus integerrimis Gron. Voy. 181. Mill. Dict. 7. 224 fig.

Habitat in Virginia 4

Glaber. Folia basi sensim angustata puberula. Corollula radiis
longo, 12. flavescens basi, uti corollula diffusiato-rubente
Calycis squama exteriore subulata, patula; interiores obtusi, recta
corollula diffusi basi ventricosa. Semina mutica

Triplineris foliolis calycinis oblongis

fulgida Pradl. foliis oblongo lanceolatis denticulatis hispida basi angustatis subcordatis,
receptaculo hemisphaerico, paleis lanceolatis Hort. Kew. 3. p. 251.

Habitat in America septentr. ?

implex ramo uno alterove unifloro

Paulis. uti folia, hirtis, sulcatis. Folia superiora remota integerrima. ^{Chenopod} Pedunculis terminalis unifloris. ^{Corollula radii} Petala extus pilosissima

Soliola calycina hispida. Dentes atropurpurei

folia superiora lanceolata sessilia inferiora basi angustata
uti superiora triplineria omnia punctata si aberrima. dentes
remoti; extrosus versus. Corollula radii fulvi. Paleae apice
pubescente purpureo latior quam in hirtis