

Ruellia

ibus

1. longiflora R. foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis longisimis caule fruticoso.
 2. macrophylla R. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis, pedunculis axillaribus elongatis bifloris corollis ^{integerrimis} rugatis
 3. strepera R. foliis ~~petiis~~ ovato-lanceolatis, pedunculis ^{integerrimis} subtrifloris corollis campanulatis
 4. tuberosa R. foliis ovato-cuneato-ovatis crenatis, pedunculis tripartitis, caule simpliciter
 5. clandestina R. foliis oblongis, pedunculis tripartitis, caule ^{ramoso} ovatis ~~subint~~ lanceolatis
 6. paniculata R. foliis villosis viscosa foliis oblongis ^{integerrimis}, pedunculis axillaribus dichotomis ^{diversitatis} simplicis
 7. pilosa R. foliis oblongis integerrimis ciliatis, floribus ^{non bene locatis} terminalibus simplicibus solitariis
 8. pedicula R. villosa viscosa, foliis ovatis integerrimis pedunculis axillaribus ^{subunifloris}
- ordo ad huc corrigendus

bus

modi

9. pallida R. foliis ovatis undulatis crenatis margine serratis, floribus axilla-
ribus sesquialibus solitariis
10. parviflora R. foliis lanceolatis-ovatis integerrimis subvillosis, floribus axilla-
ribus sesquialibus solitariis
11. thymifolia R. foliis ovatis glabris integerrimis, floribus axillaribus sesquialibus
solitariis Conpotui Austria
12. littoralis R. fruticosa cana, foliis cuneiformibus serratis retusis glabris, flori-
bus axillaribus subsesquialibus solitariis
13. fragrans R. foliis oblongis sesquialibus serratis, caule glabro, basi repente
floribus axillaribus sesquialibus
14. tanacetifolia R. villosa-rufesca, foliis oblongis inferioribus incisissimis superiori-
bus serratis floribus axillaribus sesquialibus
15. ruginosa R. foliis oblongis integerrimis, floribus caule procumbente, floribus
solitariis sesquialibus
16. biflora R. floribus geminis sesquialibus
17. balearica R. erecta glabra, foliis lanceolatis serratis, verticillis sesquialibus
18. repens R. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis floribus sesquialibus
bracteis petiolatis calycibus longioribus, caule repente

19. Difformis R. Diffusa hispida, foliis linearibus dentato-sinuatis integris floribus
axillaribus verticillatis

20. fulva i folia

21. undulata

22. crispata R. foliis lanceolato-ovatis subrenatis, capitulis ovatis foliis hispida
caule repente

23. barbata R.

24. involucreta R.

25. depressa R. foliis obovatis integris, caule ante depresso.

26. radice i flora. R.

27. fasciculata R. foliis lanceolato-ovatis dentatis opposito minore, floribus
terminalibus fasciculatis

28. aristata R. foliis ovatis subtus canescentibus, capitulo terminali, calycibus
bracteisque nervosis aridis aristatis, caule frutesco

29. bleichum R. foliis
mollescentibus

30. bleichum R. foliis ovatis integerrimis, fructibus ovatis, bracteis interioribus
terminalibus
geminis lanceolatis calyce longioribus

31. bleichodes R. foliis oblongis subdentatis glabris, fructibus ovatis, floribus bracteis
longioribus

32. guttata R. foliis ovato-lanceolatis undulatis margine scabris, spicis terminalibus imbricatis
33. lupulina. R.
34. imbricata R. foliis ovatis undulato-crenatis opposito minore, spicis imbricatis
 secundis, bracteis cordatis
35. hirta R. ^{hirsuta} foliis ^{heterolatis} oblongis serratis, spicis terminalibus imbricatis
36. uliginosa R. diffusa hirsuta, foliis sesquibus oblongis integris, spicis terminalibus sesquibus tetragonis
37. ventriculata R. foliis obovatis, verticis spicis verticillatis obovatis spicis inermibus
 bifurcatis
38. japonica R. foliis ellipticis, floribus spicatis, bracteis oblongis obtusis
39. repanda R. foliis lanceolatis obtuse dentatis, caule repente
40. eranthemoides R. foliis ellipticis integerrimis, spicis terminalibus bracteis ovatis
 lanceolatis attenuatis
41. longifolia R. foliis lanceolatis-ellipticis crenatis glabris, spicis axillaribus
 subglobosis
42. angustifolia R. foliis linearis-lanceolatis, spicis oblongis, bracteis ovatis
43. repens R. ^{hirsuta} abaulis foliis petiolatis oblongis crenato-undulatis, spicis erectis multiseriis

Conziflora Ruellia

Habitat in opacis limosis sylvanum Guana herb Ruellia.
Radix repens. Caulis herbaeus, erectus, tetragonus, subramosus, glaber. Folia
pedis lata, pithamisa, lanceolata, utrinque attenuata, basi in petiolum, cuneata
gemina, supra nitidiuscula, obsolete nervosa, subtus subvenosa, costa utrinque
velloputa, oculo armato pili innati rari. Pediculi axillares et terminales,
solitarii, foliis breviores, semel vel bis bifidi, cum pedicello in divisa et
3-4 laterales distantes in singulo ramo. Pedicelli breves. Bractea subulata,
^{ad basin calycis} uti calycis ore latis velloputa. Calyx squamatus. Laciniis subulatis. Corolla
infundibuli formis, fere sesqui pollicari. Tubus extus oculo armato pubescens
rectus, angustus: limbus campanulatus. Laciniis rotundatis. Stamina limbo
duplo breviora: filamenta inferne pubescentia. Anthera subfagittata. Stigma
ma sub lanceolatum, lamellatum. Capsula 2 sperma
affinis *Ruellia macrophylla* Symb bot

15-16 Longiflora

Ruellia. foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis longis
gossimis, caule quadrifido. Tab.

Camellia (sive ad Linn.) Longiflora; foliis petiolatis cordatis, obtu-
sis integris, tuba corollae quadripollicari Bostr. Desf. pag. 126 n^o

99.

Qualis fuit, fus, erectus, scabriusculus, pilosus: pilis longis extantibus
intermixtis aliis brevissimis stellatis.

Folia opposita, petiolata, ovata, integerrima, obtusissima, avenia,
utrinque pilis stellatis tectis, viridia, subtus albidiora, pollicaria.
Petioles foliis brevioribus pilosi.

Flores axillares, solitarii oppositi, pedunculati: Pedunculus
semipollicaris, foliola brava, petiolata caulibus summissima,
minora ad basin Calyces.

Calyx campanulatus, quinquefidus: laciniae ovatis, acutis
intus canis intus mollissimis.

Corolla tubus longissimus, quadrupollicaris, superne villosus
limbus campanulatus, quinquefidus, laciniae aequalibus
rotundatis

Capsula ob

Filamenta subequalia.

Capsula elastica oblonga utrinque acuta, bivalvis, bilobulata.

Planta a Badenâ longiflora Luyt. Lin: pag 290 toto celo diversa
illa enim gaudet foliis mollissimis atque pilis stellatis. Bractea
glabra reticulata sessilibus scandis. ut eo melius a se invicem
distinguantur figuram Badenâ longiflorâ hujus etiam dedi
Tab.

mainpdylla Ruellia foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis, pedunculis axillaribus elongatis bifloris Tab.

Habitat in Insula St. Matthaei Americae Dom. von Rohr.

Caulis herbaceus: Tetragonus, pubescens.

Folia petiolata, subsessiliter, basi parum perpendiculari decurrentia, utrinque viliis minutis ranoribus adpressa, subtus pallidiora.

Petioles pubescentes, sesqui pollicares.

Pedunculi axillares, oppositi, longitudine foliorum, varietes, pubescentes, biflori. Pedicelli gemini, semi pollicares, uniflori, basi utrinque bractea

Lanceolata, ciliata, pedicellis longior: duo alia ad basin singuli calycis eoque longitudine.

Calyx quinquefidus, glaber: Laciniae lanceolatis subaequalibus.

Corolla sesqui pollicaris ^{inter geminos}, basi angustatus, apicem versus sensim ampliatius: Laciniae superioribus rotundatis, inferioribus

tribus parum brevioribus ovatis.

Stamina longitudine corollae.

Stylus corollae longior.

fructum ^{Glycine}
~~Podium~~ ^{Podium} foliis ternatis lanceolatis villosis, racemis axillaribus
caulis caute erecto suffraginatos
Cylindrus rotundus foliis ternatis, oblongis angustis, hirsutis, supra viri-
dibus, subtus rufescentibus; Leguminibus compressis aubl. fl. quon-
p. 766. tab. 306.

an reticulata
Schw. p. 105
In Insula Trinitatis legit Dr. Robt.
Fructuarius erectus ramif. Rami angulati fructu villis purpureo
siccantibus subtomentosis
Folia petiolata, ternata remota folia petiolulata lanceolata atten-
nuata, bi f. tripollicanaria, utrinque mollia villosa mollia
supra lineata, subtus venosa reticulata albidiora venis purpureo
siccantibus subtomentosis, mucronata petiolo longior
Petioli brevissimi. Stipula oppositifolia, subbifida laciniis
lacinatis
Pedunculi axillares solitarii foliis duplo brevior subtomentosis
basi bracteis geminis alternis approximatis, ovatis. pedicelli breves
et longi patentes approximati.
Calyx et cetera canescens bilabiatus

strepens R foliis petiolatis, pedunculis trifloris brevibus Lin. S. V. p. 174. 422
Ruellia strepens, capitulis comosis Dill. Elth. 300 tab 297 fig 321.

Habitat in Virginia, Carolina &

Caulis erectus pedalis erectus tetragonus, leviter pubescentibus simplex
folia petiolata, ovato-lanceolata, ^{vel elliptica lanceolata} nervosa interjuncta ^{interjuncta}
subrepanda, saepe quadripollicaria. Pedunculi axillares breves
uniflori interdum ^{vel} bipollicariis apice sub floribus folia gemi-
na structura caulicorum floribus longioribus, trifloris interdum
unifloris. Calycis foliola lineari lanceolata longitudine
tubi ciliata. Embus sub campanulatis

subtrifloris apice dyptylis

lis

Suberosa R. Folis ovatis crenatis, pedunculis unifloris Lin. S. V

Ruellia humilis, flore conulo, affodeli radice Plum. gen. 12.

Gentianella flore conulo, integro rapulo seminali ex humidi contactu im-
patiente Sloan hist. 1. p. 149. t. 9. s. fig. 1.

Ruellia capsulis angulosis Dill. Elth. 320

Habitat in Jamaica &

Radix suberosa. Tubera oblonga, glabra. Caulis herbaceus, indivisus, erectus
sepe pedales ~~tetragonus~~ glaber ~~perenne~~ pilis albis adpressis. Folia petiolo
ovato-oblonga basi attenuata, ^{subnatis} per petiolum decurrentia ^{subnatis} subcrenata
glabra nervosa. Pedunculi axillares oppositi, patentes, rarius sim-
pliciter, communiter tripartiti, longitudine foliorum, interdum trichotomi
Flores magni conuli. Carina calycis lineanbus. Capsula oblonga
baccata linearis

Suberosa R. — uncinato-ovatis crenatis, pedunculis tripartitis, caule sim-
pliciter Sw. obj. pag. 245 x

— pedunculis trifloris

Clandestina R. foliis petiolatis, pedunculis longis subdivisis nudis hort. Ups.

1794 S. V.

Ruellia capsulis teretibus Dill. Elth. 320. t. 240. fig. 230 320

Habitat in Barbados

Caulis tetragonus ramosus articulatissimus glaber. Folia petiolata sesqui pollicaria subintegerrima glabra, nervosa. Pedunculi axillares triflori laciniis calycis setis tubulato. Corolla magno coruleo periclymatis pubescentes.

oblongis, pedunculis tripartitis caule ramoso

10-17

figura Dille cum descript. tuberosa Sw. optime convenit an Linn.
Dill. ad tuberosam potius spectat vel descript. Sw. potius ad *Clandestina*
nam

paniculata ^{piloso} Ruellia, foliis ovatis, subrepandis, pilosis, pedunculis axillaribus dicto
~~foliis ovatis, subrepandis, pilosis, pedunculis axillaribus dicto~~
tornis; floribus sessilibus.

Ruellia paniculata: foliis integerrimis, pedunculis dichotomis lateralibus
calycibus sessilibus: laciniis supra majore. Lin. S. V. pag 575.

Habitat in ^{et matre} Caracas meridionali. Lin. v. Prokr

Caules erectus, ~~obtusus~~ ^{trigonus} tetragonus; e pilis exstantibus brevibus pubescentibus
Folia petiolata alterna opposita, sepe ^{bi ad} quoad pollicem, basi attenuata
utrinque acuta, obscure repanda, vel integerrima, tenera, nervosa,

specimen aliud. utrinque pilis raris decumbentibus adpressa, margine pilosiora.

acervi
inflorescentia Petioles 1. 2 pollicares, patentissimi, pilosus ^{sub} pilosus ^{reco} ^{si}

calycis vellosi Pedunculi axillares gemini ex singula axilla, unguiculares, filiformes
lata pilosi, semel bifidi; ^{cum sepe sessilibus in dichotomis} pedicellis longior alter longitudine petioli bifido

facie parum aliis pedunculis rus, alter brevior uniflorus. Flores sessiles. Bractea duo ad basi calycis
longatis ^{oppositis} opposita, oblonga, vix semiunguiculari

ter vel quater Calycis quinque partibus, unguiculari, pilosus: Laciniis linearibus; super
dichotomis ramis divaricatis non parum longiore et latiore.

eandem capsula longitudine calycis, glaber
tamen ^{esse in dubio cum} pedunculis astate ultimus est circ.

12. 16. Lin. v. Prokr facta adulter et quod pedunculi astate ultimus est circ.
confunditur Lin.

pelosa R. foliis oppositis ovatis integris ciliatis, floribus terminalibus solitariis

Len. Suppl. pag 290 LV. p. 376

Habitat in Cap b. p. i

fruticulus palmari ramis diffusis. ^{ramuli superne vellosi} folia brevia ^{ster} petiolata avena
terrestris angustata margine et costa subtus pilosa. Flores in apice
apice ramorum ~~interdum~~ ex axillis ultimis sespilis: folia longior
calycis foliola ciliata.

oblongis

sespilibus

radula R. fruticosa villosa viscosa, foliis ovatis integerrimis, floribus axilla-
ribus aggregatis Lin. l. v. p. 575. Gaeyh. Meis: 2. p. 350. F. var. t. 41.

Gratiola affinis moderata Digitalis smula Pluk. phyt. t. 193. fig. 3

Habitat

Caulis teretissimus pubescens superne latibus oppositis alternis linea exa-
ratis

Folia inferiora oblonga superiora ovata patentissima ^{obtusissima} margine obscure
denticulata vel integerrima, supra quasi oleo illinita ^{pubescentia}
minus villosa, subtus mollia pallidiora. Petioli longitudine foliorum
Pedunculi axillares solitarii brevissimi ¹ sive 3 flori ^{foliis}
longitudine floris oblongi ^{setis} flores ^{caetera} sessile ^{plestinaque brevitate} breviter
obtusis deciduis longitudine calycis lacinus lobis lanceolatis subaequa-
lis. Corolla infundibuliformis regulari superne pallide purpurea
inferne alba parum pubescens supra gibbosa angulata. Laciniis com-
bi emarginatis. Stamina corollae breviora. Capsula ^{liberata} calycis
duplo longior

nonne strepten

Ruellia ovata.

3-4 pallida Ruellia foliis petiolatis, undulato-crenatis margine scabri, floribus
axillaribus solitariis sespilibus.

Ruellia strepera, flore magno violaceo, foliis obtusis Coch.

Habitat in ^{Defin. pag. 114} ~~in~~ ^{arboribus}

herbariis

Caulis ^{obscure} tetragonus, sulcis in singulis lateribus excavatus.

Stipula, petiolata, pollicaria, ovato-oblonga, obtusiuscula
pallide viridia, glabra ^{oppositi,}

Pedunculi axillares, brevissimi, solitarii, uniflori ^{oppositi.}

Siliqua lanciolatam utrinque basin calycis, ciliatam,

calyce longior.

Corollae tubus calycis triplo longior, superne ampliatas,
pollicaris

6

224233, 5

umbellata Ruellia

Cupulina Ruellia foliis petiolatis ovatis pilosis, pinnis secundis imbricatis B. bractea
cordato subrotundis, caule fruticoso

Habitat in Arabia Tosphal et Insula Bobonis in herbario Thourin vidi
Triticulus humilis ramosis. Rami ^{patentes} ultimi villosi,

Solia semipolliciana, opposita minore, undulata utraque rare pilo

sa, obtusa
Spica est apice ramorum, pollicares, pilosi: Solia semper fructu
na foliorum caulis ad basin florum.

Bractea cordato-subrotunda imbricata membranacea, venis reticula
to semiunguiculari, pilosa, ciliata, calycis parum longior

Flores 40 ad singulam bracteam

Calyx quinquepartitus, laciniis pilosis superior ovata membranacea
reticulata reliquis longior et quilo latior. laterales duo fetacci
exterioribus binis laterales parum longior et latior

Corolla calycis longior tubo curvato, limbo quinquefido. laciniis oblon
gis obtusis, binis superioribus minoribus

Bractea dispersa
oblongum
obtusum pilosum
altero latere brevior basi obliquo

vide Syn. Tosph

^{sub ~~varietas~~ ^{varietas} ~~varietas~~}
parviflora *Euellia* foliis lanceolato-ovatis integerrimis pubescentibus, floribus axillaribus
solitariis sessilibus

Habitat Bellandi missi sub nom. *Euellia* Blechni

Caulis pedalis ^{basi lignosus} tetragonus seu angulis subvollosis, articulatus articulis inferne
tumidis et tolia breviter pedicellata lato lanceolato pilosiusculis
inprimis in venis subtus bipollicaria patentissima acuta, basi uti
pedicellus pilis raris ciliatis. floris oppositi Bractea duo lanceola
ta subpedicellata ad basin singuli floris calyce breviores. Calyx quin
que partitus: lobis lanceolatis capsula parum longior, pilis
raris ciliatis. Perolla parva longitudine calycis, basi ^{inferior} albida ^{subtus} medio
angustata ^{quasi pericarpium} apice ^{caduca} vixipani, apud me nunquam aperta et
Capsula clavata

70

9

in horto habui specimen exsiccat neglecti

Thymifolia
truncata R. foliis ovatis petiolatis glabris integerrimis fl. albis sessilibus axilla-
ribus solitariis

Habitat ad Cap. b. Jui

Caulis herbaceus palmatis tetragonus, glaber ramosus; ramis ramis
lovis oppositis. Folia parva fere Thymi glabra ut nervosa. Flores
oppositi foliis longiores. Calycis lacinis subulato ciliato longitudo ine
corolla. Corolla pubescenti etus. bractea striata ~~ad~~ utrinque ad
singulum calycem calyce brevior

3

Stamina tantum duo numerari

littoralis R. *Fruticosa* cana, foliis cuneiformibus serratis retusis glabris, floribus
axillaribus solitariis subsessilibus. *Lin. Suppl. pag. 289. x. f. v. pag. 576*
Habitat prope Sadras ad littora maris.

Fruticosa, ramosa pum. depressa. Rami tetragoni, articulati, albican-
tes. Folia fasciculata per propagines, parva, breviter petiolata,
rigida, cuneiformia serrata retu emarginato-retusa serraturis
remotibus, subcartilaginea, punctata scabra, fere canescente
compressa. Calyx 5 angularis, spidus laciniis striatis acutis canis-
cibus corollae campanulatus. Stamina duo majora ventriculo
basi notata. Capsula lineari-oblonga, calyce longior. *Lin.*

44 7-0
non vidi

fragrans R. Folis oblongis sessilibus serratis, caule flaccido, basi repente floribus axilla-
ribus sessilibus.

Ruellia fragrans foliis sessilibus oblongis obtuse serratis, floribus axillaribus
solitariis sessilibus Forst. prodr. pag. 44

Habitat in Tahiti

Planta parva ramis filiformibus glabris folia semunquiuulana
glabra basi vespis integerrima, flores alterni vix longitudine
foliorum

innepiens R.

Tanacetifolia R. villosa villosa foliis oblongis inferioribus incisiss
superioribus serratis, floribus axillaribus

Habitat ad littora fluminis ^{54/1074} Ghodda seu ^{complexus pithamou} Khong
Caules articulati villosi uti tota planta, Tetragoni. Folia
petiolata inferiora longiora sublanicolata profunde
dentata superiora ^{54/1074} serrata superiora oblonga basi in
tegerima pollicaria sensum minorum. flores scapulis
subterni via longitudine foliorum. folia duo ovata alba
integerima sub singulis tribus floribus

Wingens R. foliis oblongis integerrimis, floribus solitariis sessilibus, caule procerum
bente Lint. Zeyl. 234† L. V. pag. 575*

Upudali Rheed. mal: g. p. 125. t. 64.

Habitat in India

Caules proceri - per se pubescentes subramosi diffusis: foliis
reticulata, ovata vel oblonga basi acuta integerrima, subtus pal-
lidiora utraque pilosissima, margine obscure repanda semipil-
lata. Calyces tubulosi.

Houtton hist. nat. g. tab. 59. fig. 2.

Diversa a mea an planta fl. Zeyl. Diversa a Systematis confer herb.
Linnæi

70
Figura Rheed. ut hinc spectat

biflora R. floribus geminis asperilibus Lin. - V.

Ruellia minorae folio, floribus gemellis Dill. Elth. 331.

Habitat in Carolina.

~~72~~ 14
non vidi

balsamica exerta glabra, foliis petiolatis lanceolatis serratis, verticillis sesquibus
Lin. suppl. pag 289. * LV 576.

Habitat in agro onzariis Indiae vulgarissima

Caules exerti ramosi glabri teretes, tetragoni purpurascens. ^{Rami propli}

Folia patentia vix pollicaria lanceolato-oblonga venis fine

serrata, glabra, glutinosa. Verticilli multiflori. Bractea longior

duo calycis parva basi attenuata ciliata. Latior superior calycis
reliquis latior. Corolla rugosa lutea. Stylus hirsutus

repens *A* foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, floribus sessilibus, bracteis
petiolatis calyce longioribus, caule repente Lin. Mant. 89 * I. V. p. 441 526
Burm. Ind. 135. t. 41. fig. 1.

Habitat in India

Caules palmari herbarii repentes. Folia lanceolata, petiolata
acuminata integerrima. Flores laterales sessiles solitarii
Bractea basi elliptica petiolato calyce longior. Lin.

non vidi

7-2

difformis
~~*diversifolia*~~

Ruellia foliis petiolatis inferioribus lanceolatis dentato-serratis
superioribus oblongis serratis, floribus oppositis axillaribus
in *Ruellia* *difformis*: diffusa hirsuta, foliis linearibus dentato serratis
integris, floribus verticillatis axillaribus *Her. Suppl. pag. 284*

Caulis hirsutus *Spithamei*

Solia pollicaria ~~in~~ petiolum brevem depressa, pubescentia
superiora latiora breviora, acute serrata oblonga, patentia

~~inferiora latiora breviora, acute serrata oblonga, patentia~~
~~foliis linearibus dentato serratis~~
~~trifloris trifloris oppositis~~

trifloris trifloris oppositis
trifloris trifloris oppositis
trifloris trifloris oppositis

Calyx laciniis ~~in~~ *pubulatis*

Diversa planta a *Her. Schellii* *Hort. Mal.*

Differencia *D. diffusa* hirsuta, foliis lanceolatis dentato-sinuatis integris, floribus ver
axillaris axillaribus *Len. Suppl. p. 289. t. V. pag. 576.*

~~Her. Schulli~~
Habitat in India

Folia lanceolata angusta integra alia serrata, alia profun
dus quasi dentata: Dentibus acutis *si* ~~Len. f. mea vero~~
~~Renoi differentia in mala~~

~~Caulis articulati villosi. uti tota planta villosa viscosa.
Tetragoni. Folia petiolata inferiora rennoi lanceolata
oblonga profunde dentata subpinnatifida superiora
oblonga serrata, basi integerrima pollicaria superiora
sensim minor. Flores axillares subsessiles terni vix
longitudine foliorum. Folia duo ovata acuta parva ad
basi sub utroque bractea flores bracteatis.~~

~~villosa viscosa foliis oblongis inferioribus acutis superioribus serratis~~

Her. Schulli Rheed. Mal. 2. p. 29. t. 46. forte hujus varietas

16-17 Folia Ruellia foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis,
calycibus anistatis, bracteis lanceolatis, caule erecto.

Habitat in India orientali

Affinis procedenti, differre videtur sequentibus:

Folia longioribus, utrinque magis attenuatis, nec tantum apice,
utroque lineis piliformibus adpresso, subtus pallide viridia,
undeque ejusdem fere longitudinis, nec minoribus oblongis obtusis
in ramis.

Bracteis non foliaceis obtusis, sed lineari-lanceolatis acutis, basi
non attenuatis

Calycibus minoribus in partem deponentibus, margini tantum pilis
subciliatis, nec ubique, fructu deciduo persistentibus

40

290220 14 27

undulata Quellia foliis petiolatis oblongis undulatis, capitulis axillaribus sessilibus, caule erecto

Habita in India orientali Hong

Caulis erectus, herbaceus, glaber, tetragonus, ⁱⁿ angulis obtusis, sulcis utrinque lato profundo. ^{geminis axillaribus crispis, apicibus petiolo & seatis.} ~~ramis oppositis, caule brevioris.~~

folia petiolata, bipollicaria, sesqui pollicem lata, obtusa, basi attenuata, plana, venosa, glabra, subtus pallidiora.

Petiolus pollicaris, superne a folio decurrente marginatus, basi

capitula ^{pediculis} sesquipedalia

flores ^{congesti} in capitulis ^{alternis} alternis congestis, magnitudinis ~~sub~~ ringueularibus, bracteatis. Bractea exteriori majori ciliata, ~~interioribus~~ ovato-lanceolata, obtusiusculo, interiores angustiores, canaliculatae.

calyx 5fidus, laciniis ciliatis, subulatis, binis inferioribus profundioribus ~~longioribus~~ brevioribus

Corolla calyce parum longior, glabra

36

224

226 10 31

crispa l. foliis subcrenatis lanceolato-ovatis, capitulis ovatis foliis hispidi
caule repente. Lin. Spec. pl. pag. 886.

Adhatod & Curanen sis, spica plana Pet. gar. Tab. 73. fig. 6?

Habitat in India

Radix lignosa repens. caules digitales simplicissimi adsculati; teres
trifurci. Folia lanceolato-ovata sessulata, pelis adpressa
margine reflexo undulato-crispa s. crenata. Capitula ad geni-
cula lateraliter solitaria ovata imbricata foliis ovatis acuminatis
his piloso scabris intra quae flores. Calyx hispidus Lin.

non vidi

~~22~~ 29 36

betonicifolia *S. foliis cordatis obtusis crenatis, racemis nudis sculis, pedicellis subventral*

Catis

Habitat in Bonana Thomi

an Indica her.

Caulis erectus pedalis simplex, tenuissime pubescens. Folia petiolata
lata subrotunda profunde crenato serrata venosa, glabra verno
sa, pollicaria et ultra, subtus ad centem punctata. Pedunculus
terminalis elongatus superne glomeris inter flores villosus
bractea ovata acuta parva. Pedicelli 3 utriusque intermedius
primum florens. Calyx pubescens oblique truncatus integer
Corolla calycis duplo longior

10-11 involucrata Quellia foliis lanceolatis integerrimis glabris, capitulis terminalibus
involucratis pelopis

Habitat in India orientali Hong

Caulis suffruticosus? erectus, e lineis quatuor decurrentibus obscure
tetragonis, lateribus duabus lationibus; convexionibus; ramosis.

rami breves, oppositi vel alterni. pollicem longus
Folia subsessilia, opposita, dodrantalia, utrinque attenuata,
obtusiuscula, plana, subtus pallidiora, alternatim nerv
osa, utrinque glabra.

Flores in capitulo terminali imbricati, breve pedunculato, mag
nitudine Cor nucis conyli. Bracteo quatuor, ovato, sub
singulo capitulo, acuto, piloso, ciliato, capitulo breviori:
3 ad basin singuli floris, longitudine calycis, piloso, duobus
Verulia linear-lanceolata: exterior oblonga, triplo latior
Calyx inequaliter quinquefidus: laciniis linearibus, acutis

37

227-225

226 23

Depressa R. foliis oppositis petiolatis obovatis integris, caule ante depresso leni
Supt. 290 S. v. p. 576

Habitat in C. b. per

Caulis vix ulli terra adpressi inferne squamis e petiolis basi per
sistentibus tecti folia et flores aggregati in capitulis. Folia basi
attenuata longe petiolata conspicua avenae mucronata.
cum petiolo saepe saepe qui pollicari are glaberrima calycis laciniis
superne tomentosa nervosa rugida

lanicolato oblongo subtriangulati capitulis radialis

radice floa Puellaia foliis lanceolatis sessilibus, floribus capitatis radicatis
Calycibus caustatis bracteisque anfractis pungentibus
Habitat in India orientali. Tronijs

Caulis plures herbacei debiles, ascendentes juxta mos, articulati

Dichotome subramosi, 4e trigoni y labri.

Folia opposita sessilia, pollicaria, scabra propositum margine
utranque acuta avenia, venis subtus costis subtus margineque.

^{pilosiusculis} ^{conspicuis} magnitudine necis juglandis
Flores in capitulum ~~et~~ glomerati, exia opposita ad radicem sessile
interdum minor in dichotomia inferior

Bractea sem submentosa, in stam flavam pungentem, median

esse desinentia int exterior ovata reliquis duplo latior

proxima convoluta
consequentibus
involvens
interiori lanceolato.

radiciflora R.

20 33

proprium genus Willden.

1041 Ruellia fasciculata
fastigiata

Ruellia foliis petiolatis oblongis dentatis petioli alatis, floribus aggregati
terminalibus lateralibusque

Habitat in India orientali ^{in nemorosis prope Thermas Trinquema Ceylone}

Caules herbacei, filiformes, debiles, decumbentes, tetragonis a lineis decurrentibus
angulati, alternatim ramosi, articulata articulis hirs, genicula

Tolcii pedicelata, opposita, ^{remota} pollicana, opposita minore, subtus pilosa, nervosa
tenuera, remote dentata, acuta,

Ruellia fasciculata

Petiolus longitudine foliorum, e basi folii decurrente alatis, superne

lanceolatis ~~latioribus~~ ^{ex} ~~apice et ad latera ramorum ramorum~~ ~~et ad illis superne~~
axillis ~~superne~~ ~~et ad illis superne~~

cores ~~apice et ad latera ramorum ramorum~~ ~~et ad illis superne~~
in capitulo parvo fastigiato, pedunculato, collecti.

Bractea tres ad basin singuli floris: exterior membranacea, trinervis, pilosa

oblonga, acuta, reliquis triplo latior, secunda longitudine prioris
cotata nervosa reticulata, lanceolata, tertia brevior angustior

Calyx ^{pilosus} sprentus, lacini coloratis, membranaceis, petiolatis, trinervis,
acuti. superior lanceolatus lanceolato, reliquis latior, laterales

petalicia, breviores, inferiores duo longitudine superiori, parum
angustioris

Corolla calyce longior, glabra; labium inferius trilobum, lacini
rotundati

vide Actaei observat.

34

222 41

angustata Ruellia foliis ^{nervosis} petiolatis ovatis subtus canescentibus, capitulo terminali, calycibus
bracteisque membranaceis ^{angustis}, caule fruticoso
Habitat in Arabia felici Boshat.

Fruticulus ramis inferne teretibus, glabris cortice cinereo, lavi, superne villosi
folia petiolata, ^{uniguilang} ovata, ^{indigena} crassifolia, arena, supra lineata, pilis minus
vis adpressis raris adpressis, subtus pilosiora, canescentia.

Capitulum terminale, hemisphaericum, basi cinctum, foliis nonnullis oblongis.

Bractea 3 lanceolata, membranacea, nervosa, in antheram depresso, pilosa
ciliata

Calyx quinquepartitus: Caecinis membranaceis, angustis angustis bilineari termi-
natis, nervosis, pilosis, ciliatis, inaequalibus: superior oblonga reliquis
^{prodeste} basilio latior, reticulata: lateralibus tubulatis, dimidio brevioribus, ^{superioribus} inferioribus

2 longitudine superioribus, linearibus-subulatis superioribus

2 capsula glabris, rima oblonga, calyce brevior

1 Corolla extus pilosa.

104 mollissima Ruellia foliis petiolatis lato-lanceolatis integerrimis mollissimis, capitulis
terminalibus floribus ex floribus fasciculatis.

Habitat in Madagascar Dr Thourin

Tota villosa, mollis.

Rami teretibusculi.

Colia petiolata, opposita, remota, pendula, palmata et ultra, apice
attenuata, ~~pollucem lata~~ viridia, alternatim venosa. pollucem lata

Petoli caui cinerei

Capitula ~~terminalia~~ ^{pendula} reniculata

Flora in ~~capitulo~~ ^{capitulo} ~~hemisphaerico~~ ^{hemisphaerico} collecti; pedunculati ~~ad~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ

Bractea ~~terminalis~~ ^{terminalis} ~~subulata~~ ^{subulata}, ad basin calycis.

Calyx cylindricus, quinquepartitus, pubescens: laciniis linearibus, acutis,
duobus exterioribus majoribus.

35

223

226

28 40

Blechnum Puella foliis ovatis integerrimis, specie ovatis: bracteis internodiis gemi-
nis, floribus binis sessilibus Lin. Am. acad. 5. p. 400 + Spec. plant.
pag. 284 +.

Brunella elatior, flore albo Sloan hist. 1. p. 173. T. 109. fig. 1.

Blechnum foliis ovato-oblongo-ovatis, specie crispis foliatis conico quadra-
tis subhirsutis Brown. Jan. 26.

Habitat in America meridionali.

Caules prostrati dichotomi laxe subtetragoni. Folia petiolo
sa ~~vix pubescentia~~ ^{vix pubescentia}, dentibus obsolete. Petioli ciliati
specie laxa tetragona constructa e foliis ^{acutis} floribus ovato
cordato ovatis nervis et margine pilosis intra singula
bracteis binis, lanceolatis, brevibus intra has flores 2. sessilibus
altero extra alteram

Terminatus
lanceolatis calycis longioribus

Blechnoides R. foliis oblongis subdentatis glabris, pinnis ovatis, floribus bracteis longiori
bush. prod. pag. 93.

Habitat in Jamaica.

Pauli glaber. folia petiolata elliptica lanceolata. B. glabra
bractea cordata inferiores attenuata acuta. pinnae umbriatae

~~Pauli~~ 29 243.

30 gaino

guttata Ruellia foliis ^{ellip} lan ovato lanceolatis margine scabra undulatis, spicis
terminalibus imbricatis.
Ruellia guttata; foliis ovato lanceolatis; flore albo guttato. Tosk. Depr.

Habitat ^{p. 114} in arboribus

Caulis suffruticosus. Rami teretes tetragoni, vel ^{ultra} trifidi, pubescentibus sub articulis
Folia petiolata, pollicaria, ^{vel ultra} obtusifolia, supra pilis rarioribus, arena
Petiolus ^{in unguis} ^{distans} ^{per quinque pollicares}
Pila pedunculata, erecta, imbricata. Flores alterni ^{puberti}
bractea 3 ad basin singuli floris, lanceolata, attenuata, ciliata,
Calycis longior, inaequalis; exterior duobus reliquis ^{lat} ^{longior} ^{parum}
latior et longior, unguis culam
Laciniae Calycis subulatae, glabrae fide.
Corolla glabra

(alca in herbario Toskhaloi vidi, tota glabra, petiolis parum longioribus
foliis latioribus, in reliquis omnibus similis. ^{coeternum} Cum vero nota ~~prostantia~~
~~respondeat huius diffinitio proponere proderet.~~

lepidota

umbicata prostrata ~~2~~ 46

umbriata
Cupulana

Ruellia foliis petiolatis ovatis undulato-crenatis opposito minore
spicis umbriatis secundis fructibus cordatis

Ruellia imbricata; floribus in axillis supremis congestis, secundis
dissepibus; bractea obliqua subrotunda Boiss. Desir. pag

113.

Habitat in Arabia felice, India Orientali et Insula Bourbonia

Ruellia Boiss
flora decumbens,
foliis oppositis
bracteis late
cordatis ciliatis

Caulis suffruticosus, ramosis. Rami debiles, tetra-bracteati; tetragonis
super pilosi: angulis acutis retrorsum reverso pilosi.

Folia petiolata, pollicaria, opposito duplo minore, ovata, acuminata
venosa, pilosiuscula.

Petiolus unguiculatus, latus, pubescens

Spica ex apice ramorum et ramulorum, pollicaris vel ultra, pilosa,
secunda, imbricata. foliola bracteis solidius floralibus
in corpore spicae, oblonga, acutiuscula, basi altero breviora, ^{late}
consistentia foliorum caulibus. Bractea muta antennis cordata,
membranacea, valde pilosa, venosa reticulata. Flores tres
vel quatuor sub singula bractea, proterea bractea minor, ovata
structura exteriori, ad basin calycis

276 275 25
189 187

122 ~~Endon~~ Onosma foliis linear lanceolatis ^{hispidis} ~~hispidis~~, racemis ~~puberis~~ ^{puberis} secundis imbricatis

~~Carnebia Tetra stigma~~ ^{et tricoloria} ~~Boiss. Despr. pag. 62 et 63.~~

~~Radix fusiformis bipollicaris annua~~

~~Caulis erectus digitulis erectis hispidus ut tota planta, basi ramosus
rami decumbentes longitudine caulis eoque fluitans~~

~~Folia linearia ^{lanceolata} sesquipollicaria superiora pollicaria obtusa basi
attenuata. racemosa in caule et ramis 2-3.~~

~~Flore primum spicae denum racemosi. racemus longitudine cau-
lis superne parum reflexus secundis imbricatis~~

~~Bractea utriusque calycis ^{hispidissimi} lineares longitudine calycis~~

~~Calyx quinquepartitus laciniis linearibus fere duplo maior~~

~~Corolla tubulosa calyce longior superne amplectus quinquefidus~~

~~Semina ⁴ ~~4~~ lora nitida ovata cordata cum acumine obtuso.~~

Lithospermum apulum

Habitu non multum recedit a *negosi* apula non dubito quia eadem
est *onosma orientalis* Lin.

1819 herba Ruellia ^{hata} ^{reticulata} foliis oblongis serratis, spicis terminalibus imbricatis, Tab
caula repente. Tab. LXVII

Habitat in India orientali, necum communiorit de Scheped Cubi

Calanar Regis

* inferne repens Caulis herbaceus, uti ~~ista~~ planta e pulis ~~hata~~ ^{albi} hatur, sex spithameus,
ramosus, tetragonus. Rami oppositi, simpliciter, caule breviores.

Folia petiolata, opposita, unguiculata, extrosum serrata, basin
versus integerrima, obtusa ^{et} ^{an} ^{nulli} ^{ultimi} ^{opposito}

Spica terminalis ^{solitarii} ^{hata} ^{et} ^{an} ^{nulli} ^{ultimi} ^{opposito} imbricata bracteis et floribus, pollicia
res, breve pedunculata. Bractea oblonga, longitudine calycis

Calycis lobis linearibus.

41

227 229

25

34

227 229

Atroparginea L. caule subramoso, corolla labiis patentibus infidis
Habitat ad latera montium ~~Baronandeliensis~~ ^{Baronandeliensis} mensis frequent
Ronijs

Caulis erecti angulati tota ^{in pilosus} *atroparginea* squama subulato
breves infimi oppositi superiores alterni. Flores suboppositi
Capsula oblonga calyce parvo longior mucronata, vix
semunquiculata.

uliginosa R. diffusiflora, foliis sepius oblongis integris, spicis terminalibus tetra-
gonis in. Suppl. p. 290. F.V. pag. 576

Habitat in agris ongrateis Tranquebar vilyatisima

Caulis herbaceus erectus, glaber rami oppositi patentes pinnis
subterputi simplicissimis. folia lineari oblonga ve ovata
avenia cernua integerrima semipollucina. Spicae squa-
pillares anguste imbricate. bractea oblonga villosula
calycis lacina subulata. Corolla bracteis parum longior capsula
capsula lineari calycis longior polypetala, retinacula non vi-
di. an capitul hujus generis

Tentaculata R. foliis obovatis, verticillis obvallatis spinis inermibus bifurcatis

Lin. am. acad 4. p. 320 *

Euphrasia aënos Plukh. phys. 279. fig. 4

Habitat in India

Caulis herbaceus tetragonus ramis subpubescentibus. Folia tenua, acuta, integerrima. Spicae verticillatae centri spinis filiformibus, flore congestis ramosis simplicibus pulchris pellis longis apice bifidis in mucronem duos divaricatos fessis.

japonica L. foliis ellipticis floribus spicati, bracteis oblongis obtusis Thunb. fl. jap.
pag 254 Len. I. V. p. 76

Habitat in Japonia

Caulis herbaceus tetragonus, fuscus, erectus. Folia petiolata, obtusiuscula
in nervis rima serrata, glabra, patula, unguiculata superiora
sensim minor. Spicae plures terminales, albescens, bracteata
glabra digitales - bracteis integris, imbricatis patulis longitudine
tubi corollae. Corolla limbo aequali campanulata. Thunb.

non vidi 327 44 50

repanda R. foliis lanceolatis obtuse dentatis petiolatis, caule repente Lin. Spec.
pl. p. 886 p. Burm. ind. t. 40 fig. 2 Lin. l. V.

Pinella mollis Rumph. Amb. 6. p. 30. Tab. 13. fig. 13.

Habitat in Java

Caules herbari ~~in repas~~ filiformes, superne ad gemmula ^{inæqualiter} pilis rarioribus ^{copiosius pilosa}
folia petiolata, sesquipollicaria, attenuata ^{dentata} ^{super repanda}, oculo
armata pilis rarioribus. Petioli filiformes subtus pilosissimi. Spica
axillares et terminales pedunculata. Flores oppositi bractea linear
herontibus. Calycis cristati apice pilosi

Eranthemoides R. foliis ellipticis integerrimis spicis terminalibus bracteis
ovato lanceolatis attenuatis

Eranthemum capense, foliis lanceolatis, ovatis petiolatis Linl.

V. Fl. regl. no 14.

Habitat in India orientali

Caulis herbaceus erectus, tetragonus, ramosus. Folia opposita
petiolata, altera parum minore nervosa venosa, glabra
oculo armato pilis substantia folii innati bipollicaria per petio-
lum decurrentia. Spicis terminalibus solitarii bini vel
terni. Flores distantes bracteis pollicariis valde attenuatis
interstitiis congruis. Tubus congruis. Limbus subregularis
laciniis oblongis

Corypholoba R. foliis lanceolatis allepensis crenatis glabris, pinnis
axillaribus subglobosis
Thunberg & Linn.

22 ²⁵ Specimen imperfectum

angustifolia K. foliis linear-lanceolatis, fructibus oblongis, bracteis ovatis hirsutis

Prodr. pag 93.

Habitata India occidentali.

non vidi ~~22 22~~ 40

nepentris? R. acaulis, foliis petiolatis oblongis crenato undulatis, scapis erectis multi
floris. Sw. prod. 93.

Habitat in Hispaniola?

flores & pediculis caulis alternis sessilibus.

Planta papillosa folia v. oblonga unguicularia pilis albis
erectis adpressis. pili copiosi in apice v. petiolis longitudi-
ne foliorum siapi filiformes. altitudine foliorum 3-4
lacinae calycis pubescentes.

vid Plum 4. hinc vult. affinis videtur atque planta distincta a Ruellia
et v. Gerardia Plum. duo species in herb. Anth. vid.