

Puzia

an cum Molvis conjugenda? non requiritur fuf

Caimito Ruizii

Habitat herb. Guaf.

Rami purpurei, apice nigri. Folia quinquepartita: lacini sesqui pollicares;
nervi fide, angusta; pinna obtusa, subtus in ano, laterales bipartite.

Stipula setacea

forte sit nipi varietas palmata

cordata Ruizia

Habitat herb. Gusf.

Rami ciliati, apice incani. Folia 2-3 pollicaria, cordata, elongato-orata
obtusifolia, inaequaliter crenata, quinque nervi, utraque mollia, sub
tus incana, supra nervi incani. Pedunculi angulati, dichotomi, incani.

Luben-folia Prunera

Habitat in Tava herb. Tusc. 5

Rami teretes, cortice cinereo, glabri, ^{atenuata} superne tomentosi. Folia petiolata, alterna,
bi-4 pollicaria, basi ovata, lanceolata, ^{atenuata} ext. trunc. dentato-serrata, supra
nitida, arenia, subtus tomentosa venosa. Racemi axillares & quæflori, bre-
vissimi. Calyx persistens &que partitus, fructiferis laciniis lanceolatis
membranaceis venosis. Stamina plura. Germen bispitum. Stylus 1.

Cordata Rupea foliis cordatis oblongo-acuminatis sinuato-crenatis incanis
subtus pulverulentis. Cav. Dis. 3. p. 117. Tab. 36 fig. 2.
Habitat in ca. p. Brousson.

non vidi

Lobata Ruizia foliis superioribus cordatis, inferioribus ^{inæqualiter} crenatis ^{subtus}: inferioribus
4 in f. quinquelobis, lobo medio productione Commerson
Ruizia lobata foliis cordatis crenatis, 3-5 lobatis oblongis; lobo medio
productione acuminata Cav. des. 3. pag. tab. 36-fig. 1
Habitat in Insula Bourbonia & Juspeu

Rami teretes inferne cortice nigro glabro, superne incani.

Folia versus apices ramorum approximata, parva, petiolata.

Superiora cordata elongata 4. pollicaria supra leviter

prospertum costa
et nervi

canescentia, [†]subtus mollissima utriusque Petioli incani
folio dimidio breviori. Pedunc. cymæ axillari trifido pedun-
culi solitarii petiolo longiori incani. Stipula setacea

palmata R. foliis palmato quinquelobis laciniis subsinuatis papiraeque
reticulatis subtus tomentosis

Riviera palmata foliis utraque incanis, palmatis incisive quin
quepartitis lobis acuminatis, sinuato-crenatis, medio pro
ductiore Cavan. Pous. 3. pag. 37. fig. 1

Habitat in insula Bourbonne 3. Hispan

Rami superne tomentosi. Folia petiolata ²⁴ polliciana, septem
nervis venosa laciniis subincisive vel repando ~~sub~~ ^{vegeto} sub
sinuatis, subtus mollissima. stipula sessile setacea.

Pedunculi axillares.

varietas foliis profundius sectis laciniis angustioribus pinnatis
trifidis.

Caeniata R. foliis septempartitis lobatis anguste pinnis lineari-bus pinnatis
fid. v. pinnulis decurrentibus Cavan. *Disf.* 3. p. 119. t. 37. fig. 2.
Habitat in insula Bourbon 5

non vidi