

Rumex

hermaphroditis: valvulis grandispermis

1. patens R. floribus hermaphroditis valvulis integerrimis; unica granifera, foliis ovato lanceolatis
2. sanguineus R. valvulis integerrimis unica granifera, foliis cordato lanceolatis undulato serratis
3. vesicillatus R. valvulis integerrimis omnibus graniferis, foliis lanceolatis vaginis cylindricis
4. britannicus R. valvulis integerrimis omnibus graniferis, foliis lanceolatis vaginis obsoletis
5. maritimus R. valvulis fetuoso dentatis, omnibus graniferis, foliis linear lanceolatis undulatis
6. aegyptius R. valvulis trifido fetuoso unica granifera, foliis planis
7. persicarioides R. valvulis dentatis apice sulci lateris omnibus graniferis, foliis lanceolatis utrinque acutis
8. dentatus R. valvulis dentatis apice lanceolatis omnibus graniferis, foliis lanceolatis basi rotundatis obliquis
9. divaricatus R. valvulis dentatis graniferis, foliis cordato oblongis obtusis pubescentibus
10. acutus R. valvulis dentatis graniferis, foliis cordato oblongis acuminatis
11. crispus R. valvulis integris, foliis lanceolatis undulatis

12. paleidosus R. valvulis integris graniferis, foliis cordato lanceolatis obtusifoliis,  
 verticillis distinctis foliis subjectis.
13. hydrolopathum R. valvulis integerrimis graniferis, foliis lanceolatis glabris ac-  
 tis integerrimis basi attenuatis.
14. obtusifolius R. valvulis dentatis graniferis, foliis cordato oblongis obtusifoliis  
 crenulatis.
15. pulcher R. valvulis dentatis: subnuda granifera, foliis radicalibus paniciferis  
 rubris.

xx hermaphroditi: valvulis granulo saepebentis: nudis

16. bryobalonis R. valvulis dentatis pedicellis incrassatis planis reflexis, foliis lanceolatis  
 integri
17. aquaticus R. valvulis integerrimis, foliis inferioribus cordato lanceolatis, floralibus lineari-lan-  
 ceolatis.
18. lunana R. foliis subcordatis, caule fruticoso, paniculis oppositifoliis
19. vesicarius R. floribus geminatis, valvulis orbiculatis magnis membranaceis, foliis cordatis  
 integris, caule herbaceo
20. roseus R. floribus distinctis, valvulis emarginatis magnis membranaceis reticulatis, foliis  
 laciniatis margine planis
21. tingitanus R. floribus distinctis, valvulis orbiculato-reniformibus integerrimis, foliis opposi-  
 ovatis erosis
22. luxunans R. foliis cordato laciniatis, caulibus decumbentibus angulatis

22. *Pectatus* R. foliis cordato-hastatis integerrimis
23. *Digynus* R. floribus digynis, foliis reniformibus  
 24. *anifolius* R. foliis omnibus petiolatis cordato-hastatis, auriculis simplicibus divaricatis, caule suffruticulis
25. *Allionii* R. foliis sagittatis oblongis obtusis
26. *diplois* R. floribus hermaphroditis sterilibus foemineisque: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtusis rugosis.
27. *Spinosus* R. floribus axillaribus sessilibus; calycibus foemineis monophyllis: valvulis exterioribus reflexo-uncinatis
28. *tuberosus* R. foliis lanceolato-sagittatis, ramis patentibus
29. *multipedus* R. foliis hastatis auriculis palmatis.
30. *aestosa* R. foliis oblongis sagittatis
31. *aestofella* R. foliis lanceolatis hastatis
32. *aculeatus* R. foliis lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis: valvulis ciliatis
33. *bipennatus* R. foliis bipennatis
34. *diffusus* R. foliis cordato-hastatis angulatis diffusis: valvulis exterioribus subulatis interioribus orbiculatis

*tuberosus*  
*crassifolius*

Lumbriatus Rumea foliis sagittato oblongis undulatis. auriculis subbifidis atte-  
nuatis

Habitat in Hispania &

Caulis plures, pedales et ultra, <sup>penna aeneo-purpurea crassiores</sup> sulcati, angulati, glabri, simplices.  
Folia inferiora petiolata ~~et~~ sagittata bi- & tri-pollicularia, superiora  
sagittata. Lacinia pinnula sagittata-lacinolata, omnia crenata  
crassiuscula, undulato-crenata, acuta, venosa, glabra acuta  
primum subciliolata, demum basi planiora, lacina auriculom-  
bata terminata. Panicula terminalis, patens: pedicelli capilla-  
res, seticillati. Calycis foliola oblonga, obtusa, margine albidiora  
absque granulis, juniores purpureas eas  
marem tantum vidi

nope tuberosum collocatus

palustris. Plumet valvulis canaliculatis graniferis, basi dentatis, foliis lineari lanceolatis, verticillis distantibus Smith. Flor. Brit. pag 394

Hydroclapathum minus Lob. in. 2 Pl. Ger. emac. 389

Lapathum aquaticum, luteolo folio Boerh. Mus. 7. 104

Plumet maritimum, β. Curtis fl. Lond. fasc. 3. 7. 23.

Habitat in paludosis, fossis et rivis humidis &

Caulis sulcatus, scaber, rubicundus. Tota acuta; radicalia maxima. Verticilli undique sparsi, foliosi. Valvulae <sup>oblongae</sup> omnes granulatae, basi utrinque indentatae, dentibus setaceis, multis brevioribus quoniam in maritimo Smith. l. t.

20.21 neo vofus Rumex, floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis oblongis tri-nerviis

Rumex persicarioides, floribus hermaphroditis, valvulis integris nudis, foliis oblongo lanceolatis Boiss. Deser. pag 76. n. 41

Caulis Caulis suffruticosus. Rami teretes, florati; articuli apertis fuscis, pollicariis

Totia Totia pedicellata, oblonga, suprema lanceolata, <sup>omnia</sup> acuta, integerrima, glaberrima, crassa, arena, tri-nervia, glauca, pollicaria et ultra.

Petiolus longitudine foliorum

Stipula membranacea, vaginantes, truncata

Panicula ~~reflexa~~ terminalis. Pedicelli capillares, sub flore incassati, fructu longiores. Semen valvulis orbiculatis, glabris, integerrimis, nudis, calyce

~~reflexo~~

Calyx reflexus

Semen valvulis orbiculatis, glabris, integerrimis, nudis

patentia ~~Rumex~~ floribus hermaphroditis valvatis integerrimis; unica granifera  
foliis ovato-lanceolatis. Lin. S. V. p. 346

Lapathum sativum God. pempt. 648.

Lapathum hortenfe, folio oblongo sive secundum Dioscoridis Bauh. Pin. 114.

Habitat in Italia 7

Colica femoralia sagittata, ut in Pr. acetosello Lin.

1  
in herb. non adest

Languineus Rumex valvulis integerrimis unica granifera, foliis cordato lanceola-  
tis undulato-crenulatis An. s. v. p. 346.

Lapathum rubens Dod. pempt. 639. Cam. Epit. 229.

Lapathum foliis acute rubente Bauh. pin. 115.

Habitat in Virginia ♂

Caulis bipedalis samopus. Folia brevia petiolata glabra, venis fere succo  
sanguineo. Racemuli laterales et terminalis pollicares retror.  
valvula exterior floris grano magno globoso rubro notata,  
varius et altera grano minore



egyptius Rumex valvulis trifido peltatis unica granifera, folio planis

Lapathum egyptiacum annuum, peltatis foliis, capsula seminis  
longius barbata Till. p. 43. t. 37. fig. 1.

Rumex floribus hermaphroditis, foliis oblongis, valvulis dentato peltatis  
longius formis Wachend. Ult. 391.

Habitat in egypto ☉

Caulis decumbens inferne ramosus facie R. maritimi ut facile confundi  
tur. Ad folia longiora et latiora, margine plana, ciliis valvularum  
longioribus, granis <sup>unica</sup> <sup>no</sup> <sup>is</sup> magno globos notata.

*puleher* *Rumex floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: subulatis granifera, foliis radicalibus panderiformibus* Hall. emend. 20 Willd. illust. 5. t. V. p. 347. Lin. Spec. 4774

*Lapathum puleherum bononense sinuatum* Bauh. h. 2. p. 980. Raj. hist. 174.

*Lapathum arvense subulatum, folio retuso, caule longius brachiato* Tili. p. 93. t. 37. f. 2.

Habitat in Anglia, Gallia, Italia & <sup>neq</sup> Dedit Desfont

Folia caulina latentibus non sinuata, ovato-oblonga, integra. Rami floriferi recurvati. Calycis valvula dentata, apice obtuso; hanc exterior granulum gent; reliqua vero granulum obsoletum habent hinc

Caulis sulcatus, angulatus, glaber. Folia radicalia panderiformia, ramorum lanceolata

verticillatus Rumes flombus hermaphroditis valvulis integerrimis omnibus graniferis, folis  
lanceolatis vaginis cylindricis Lin. S. V. p. 346.

Lapathum aquaticum, foliis longis angustis acutis, flombus ad genicula  
verticillatim congestis Gron. Voy 39.

Habitat in Virginia 7

non vidi

Britannica Ranunc flonbus hermaphroditi, valvulis integerrimis omnibus graniferis,  
foliis lanceolatis: vaginis obsoletis Len. spec. pl. pag 476 \* S.V. pag 346.  
Lapathum foliis longis latis vix acuminatis costis caulebique rubentibus,  
radice intus crocea Gron. Virg 39

Habitat in Virginia 4

Stipula in R. verticillato cylindrica membranacea fere ad medium  
vaginam internodiorum, in hac vero ut in Europaeis. Pedicelli in <sup>vesti.</sup> ynoni  
et in hoc, in hac capillares; vesti: magis speciosa hoc magis panicula  
ta

conglomeratis R. vulvis integerrimis oblongis, foliis lanicolatis  
subundulatis Roth fl. ger. 1. p. 160

michi ignotus

*Crispus* *Rumex* *salvulis* *integris*, *foliis* *lanceolatis* *undulatis* *Lin.* *V.* *p.* *346*

*Lapathum* *acutum* *crispum* *Tabern.* *v.* *436.*

*Lapathum* *folio* *acuto* *crispo* *Bauh.* *Pin.* *115*

Habitat in Europa humosi &

Caulis erectus bipedalis. Folia floralia anguste lanceolata bipollicaria  
margine undulato-sabra. Racemuli pedalis. Racemuli erecti folio  
florali breviori

granula valvulani potius in fructu maturo conspiciendo quam in flore.

lex exemplar melius pro herbario et quomodo folia infima

paludosis Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis cordato  
lanceolatis obtusiusculis, verticillis distinctis foliis subpetitis Hort. kew. 1. p

482

Rapathum aquaticum minus Bauh. hist. 11. p. 987?

Rapathum angustifolium non crispum Ray. Syn. 141.

Rapathum petiolis cataphractis, foliis longe lanceolatis, floribus verticilla  
tis semiofis Hall. herb. 1590?

~~Habitat in Angliis paludibus et ad ripas fluviorum. 4~~

~~Rauto quodam~~

Rumex paludosis floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis  
ovato-lanceolatis acutiusculis Huds. flor. Angl. 1. p. 154 \*

Habitat in Angliis paludibus et ad ripas fluviorum 4

Caulis quadripedalis, striatus ramosis: Ramis erectis. Folia radicalia ovata  
obtusiuscula, subrenulata: caulina subrenulata, plana, nuda,  
petioli brevibus. Nipula vaginans membranacea Huds. l. c.

bipinnatus ~~Racemus~~ floribus bipinnatis divisis, folus bipinnatis Lin. Suppl. pag  
211. \* L. V. 340.

Habitat in Marocco 4

Caules spithamei ascendentes, laxes. Folia cordata bipinnatifida; laciniis fere ad costam distinctis, singulis pennatis s. dichotomis. Stipulae membranaceae, diaphanae, albae. Racemus terminalis, compositus: racemulis simplicibus. Calyx obtusus Lin. h. c.



~~Hydro~~  
~~Hydro~~ Lapathum Rumea florum valvulis integerrimis graniferis, foliis lanceolatis  
glabris acutis integerrimis basi attenuatis Hort. Kew. 1. p. 483.

Rumea palustris Tray.

Lapathum sibiricum Dod. in Descriptione cum Hydro Lapathum  
Lusaeci: Bauh. in Pinac.

~~Hydro~~ Lapathum magna Ger. em. 389.

Lapathum aquaticum foliis cubitatis Bauh. Pin. 116.

Lapathum maximum aquaticum f. hydro Lapathum Bauh. Hist. 11.  
p. 986. Tray. Synop. 146.

Lapathum foliis longe lanceolatis, paniculis densissimis Hall.  
Hist. 1500.

Rumea hydro Lapathum floribus hermaphroditis: valvulis integris  
graniferis, foliis lanceolatis acutis Hudf. fl. Angl. 1. p. 154.

Habitat in paludibus et ad ripas fluviorum Europa 4

Hydrotopos: La Marthini } herb. L. M.  
longi cornuatus Rothii }

non vid.

*Lactonius* valvis integris, foliis caulinis petiolatis late lanceolatis  
radicalibus spatulatis Forst. descr. pag 269

michi non notus

<sup>undulata</sup> <sup>foliis</sup>  
~~Craspifolia~~ Rumex valvulis integerrimis omnibus graniferis lanceolato-cordatis  
basi undulatis

Habitat in caput. b. spec.

Caules sulcatus ramosus, glaber. Folia ~~pet~~ breviter petiolata palmata  
craspifolia lobata, ovata. Racemi compositi ~~erecti~~ Valvulae granis  
magnis.

25 cum foliis inferioribus separantur diagnosi forte minus bona a reliquis tamen di-  
versitas videtur eadem videtur ac lanceolatus Thun

Canicollatus R. foliis lanceolatis reflexo marginatis, caule  
angulato. Thunb. prod. pag 67.  
Habitat in Cap. b. frei

~~Linnaeus~~

acutus Rumex valvulis dentatis graniferis foliis cordato oblongis acuminatis

Lapathum acutum f. oxylapathum Lobel. ic. 204. Bauh. hist. 2. p. 983.

Lapathum folio acuto Bauh. Pin. 115.

Habitat in Europa sulculentis

10 ut minus desinibenda spec. herbani nil valet

obtusifolius *Prunex* valvulis dentatis graniferis, foliis cordato oblongis obtusifoliis  
crenulatis Lin. s. V. p. 347.  
*Lapathum* Cam. epiti  
*Lapathum* folio minus acuto Lobel. Ic. Bauh. Pin. 115  
*Lapathum* vulgare folio obtuso F. B. Ray hist. 175.

Habitat in Suedia, Germania Helvetia, Gallia &  
Valvularum dentes utrinque plures, inaequales longitudine diametri ipsius valvulae  
to Lin.

multifidus Rumex floribus dioicis foliis hastatis, auriculis palmatis L. S. V. pag. 340

Cicuta minor erecta lobis multifidis Boic. musc. p. 164. t. 12 b.

Habitat in Alpibus Calabriae, Aethiopiae, Orientis &

polygamus. Rumex hermaphroditis et masculis: saliculis graniferis: foliis obovatis  
et carnosis integerrimis Caran. v. 1. pag. 15. Tab. 22.  
Habitat in Canariis 7



*Spathulatus Rumer* folus obovatis obtusi, & alveolis graniferis  
Thunb. prodr. pag. 67.  
Habitat in Cap. b. frei.

*Di. variegatus* Aumer valvulis dentatis granifera, folus cordato oblongis obtusis pube  
scentibus Lin. l. V. p. 346  
*Lapathum arvense subhirsutum*, folio retuso, caule longius brachiato,  
capitulo seminis crenata Tull. Pl. 93. t. 37. fig. 2.  
Habitat in Italia O

non vidi

Dentatus Rumex floribus hermaphroditis: <sup>apice lanceolatus</sup> valvulis trifido setaceis dentatis omnibus graniferis, foliis lanceolatis <sup>basi rotundatis oblongis</sup> ~~Mont 226~~ L.V. p. 346.

Lycium egyptiacum, capsula seminis alba et crenata Dell. Elyth. 191. t. 158. f. 191.  
Rumex dentatus floribus hermaphroditis, valvulis setaceis omnibus graniferis, foliis

+ lanceolato-hastatis undulatis Murr. Comm. gotth. 1774. p. 46. t. 10.  
Habitat in Aegypto O.

Caulis erectus, scapus teretiusculus, basi ramosus. Folia lanceolata, petiolata, obliqua. Flores conferti, laterales. Calyx patens: Valvula floris omnes grano orato albo, et margine dentibus utraque duobus lanceolatis, minime valvula longioribus aut setaceis.

Distinguitur caute a R. egyptio inprimis valvularum floris dentibus minime setaceis; a R. persicarioide valvularum apicibus lanceolatis, nec subulatis. L. Similis persicarioide.

+ Rumex dentatus, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis omnibus graniferis, foliis lanceolatis L. Mont 226\* L.V. p. 346

Socius R. maritimi. Caulis ramosus, teres, glaber. Folia petiolata pollicari, lanceolata, acuta, glabra. Flores verticillati: subulati, duo graniferi herb. Desfont

persicanioides Rumex vulvulis dentatis apice subulatis. omnibus graniferis foliis lanceolatis utraque acutis

Rumex persicanioides, floribus hermaphroditis. vulvulis dentatis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis h. Spei. pl. p. 477. \* S. V. p. 346.

Habitat in Virginia O

Planta perithamsea remotissima. folia petiolata, ovata, undata, integra  
Flores verticillati. Vulvula dentibus utraque tribus longis, omnes tubo  
granis pallidis magnis b. l. c.

*Rumex maritimus* valvulis fetacis dentatis omnibus graniferis foliis <sup>linearibus</sup> lanceolatis  
undulatis.

*Lapathum acutum* minimum Lob. ic.

*Lapathum* minimum Bauh. Pin. 115

*Anthoxanthon* Bauh. hist. 2. p. 907.

*Lapathum aquaticum*, angustifolium acuminato folio Boer. musc. p. 132  
t. 104.

*Rumex maritimus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis,  
foliis linearibus Len. l. v. p. 346

Habitat in Europa littoribus maritimis

Caulis digitalis vel ultra, simpliciter ascendens a basi fere usque ad apicem  
floriferus. Folia pollicaria linearia lanceolata in petiolum atten-  
nuata. Flores verticillati conferti interpositis ad singulum verticil-  
lum folium linear. grana valvularum oblonga fetu breviora  
quam in aegyptiaco

*Saxifraga Rumes* foliis cordato hastatis integerrimis ?

*Oxalis rotundifolia* Scop. pempt 649.

*Acetosa rotundifolia* Kochenjs Bauh. Pin. 114. Monj. h. 2. p. 58. f. s. t. 20. fig. 9.

*Rumex fruticosus* glombus hermaphroditi, foliis cordato hastatis caule tereti Lin. S. V. p. 347  
B. *Acetosa fruticosa repens* Bauh. prodr. 55. Pin. 114.

Habitat in Helvetia, Galloprovincia inter acervos lapidum &

Caulis pedalis simplex basi <sup>prostratus filicatus</sup> flexuosus. Folia inferiora subcordata obtusa inf  
superiora hastata acuta, omnia glauca viridia crassifolia nervosa.  
Pedicelli quadriflori s. ad singulum verticillum remoti. Bractea minuta.

glauca Rumes

Rumes glauca Jacq. coll. t. p. 63.

Habitat. 2

Caules plures debiles subpedales erecti et decumbentes teretes, graciles  
uti tota planta glabri. Rami axillares. Folia hastato cordata  
latiora quam longa, acuta integerrima crassula, glauca longius  
petiolata. Racemi terminales aphylli. pedicelli aggregati 2-4  
valvula integerrima, grandaeffigata. flori omnes hermaphrodi-  
ti Jacq.

non vidi

Cunaniæ Rumer foliis subcordatis, caule fruticoso, flori Paniculis oppositifoliis.

~~Cunaniæ magorum~~

Acetosa arborescens, subrotundo folio. Pluk. Alm v. 1. 252. fig 3. Ray.  
herb. t. 3. p. 116. pl. 4.

Rumer Cunaniæ floribus hermaphroditis. valvulis lobatis, caule arboreo,  
foliis cordatis Len. l. V. p. 347.

Habitat in Canariis <sup>insularibus</sup>.

Caulis oryxalis ramosus. Rami striati. Folia <sup>postrigana</sup> superne ovata, vel  
subcordata obtusa, crassa, venia plana. Ripula vaginante.

Panicula ramis flexuosa. Flores solitarii vel plerumque gemini minus  
quam in separio.

fimbriatus La Martini vel nisi sanctus hujus videtur herb. L. Mart.



aquatius humer valvulis integerrimis, foliis inferioribus cordatis lanceolatis  
floralibus linear-lanceolatis

Rumex palustris Trag.

Hippolathum Dalech. hist. bot. Cam. Epit. 232.

Lapathum palustre Tabern. Ic. 437.

Lapathum aquaticum folio cubitali Bauh. Pin. 116.

Rumex aquaticus, floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis  
foliis cordatis glabris acutis Lin. h. v. p. 347.

Habitat in Europa ad ripas fluviorum et paludum  
Caulis saepe crassus striatus glaber. Folia radicalia et inferiora caulis  
cordata et attenuata, plana glabra acutiuscula, spithamea.  
Racemus terminalis decompositus erectus interspersis ad basin  
pedunculorum foliis brevis petiolata bipollicaria et ultra angusto  
lanceolata. Flores verticillati

alpinus Rumes floribus hermaphroditis sterilibus femineis que, valvulis integerrimis nudis, foliis

cordatis obtusis rugosis Lin. - I. V. p. 347

Lapathum rotundifolium Clus. hist. 2. p. 64.

Hypocapathum hircanum rotundifolium fr. montanum Baub. pin. 115

Lapathum solo floribus hermaproditis masculis, inferioribus femi-  
nis foliis cordatis Fern. Gott. 30

Habitat in Helvetia, Gallia australi &  
Satura et magnitudo Rhei, rugosa. Lin

tingitanus Pumea floribus hermaphroditis distinctis, valvulis orbiculato-  
uniformibus integerrimis, foliis hastato-oratis erosis.

Lapathum mantemur foliosum Bauh. Pinod. p. 56. Pin. 116.

Acetosa sesiviana longitana perennis repens, foliis longis sinuatis Monf. h.  
2. p. 503. f. 5. t. 20. fig. 23.

Pumea tingitanus, floribus hermaphroditis distinctis, valvulis cordatis obtusis  
integerrimis, foliis hastato-oratis erosis Lin. spec. pl. pag. 479 \* L. V. p.

347

Habitat in Hispania, Barbana in arenosis ad littora maris &

<sup>pedales</sup>  
caulis basi ramosi decumbentes, demum ascendentes, crassitie sive penna  
arsenno, glabris, striatis. Folia petiolata, sesquipollicaria superiora mi-  
noribus hastato-~~pro~~ variis laciniata, acuminata, inferiora et summa  
minora <sup>divisa</sup> profertim in planta novata & florente, intermedia unguis  
sum femina matura sere pennatifida, laciniis obtusis extropsum lathori-  
bus sive longitudinallyter incisae. ceterum omnia crassiuscula, glauca  
avenia, margine undulato siabu. Flores verticillat stipulo membra-  
naceo vaginantes, hyalinae oblique truncato. Flores verticillati penduli  
5-6. pedicellis capillariis. Bracteae lanceo-orato lanceolato acuminato  
~~flores~~ alternae solitariae ad singulum verticillum floribus duplo  
longiores. Valvulae seminaequilares venosae.

aureus R. v. alvi in Tegerni mo lineantibus foliis ellipticis  
floribus subdodecagynis Reyn. aut. Laupm. 2. p. 61

non vidi

*vesicarius* Rumes floribus geminatis, valvulis orbiculatis magnis membranaceis foliis  
cordatis integris, caule herbaceo.

*Acetosa americana* foliis longissimis pediculis donatis Bauh. prod. 54.  
Pin. 114. Monf. h. n. p. 583. fig. 5. t. 28 fig. 7.

*Rumex vesicarius*, floribus hermaphroditis geminatis: valvulis omnibus  
maximis membranaceis reflectis, foliis indivisis Lin. S. V. p. 347.

Habitat in Africa ☉

Caules laxi ramosi sulcati. Folia ovata, vel cordisubcordata, margine  
obscure undulata pollicata et ultra, obtusa cum mucrone venoso.  
A bractea minuto ovata. Valvula orbiculata utraque emarginata  
venoso reticulata, binae semper flores semper bini ad singulum verticil-  
lum in Racemo

roseus Rumex floribus distinctus valvulis <sup>emarginatis</sup> magnis membranaceis reticulatis, foliis  
laciniatis margine planis

Cicetosa aegyptiaca, roseo feminis involucrio Shaw afr. 5. fig. 5.

Rumex roseus floribus hermaphroditis distinctis: valvula alterius ala  
maxima membranacea reticulata, folius erosus Lin. Spec. pl. p. 480 +  
L. V. p. 1347.

Habitat in Aegypto O. Des. font.

Similis tingitans foliis craspedibus margine minime undulatis, bracteis  
brevioribus valvulis purpureo reticulatis (dentulatis? in foss. integer  
nimo) basi apiceque emarginatis

Caules basi ramosi, semipedales, adscendentes glabri

bucephalorus Rumer, valvulis dentatis pedicellis reflexis incrassatis planis reflectis, foliis lanceolatis integris.

Acetosa Tertio, vel Acetosa ocyimifolia, bucephalorus Colum. Exphr. 1. p. 151.  
T. 150.

Acetosa ocyimifolia, neapolitana Bauh. Pin. 114

Rumer bucephalorus, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis nudis pedicellis planis reflexis incrassatis Len. L.V. p. 347

Habitat in Italia, Barberia &

Caulis struthemous erectus, inferne ramosis Rami erecti glabri simpliciter. Folia remota, longe petiolata, <sup>ubi attenuata angustiora</sup> nollis anis oblonga, vel lato lanceolata obtusiuscula, <sup>angustiora</sup> avenia. Stipula hyalina amplectentes. Petioli digitiformes folio longiores. Flores terni ad singulum verticillum.

*Digynus Rumer floribus digynis foliis reniformibus*

*Acetosa rotundifolia alpina* Bauh. prod. 55. Pin. 114.

*Acetosa britannica rotundifolia, fructu compresso* Blair oof. 67. t. 67.

*Acetosa repens vestmorlandica, cithlearia foliis nonnihil lacuatis* Pluk. alm.

D. t. 252. fig. 2.

~~*Rumer digynis floribus*~~

*Rumer digynus, floribus hermaphroditis digynis* Lin. L. V. p. 347. Fl. Dan. t. 14.

Jacqu. coll. 2. p. 30

Habitat in alpihus Lapponicis, Helveticis, Vallibus, Pyrenais &

Caules erecti, palmari vel spithamoi, simpliciter basi ad radicem squamis numerosis membranaceis ferrugineis. Folia peleraque radialis longe petiolata, venosa crispipula, puberulata, pollucaria petiolus sive tripollucaris. Racemi compositi. Flo. quadrifida: calyce sephylo, corolla dipetala, Stamina 6. Styli 2.