

Rumex

acetosella Rumer floribus ovicis foliis lanceolatis hastatis lacunatis
indiviso. En LV. pag. 340.

Oxalis minima (Lapatholum) Dod.

acetosa arvensis lanceolata Bauh. Pin. 114.

β. acetosa lanceolata angustifolia repens Bauh. Pin. 114.

γ. Oxalis minima 2. Tabern.

acetosa arvensis minima non lanceolata Bauh. Pin. 114.

α acetosa minor erecta, lobis multifidis Boer. mus. 164. t. 126

Habitat in Europa profluvis et arvis arenosis

Caules simplicissimus, spithamei vel semipedalis. Folia sessilia
angusta medio utrinque auriculo lanceolata horizontali
summa linearia integra. Racemus compositus memuli
patentes.

acetosa Rumex floribus dracoidis, foliis oblongis sagittatis ^{auriculis indivisis} Lin: S. V. p. 348.

Acetosa Brunfels.

Oxalis Dod.

Acetosa pratensis Bauh. Pin. 114

B. *Acetosa* pratensis flore albo Tournef. Inst. 502.

V. *Oxalis* crispata Bauh. hist. 2. p. 990. Taber. Ic. 440.

R. *Acetosa* montana maxima Bauh. Pin. 114. Scheuch. alp. 129.

E. *acetosa* montana, lato anifolio rotundo Boiss. mus. 165. t. 125.

Habitat in Europa pasuis A in Alpibus & in Barbano montibus

Caulis plerum pedalis vel ultra, simplicissimus. Folia oblonga vel lanceolata integerrima obtusiuscula longe petiolata. Summa

lanceolata amplexicaulia. Panicula patens. & differt modo

E. auriculis bifidis ^{auriculis bifidis} ^{lobatis} ^{lobatis} lobatis subulatis ulanicolato subulatis foliis cruris

Thysoides Rumen

Habitat

herb. Desfont.

glaber. Caulis herbaceus, erectus, pubescenter, angulatus, simplex. Folii caulini
simples, sagittati; auricula divaricata, 2-3 pollicaria, remota, a venis.
Salsula emarginata, integerrima

Rumex

Habitat

herb. Paris. herb. Desfont

Caulis herbaceus, glaber. Stipula petiolata, pollicaria, cordato-subrotunda, crassa,
arsenica, glabra, subundulata, suprema sublanceolata. Racemi superne, simpli-
ces, ramo interdum ad basin, Valvula plena cordato-subrotunda, purpureo
venosa, semiconvicularis, absque granulato

6

Rumer limosus Thueller

Habitat inanis herb. Rich.

Stem petiolata lanceolata, spithamea, basi subundulata

verticillatus Rumen

Habitat

herb. Ruth.

Solca petiolata, lanceolata, sive pollicaria, pleno. Pedicelli verticillati.

Bumen

Habitat ad fretum magellanicum Commaison Herb. musci

habes

membranosus Rurce

Habitat herb. La Martini.

Caulis erectus, subsiliato-angulatus. Folia oblonga, petiolata, pollicina; folia superiora lanceolata. Stipula campanulata, hyalina. Flores reflexi.
V. a. Crula hastata

Rumex

Habitat in Cap. bono spec. herb. mus.
Caulis ramosus

Rubus

ant. ant. ius Rumen

Habitat ad fratum magellanicum Commes. herb. 4. usf.

Caeris Rumen. crupi. Caulis erectus, pedalis, crispitie pennis cygneis, striatus, angulatus, glaber. Folia petiolata, radi folia spithamea, caulina minora, lanceolata, crispata, simpliciter venosa, glabra, acuta, per petiolum panum declinata. Petiolus pollicaris: radicalium longior. Stipulae laxae, membranaceae. Pedunculi axillares et terminales. Flores glomerati in spica bipollicari, subcomposita: glomeruli inferiores distantes, superiores conferti.

Cuneifolius Rumex

Habitat in Boemia Pommer. herb. Huf.

Caulis fractus, angustatus, glaber, purpurascens, herba cæcis, ramifer. Folia petiolata, bipollicaria, cuneiformia, basi obscure ~~dentata~~ cordata, crenulata, undulata, simpliciter venosa, glabra. Petioli saepe pollicares. Stipulae membranaceae, tubulosa, demum laevia. Flores in spica, crassa, terminali, basi foliosa, conferti; axillares glomerati in capitulo. Valvula ordo, in tegro, omnes granifera.

anifolius Rumex floribus ^{divaricatis} dioicis, foliis omnibus petiolatis cordato-hastatis: auricu-
tis simplicibus, caule suffrutescente

Rumex abyssinicus Jacq. hort. s. 3. p. 40. t. 93.

Rumex anifolius, caule teri suffrutescente, foliis cordato-hastatis serrulatis
acutis, valvulis nudis integerrimis Lin. suppl. p. 212 * L. v. p. 347.

Rumex anifolius floribus dioicis, foliis omnibus petiolatis hastatis
auriculis simplicibus divaricatis, caule erecto. Hort. kew. 1. p. 407

Habitat in Abyssinia

Caules teretes, fistulosi, glaberrimi glauci, primum ramosi. Folia
longe petiolata, triangulana, obscure serrulata, 7 nervia, acuminata
venosa. Stipulae vaginae oppositae foliis. Paniculae terminales
semina valvulis cordatis, glaberrimis nudis, integerrimis. in herbis
et laes pubescens Lin

*Hydrolapathum Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis graniferis,
foliis lanceolatis glabris acutis integerrimis basi attenuatis Hort. Vind. p. 403.*

Rumex palustris Tray.

Lapathum sativum Dod. ic: in Descript. cum Hippolapathum confusa annot.

Bauh. in Pinac.

Hydrolapathum magnum Ger. em. 309

Lapathum aquaticum folio cubitali Bauh. Pin. 116.

Lapathum maximum aquaticum s: Hydrolapathum Bauh. Hist. 11. p.

906. Traj. Syn. 140.

Lapathum foliis longe petiolatis lanceolatis, paniculis densissimis

Hall. hist. 15 PP.

*Rumex hydrolapathum floribus hermaphroditis: valvulis indegni
graniferis, foliis lanceolatis acutis Musf. fl. Angl. 1. p. 154.*

Habitat in palustribus et ripis fluviorum Europe 4

alleoni R. floribus divinis, foliis sagittatis oblongis obtusis

Acetosa montana lato an rotundo folio Bord. Mus. p. 165. 7. 125
Capathum strabus separatis, foliis sagittatis, ramis brevissimis
recta divergentibus Hall. hist. n. 1598.

Rumex acetosa L. in Spec.

Rumex crispus All. fl. ped. et m. n. 2040

in prati alpium Italiae et Helvetiae. 7

auriculo foliorum rotundata. folia palmata superiora
sepius. Panicula brevi a nervis distincta speciei

Diffusus Rumex floribus divocis, foliis cordato-hastatis, caulibus angulatis diffusis, valvulis
exterioribus subulatis: interioribus orbiculatis. Lin. Suppl. p. 212 * L. V. 340

Rumex luxurians

Habitat in cap. b. spec. 4

Cauli ramosissimi, pedalis, angulatus, lavis, diffusus. Folia alterna, petiolata,
cordata, ~~hastata~~ acuminata. Bractea intrafoliacea, ferruginea. Panicula
maxima terminalis, divaricata, deconjointa e racemis alternis. Pedicelli
capillares longitudine fructus. Fructus valvulis exterioribus subulatis,
interioribus orbiculatis, lobis lin. l. c.

Cuscutaria Rume* floribus ~~diversis~~ foliis cordato hastatis, caulibus decumbentibus an-
gulectis Lin. Mant. 64* L.V. D. 13. p. 286

acitosa se gojyni folio Boer. mus 165. t. 126.

Habitat in alpihus Bononiensibus 4

Radix filipendula, tuberosa. Caulis (in horto) pedales sesquipedalesve,
prostrati, copiosi, ramosi, pentagoni striati. Folia ambitu cordata,
hastata (figura an maculata) acidissima, margine perspurcanta
undulato, vix crenulato. Differt a R. scutato caule angulato nec
tereti; foliis cordato-hastatis, nec lanceolato-fagittatis Lin

non vid.

alpinus Rumea floribus hermaphroditis sterilibus femineis que: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtusis rugosis

Lapathum rotundi folium Pluf. par. hist. 2. p. 69.

Lapathum hortenfe, latifolium rotundi folium five montanum Baud. Pin. 115. ed. 2.

Lapathum floribus superioribus masculinis, inferioribus femineis, foliis cordatis Tinn. gott. 30.

Habitat in Helvetia et Gallia australi & D.

Caules sesquipedalis sulcatus. Folia longe petiolata spatiosa et magnitudine Rhei, rugosa venosa marginem undulata Petioli longitudine foliorum. Racemi axillares et terminales compositi Pedunculis flexuosis. Pedicelli verticillati plures

Spinosus Rumer floribus ^{axillaribus besplatis} androgynis, calycibus femineis monophyllis: valvulis
exterioribus reflexo uncinatis

Beta cretica, semine aculeato Bauh. prodr. 57. Pin. 110.

Beta cretica, semine spinoso Bauh. herb. 2. p. 9 62.

Habitat in Creta, Barbana @ subdichotomi

Caulis decumbentes ^{per se p. remanens} sulcati, squinodales ramosi, crassitie penna
arsensio rigida. folia cordato-oblonga obtusa, venosa saepe bipol
liciana. Flores ^{remanens} verticillati in difusi ramorum et axillis foliorum
remanens plures androgyni. ^{remanens} ^{remanens} magnitudine fere pisi
Folia radice longe petiolata

tuberosa *Cruciferae* floribus duobus foliis lanceolato-sagittatis, ramis patentibus. *Lin. Spec. pl.* 481*

L. V. p. 340

Oxalis tuberosa *Dod. pempt. bug.*

Acetosa tuberosa *radice* *Baut. Pin.* 114.

Habitat in Italia &

affinis nemum *A. acetosa* ac *f. sp.* hybridis, sed folia hamis posterioribus magis hiantia
et stipula longiores. Radix omnino filipendula. Caulis erectus simplex. folia
acetosa longiora. *Lin.*

glaber R. floribus monachi masculis medio solitariis pedunculatis
femineis est venibus majoribus seplibus forph fl. and p

76

non vidi

pectus. fl. floribus monovis feminis inferioribus. valvis inte-
gris granulato notatis, foliis linearibus pennatis fido dentatis.
Laph. Desp. p. 77.

multifidus Rumer floribus divisis, foliis hastatis auriculis palmatis L.f.v.p. 340
Acetosa minor erecta lobis multifidis Procc. mus. 2. p. 164. t. 126

Habitat in Alpibus Calabria, Aetnae, Orientis &

Varis Acetosa. Caules plures, basi vel basi simplicissimi (vel raris
superne divisi) flexuosi erecti, teretes. Folia pollicaria auriculata
inferiorum 3. 5 fida superiorum simpliciter indivisa lanceolata

Panicula terminalis dichotoma, flores minutissimi

Caulis erectus, teres, striatus, glaber simplex pedalis. Folia petiolata,
lanceolata, basi auriculata 3 fida vel tripartita hastata, intermedia lati-
na longior, saepe semipollicari, extusum ceteris. Lobi laterales lineari-
res, breviores, lateris unica lanceolata, intermedia interdum lineari.
Salsola integerrima. herb. Quos.

Thunbergii
~~Suberectus~~ Rumer folus sagittatis obtusis; caule curvato erecto Thunb- prod.
fl. Cap. p. 67. ~~R. tuberosus~~
Rumer tuberosus Burm. prod. fl. Cap. pag. 11

Habitat in Cap. bono pui

Planta digitalis radice tuberosa. Folia plura radicialia petiolata ovale
cordata, crassa, undulata

Cur. Specimen minus bonum difficile limitis emuntur

Sagittatus R. foliis sagittatis acuminatis, caule flexuoso Thunb. prodr
neg. 67.
Habitat in Q. b. ppe

non vid.

praecula 44. foliis lanceolatis integerrimis, caule fere simplicissimo 4ae yr.
coll. 2. p. 160. pl. rar. ii. Cent. 2. T. 34

non vidi

Ruellia *Ruellia* foliis lanceolatis integerrimis floribus divisis, valvulis nudis, caula
aculeato Lour. fl. Coch. pag 217.

Habitat in Cochinchina

Caulis tripedalis, erectus, Vexi. Folia integerrima, plana, petentia. Flores spi-
cati, Valvula integerrima glabra inermis. Petala vixifera

aculeatus Rumesse flombus dioicis, foliis lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis: valis
ciliatis Lin. Spec. pl. p. 402 * S. V. p. 340

Acetosa cretica, femina aculeato Bauh. Prodr. 55. t. 55. P. 114.

Oxalis minor aculeata Cardis Bauh. hist. 2. p. 991.

Habitat in Creta, Hispania &

similis R. acetosella sed folia basi attenuata absque hamis: florum femi-
narum interior Caliculis ciliatis aculeis minimis

non vid.

Bipinnatus Rumex floribus deorsis, foliis bipinnatis Lin. Suppl pag. 211 & P. V. pag.

340

Habitat in Marisco &

Caulis prostratus, ascendens, loricatus. Folia cordata, bipinnatifida: laciniis
sepe ad costam distinctis, singulis pennatis s. dichotomis. Stipulae mem-
branaceae, diaphanae, albo. Racemus terminalis, compositus: racemulis
simplicibus. Calyx obtusus & c. c.