

# Ruscus

1. aculeatus R. foliis <sup>oratis pungentibus</sup> supra floriferis nudis
2. atypophyllum R. foliis subtus floriferis nudis
3. Steppoglossum R. foliis subtus floriferis sub folio
4. androgynus R. foliis margine floriferis
5. racemosus R. racemo terminali hermaphroditeo

volubilis Rufius volubilis, folus ovato-oblongis multinerviis Thurb. prodr.  
fl. cap. pag. 13  
Habitat in C. b. p. i.

non vid.



reticulatus. Rusf. scandens foliis ovatis multinerviis reticulatis, floribus  
pedunculatis solitariis. Herb. p. 1000 fl. cap. pag. 13  
Habitat in Cap-b. spec.

non vidi

1 aculeatus R. foliis supra floriferis nudis len. L.V

Rufum Dod. pempt. 744.

Rufus Bauh. pin 470

Habitat in Gallia, Italia nemorosi appeni &

glaber. Rami sulcati angulati saepe verticillati terni rigidi.  
Folia sessilia alterna ovata, integerrima multi nervia spina  
nuncupata terminata unguiculari flos sessilis in medio  
folii absque foliolo.



~ Hypophyllum B. foliis subtus floriferis nudis. Cen. S. V  
Laurus alexandrina, fructu folio infidente Bauh. pin.  
305.  
Laurus alexandrina, Chamodaphne Col. Ceph. 1. p. 164. T. 165.

Fig. 1.  
B. Rufus latifolius, fructu ex medio foliorum extra pendens  
de Hill. Elth. 333. T. 251. Fig. 303.

Habitat in Italia ad latera collium 2

Caulis angulatus glaber. folia terna vel alterna lan-  
ceolata elliptica utraque attenuata subpetiolata  
bis/tripolliciana integerrima glabra. folium nullum  
se flores stipula subulata in membranata ad basin  
petioli extus

3 Hypnogladium Rafinesquii sub folio Lin. S. V  
Laurus alexandrina, fructu pediculo infidente Bauh. pin. 304  
Hypnogladium Diofionidis; Laurata Plinii Col. Ephr. 1.  
p. 166. v. 165. fig. 2.

Habitat in Hungaria, Regia, & talis montibus umbrosis &  
glaber Caulis fructus sesquipedalis simplicissimus angulatus crispata  
pennis arserina. Folia petiolata, alterna lanceolata  
elliptica. utrinque attenuata integerrima palmata  
nervosa stipula est ad dorsum petioli oblonga. Flores supra  
medium folii 3. 4. 6. femore pedunculati uniflori folium  
lanceolatum petioli brevior ad basin gemmae florum



4 Androgynus R. ~~versus~~ foliis margine floriferis Lin S. V  
Rupis latifolius & foliorum sine florifer et ballifer Dill.  
Eth. 332. V. 250. fig. 332.

Habitat in Canariis

glaber. obscure angulatus. Folia alternis sessilibus  
ovata attenuata ~~nerve~~ <sup>multis nervis</sup> nervi geminis majoribus  
ad marginem ubi flores inferius et cuneatis. ~~et~~ <sup>et</sup> ~~inferius~~  
solum ~~et~~ versus medium ad marginem ~~ad~~ <sup>interdum</sup>  
ab uno latere semel vel bis interdum utrinque corda  
t~~er~~ <sup>er</sup> sine florifero flore pedunculati 5 que 6-8 pedun  
culi uniflori flores majoresque in reliquis

5 racemosus R. racemo terminali hermaphroditico. Spei: pl. p. 14757  
Laurus alexandrina angustifolia ramosa, fructu ad extremum ra-  
moso Monf. herb. 3. p. 541. fig. 13. + 5. fig. 14.

*Att abutal*

affinis habitu medeola.

caulis angulatus glavis, uti tota planta glaber ramosus. Folia  
alterna, ~~sessili~~ canaliculata, subsalcata, sesquipedalia, ner-  
vosa, attenuata, petiolo brevissimo cincto. Racemi  
ex apice pauci flori