

Ruyfichia

Cal. 5-phyllus, bractea clavata subpecta. Cor. reflexa. Stylus nullus. Fructus poly-
spermus

1. Clusiofolia R. foliis obovatis integris acuminatis: floribus bractea solitarii
2. Senoubea R. foliis obovatis emarginatis, apice dentibus latius venosis, floribus
bractea tripliciter

Souroubea Clusia Keysseria foliis obovatis emarginatis, apice dentivula
tis venosis; floribus bracteis tripartitis. *Souroubea* p. 50

Souroubea guianensis Aubl. fl. gu. p. 244 & 244 fig. t. 97.

Habitat in Guiana

arbor, ramis fermentosis. Folia alterna, petiolata, coriacea, glabra

floribus ^{remotis} alternis remotis solitariis. bractea coriacea. Petala

fulpurea Aubl.

91 anno minores Galibi Rich

~~non est.~~

Clusopolia Ruyschii foliis obovatis integris aveniis; floribus bracteis
solitariis. Sw. prodr. p. 50.

Ruyschia Clusopolia Gaerth. Ann. 175. t. 51. 2.

Habitat in India occidentali.

Planta suffruticosa, bipedalis, arboribus parasitica innaevi.
Folia crassa, brevissime petiolata, obtusa, integerrima, nitida,
aveniis, alterna, quoad nervos pollicaria. Stems racemi simplicis
homi, terminalis erecti novem pollicares flores parvi, purpurei.

Gaerth.

~~non est.~~

Secundum Richard et species Mangrove