

Saccharum

repens

Saccharum panicula patula, flocculi geminati aristati, foliis planis,
nervi pilosi Wild. Spec. 1. p. 1. pag. 322

Habitat in Guinea Pert. ?

Culmi inferne geniculati infractis, radiantes, deorsum ascendentes.

Geniculi externi tomentosi. Sagina ore villosa. Panicula patens. Pedicelli
capillares, flexuosi. Arista nulla, valvula altera mucronata

ta. Solia plana

reperio Sacch. panicula patula flexulis geminatis scapulis usque aristatis foliis
planis, vaginis villosis Wedd. Spec. pl. pery 322.
Habitat in Guinea

michi grata

Spontaneum - foliis convolutis, panicula effusa: spicis capellanibus simplicibus,
floribus remotis involucriatis geminatis: alteris pedunculato
Lin. Suppl. p. 106. L.V. p. 103.

Saccharum spontaneum, floribus paniculatis, foliis convolutis
Lin. Mant. 103.

Reyna Rheed. Mal. 12. p. 25. V. 46.

Saccharum biflorum; panicula lanata secundaria, calycibus
unifloris; geminatis cæcis lanatis Forst. Descr. puz. 16. n. 50

Habitat in Arabia et Malabano aqueis
Panicula magna pedunculi recti, immixti longi.

punctatum *P. panicula* laxe flosculis geminis altero pedicellato valvulis
hyalinis basi fuscis foliis planis margine scabris
Habitat in India orientali Konig
Tacei fauchani officinarum vagina ore barbata. Dignoscitur
valvulis longioribus hyalinis basi e femine intus fuscis

officinarium S. floribus paniculatis, foliis planis Linn. l. V

Arundo saccharifera Bauh. pin. 10. Sloan panthe. 1. p. 100. t. 66

Rumph. amb. 5. p. 106. t. 74. fig. 1.

Habitat in India utriusque loci inundatis

Culmus altus vaginis foliorum tectus. Tectus glaber. Virescitur
vagina striata ore pubescente. folia pedalia et ultra glabra
pollicem lata margine laevi Panicula sesquipedalis. Pani-
cula ramis filiformis. glomuli duo ad pagulum dentem alter filii
alter pedunculatus linearis lanceolatus. Valvulis calycinis pilis
longis albidis apice purpurascens

— margine laevibus

Ravenna. panicula lassa, rachis lanata, floribus anfractis

Arundo calycibus unifloris extus lanuginosis Ger. prov. 105.

Gramen arundinaceum ramosum plumosum album Bauh.
pin. 7. prod. 14. theat. 95. Scheuchz. gram. 137.

Arundo fructa alpeum ravenna Monf. hist. 3. p. 220. f. p. 4. p.
fig. 32. Zanoni. hist. 1. p. 64. & 624.

Andropogon panicula lassa, rachis lanata, flospulo utroque anfra
recta Lea Spec. pl. pag. 1401.

Habitatio Italia

Pulvis erectus glaber altitudine avari - folio 2 ulnas longu
radia cum punctis rubentibus ad basin argentea lanugine adpressis

~~andropogon~~

Specimen herbarii Duboum

Teneniffa Saccharum foliis subulatis planis, floribus paniculatis muticis, involucri
pelofo nullo, calyce villofo fimo Lin. Suppl. p. 106*

Habitat in Teneniffa

Gramen plusquam pedale. Culmus geniculatus: articulis approximatis
foliatis. Folia brevia, recta, subulata plana, glaberrima. Panicula
mediocris, fimitis folio lanato. Valvula calycina ovata, ferruginea,
hirsuta: pilis albis patentibus. Anthera lutea. a reliquis differt caly
ce hirsuto, qui in illis nudus. Caret in involucri glomerulorum, quod in
reliquis constat villis longis, rectis. Glomo hirsutus ovato, nec subula
to ut in S. pentaneoo Lin. l. c.

non vid.

Polystachyon L. floribus paniculatis, spicis filiformibus longis paniculatis
flores remotiusculis Sw. prodr. pag. 21.

Habitat in St. Christoph

Calami glabri. folia convoluta panicula pedalis pedunculata
li. subreticulati basi barbati filiformes a flosculo ad
flosculum flexuosi compressi. flosculi solitarii breves pedunculati
lati lanceolati.

an mea Sw

arundinaceum Sacch. paniculo conferto pedunculis divisi, flosculis geminis sessi-
li pedicellatoque, corollis trivalvibus polygamis herb. obs. 4. p. 14. x
Habitat juxta sepem et ad margines stagnorum Tranquebaria

Pae. Carambu⁹ Tamulis

Culmi 10 pedali⁹ in summo foliis subsessilibus
Folii Sacch. officinarum. Folium convoluta margine serrata
glabra basi intus lanata. 8 flosculi lanceolati apice purpurascens
in his communis et 8 rayon

panicula laxa

foliis serratis

basi intus lanata

Benghalense Sauch. panicula conferta pedunculis divisis, flosculis geminis sessili
pedicellatoque, corollis bivalvatis hermaphroditis Retz. off. sp. 164
Habitat in Benghala.

Similis Saucharo amundenaeo differt corollis bivalvatis - Rhymatibus
fusis flavescientibus. Retz.

fasciculatus. S. racemis fasciculatis, flocculis geminis pedicellatis,
petalis ciliatis, extenombus anfractis, foliis ~~multis~~ serratis

Xu Xu Krompf am. Exot pag 099

Boo Krompf am Ex. pag 099

Pacchimum prolydactylon racemis fasciculatis, petalis
ciliatis extenombus anfractis Thunb flor. jap. pag. 42.

^{exclusiv. lin}
Habitat in Japonia

Rubrum frutescens teres glaber simplex oxygali. Folia
lineari ensiformia striata glabra cinnamomata. Panicula
^{longiusculis}
nodula ramis vel parum ramosis. pedunculi subrecti
ciliati longissimi. pedicelli alternatim gemini. uniflori
pedicello altero parum brevior. Calyx glaber glumoso
cannicolato. antra totidis

elongata. S. panicula ^{flores gemini pedicellati} spicata elongata, foliis convolutis vaginis. ore ^{ulato} barbato.

Habitat in ^{crassitie vix penna columbina} furcata.

Calamus albus ^{vagina glabra striata} vaginatus. ^{attenuata} Colica longa gla-
bra. Panicula pedalis ramis simplicibus pollicantibus lana
alba ^{septa}. Flores angusti lineares.

scutellorum. S. culmo fistuloso simpliciter, foliis longissimis serratis: panicula
fistulata oblonga Lour. fl. Coch. pag 53.

Habitat in Cochinchina.

Culmus: Opesalis perennis rectus, teres, fistulosus, simplicissimus
nudo distansibus. folia subulata glabra. pili corolla parum longioris.

non vidi.

reptans Sauchanum

Habitat

Herb Thonni

Pulmi pedales; inferne ramosi. Vagina striata, et folia, inferne tomentosi. Sola con-
voluta, culmo aeterna. Racemi compositi. Glume hispidescenti, incano, antra
nulla

Holcus potius

La Monte

reptant Saech panicula angustata mutica, folus involuta subulatis, culmo
basi repente prolocifero La Moth T. Enc. pag 155.
Habitat in monte vides
Calys villosus

non vid.

Thunbergii Juch: panicula spicata, floribus diandris, culmi genituli nudi

Folia convoluta Retz. obs. 5. p. 17.

Habitat in India orientali

altius quam procedens Panicula duplo longior lanugo major
flavescenti. Folia nuda. Retz.

novd.

Noenigi *S. panicula* spicata floribus diandris, culmi geniculis
barbati foliis planis Retz. obs. 5 pag. 16

Saccharum spicatum Thuab. fl. Faq. pag. 42

Habitat in Arabia India orientali

Culmi plures pedales simpliciter, geniculi pilis albis barbati.
Folia plurima radicalia 1-2 in culmo glaucis videri
caulina fixa tota vaginantis margine lora glabra. Panicula
bipollicaris cylindrica tota tecta pilis longis nitidis. valvula
calycinis lanceolata stipitata purpurea

uniflori ~~P~~ foliis linear-lanceolatis pedunculis unifloris bracteis brevioribus
Marm. und Tab 21. fig 2
Habitat in India orientali

Saccharum

Venezia Saccharum panicula spicata, floribus candidis, culmi geniculis barbati, foliis planis Petrii obj. 5. pag. 16.

Saccharum spicatum; panicula spicata cylindrica, foliis linearibus Thunb.
fl. pag. pag. 42. fide speciminis a ver. Ell. mis. sum

Lanceolaria D. foliis pinnatis: foliolis ellipticis subtus pubes, fructibus
Lanceolatis Lin. Suppl. p. 316 & t. V. 641.
Noel valli Rheed. Mal. pag. 6. p. 39. t. 22.
Habitat in Ceylona

H. Malab. 6. t. 22
Dahlber.

panicum Saccharum floribus spicatis aristatis, culmo ramosis polystachyo Lam.
Moth. Tab. Enc. pag. 155. Tab. 40. fig. 3.

Habitat in India orientali

Calyx nullus

Petriei Koenigii

herpetum *S. pomicula fricata*: pliculis geminis altero sessili altero pedunculato.
Forst. N. Deser. pag. 153
Habitat in deserto hakenno

non vidi est forte eadem ac honyri Petri specimen.
Lupis enim in Coll. Ross. raveni absque nomine