

Salix

linifolia Salix

Salix pumila linifolia micana Bauh. pin.

Salix pumila pumila parte cinerea Bauh. hist.

Salix pumila angustifolia l. Clus. hist. 86.

Habitat herb. Mus.

Rami glabri, teretes, cortice flavescens, vixat. Folia utraque glabra

*Salix*

*Salix leptanica* *salvia* foliis angustis Fournes. G. B. H. 592.

Habitat in Leptanea herb. Mus.

Rami purpurescentes; glabri: ramuli incanesci-

habes

lineari-folia Salix foliis lineari-lanceolatis utrinque glabris serratis

Habitat in Bononia Comteson. herb. Mus.

Rami frugiles; teretes; purpurascens, glabri, laxes, cortice nigro. Folia  
petiolata, bipollicaria, angusta, attenuata: juniora subtus villosa, state  
nuda. Amenta pollicaria: Stamina duo. Squama villosa. Amenta for-  
minosa fructifera bipollicaria. Capsula breviter pedicellata, ovata, gla-  
bra. Pedunculus inanis.

*Daphnoides salix*

Habitat in Delphinata herb. De font.

Rami teretes, glabri, cortice fusco-purpureo fere, apice villosi. Folia petio-  
lata, pollicaria vel parum ultra, oblonga, utraque acuta, glabra, serrata,  
pubes pallidiora, basin versus parum angustata. Ripula ovata, acuta, den-  
tata.

an S: hastata vel ejus varietas?

*Pentstemon Salix*

Habitat in Delphinatu herb. Desfont.

Ramiteretes, furco-purpurascens, glabri. Folia petiolata, pollicaria, oblonga, serrata, utraque glabra, subtus glauca, venosa, costa subtus purpurascens, apice acuta, basi obtusa.

coepa Salix.

Habitat. herb. Desfont.

Rami glabri, fusco-purpurascetes. Folia petiolata, semipollicaria, oblonga,  
venosa, glaucis-viridia, utraque glabra, acuta, integerrima, venosa. Ameri-  
ca foemina unguiculata

racemosa P. foliis ovato-oblongis serrulatis acuminatis, capulis racemosis  
globosis glabris pedunculis tomentosis

Habitat in India orientali 5

Rami glabri fusi. Folia petiolata, bis 3 pollicaria extros  
sum obsolete serrata. Stipulae nullae. Racemi infra folia  
cuius latic 3 pollicares plerumque



Can<sup>da</sup> 1. Canuosa foliis utrinque tomentosis ovato lanceolatis linc  
62. Cap. 1360. t. 7. f. 7. t. 8. n. 7

Latifolia Salix folus elliptico ovatis extrosum dilatatis

Salix fl. Capp. no 340

Habitat in Lapponia

*Menandra* *S. foliis serratis glabris, floribus triandris* Lin. l. V. Hoffm. Sal.  
tab 9. 10

*Salix foliis auriculato splendens flexilis* Traj. hist. 1420

*Salix folio elliptico - lanceolato utroque glabris serratis  
appendiculatis* Gmel. fib. 1. p. 145. t. 34. fig. 3.

Habitat in Helvetia, Siberia

Cortex cinereus <sup>ramis junioribus glabris</sup> folia subtus glaucescentia, serratura primum obtusa  
deinde emarginata, subglauco obtusa, auriculata petioli venellae  
utriusque parum villosae. Amenta villosa longa laxa

— oblongo lanceolato serratis floribus triandris

~~Menandra~~

*Salix hermaphrodita monophylla* Deoque delicta

*undulata* L.

Erhart.

*nihil ignota*

*S. monandra*, foliis ~~subternatis~~ ~~glabris~~ ~~lineari~~ ~~lanceolatis~~, superioribus obliquis Hoffm. Jac.  
1. n. 1. t. 1. fig. 1. 2. t. 5. fig. 1.

non vid.

pentandra l. foliis serratis glabris, floribus pentandris  
Gmel. fl. Sib. 153. t. 34. fig. 1. T. L. Dan

Salix spontanea folio amygdalino, fragilis non auri-  
to Bauh. hist. 1. p. 214.

Salix pentandra fl. Lapp. 370. t. 2. fig. 3.

Habitat in Europa paludibus montosis, dumis &

Rami <sup>scapulae</sup> <sup>superne</sup> teretes <sup>ovales</sup> flavescentes nitidi. Folia oblonga <sup>acuta</sup> <sup>longiora</sup> <sup>in pollicari</sup>  
interdum basi vixus <sup>angustata</sup>, serrulata. Amenta masculina  
la brevia crassa obtusa. Amenta foeminea angustiora erecta  
~~foeminea~~ pollicaria. Pedunculis utriusque oblongis villosis  
tomentosa incano Capsula glabra

oblongis

phyleifolia L. foliis serratis glabris lanceolatis: crenis undatis lin fl. hap  
357. t. 18. fig. 4. uocq. collect. 2. p. 139

13. Salix foliis serratis glabris oblongo-ovatis lin fl. hap. 35. D.  
tab. 18. fig. 4.

Habitat in Lapponia, Tenmarvua &

Rami glabri interdum superne fibrillosi cortice vespis apicem  
flavescente, sparsi. Folia lanceolata bipolliciana. Amenta  
foemineis crassitie penae cygneae. Pedunculi uti squama & capsula  
unicaro tomentosa.

Isti pulsi interdum semiundata  
Salix appendiculata Villars fl. Delph. tab. 50. fig. 14

an 17. modo varietas

vitellina *S.* foliis serratis glabris cas ovatis acutis glabris: serraturis  
cartilagineis, petioli callosi punitatis Lin. 1. V  
Salix sativa lutea, folio crenato Bauh. pin. 473.  
Habitat in Europa temperata &  
Rami glabri flavescentes. Folia oblonga acuta. glandulae supra  
superne in petiolo. Capsula glabra

varietatem in oriente legit Boiss. foliis ovato lanceolatis <sup>in foliis inferioribus</sup> Lin. in  
acumine longo attenuatis <sup>2.5 pollicibus</sup> petiolo superne utrinque auricula subfolea  
cra parva lanceolata margine glandulosa



amygdalina s. foliis serratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trape  
ziformibus

Rubus folio amygdalino utriusque vixente aucto Bauh. pin. 473.

sci. Praxum.

~~Salsola foliis serratis glabris acuminatis appendiculatis Lin. Pl.~~

restituetur

~~Capp. 349. V.~~

~~Habitu in Europa sylvis~~

~~Rami fusco-purpureo-pescentes. Solia ovata lanceolata alternata  
restituetur elongata 5-6 pollicina. Stipulae semi-orbitales~~

ha stata l. foliis serratis glabris subovatis acutis sessilibus, stipulis subcordatis

Lin

salut foliis serratis glabris subovatis sessilibus appendiculatis  
fl. Capp. 354. V. P. 47. g.

Habitat in Lapponia, Helvetiis

Rami juniores superne incano villosi. Folii breviter petiolate  
juniorum supra saepe costa villosa integerrima, oblonga vel oblongo-  
obovata utraque ad basin petioli usque sine longitudine ovata  
etate serrata. ament masculina villosa. Capsula glabra

tennifolia L. folus serratis obovati subpellucida ex trofum serrata stipulati  
Salix folus serratis glabris reticulatis ovatis in Flor-Lapp.  
no 352. Tab VIII. fig 2.  
Habitat in Lapponia

non vidi

altissimum Cynanchum foliis cordatis oblongis acuminatis utraque <sup>molliter villosis</sup> subtomentosi,  
umbellis laterales pedunculatis.

Cynanchum altissimum: caule volubili; foliis cordatis; utraque tomentosi  
foliis: floribus umbellatis Jacq. Am. p. 406.

Habitat in America meridionali ad v. Koch

Rami teretes, superne tomentosi, cinerei <sup>et ultra</sup>, venosus  
Folia petiolatis, opposita, palmata, cordata, oblonga, acuminata,  
integerrima, utraque villosa, mollia. glandula obscura supra ad  
inflexionem petioli.

Petioli bipollicares; tomentosi.

(Reliqua vide in Jacq. l. c.)

bicolor L.

Eschsch.

michi cypta

fragilis L. foliis serratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis  
Lin. Fl. Lapp. 349. V. D. Sy. D. Spec. pl. p. 1443.

Salix fragilis Bauh. pinod. 159. pin. 474.

Salix folio amygdalino utroque vixente aucto Bauh. pin. 473.  
Lec. Hall.

Habitat in Europa boreali. burt

Rami nitidi stipulis glabris escentibus folia tenuis pice serrulata. Amenta  
mascula obtusa squama oblonga obtusa glabra

Decipiens L. foliis lanceolatis serratis glabris petiolatis inferius  
bus minoribus obovatis reflexis Hoff

lypmnis P. foliis lanceolatis serratis glabris petiolatis, gemmis 2. la

teralibus Hoffm. flor. Dindsch. 1. pag. 343.

Habitat in Germania  
rami fragilibus

mibi ignota

antifebrilis S. folus linear lanceolatis subpetiolatis Schoepf.  
mat. med Amer. p 47.

Habitat in America boreali 5

non vid.



Edulis ~~S. foliis angulatis basi cordatis lobatis, fructu oblongo setosa~~  
~~to Racem. amer. Tab. 163.~~

non vidi

Japonica l. foliis serratis glabris canaliculatis subtus glaucis varionibus  
villosis Thunb. fl. jap. l. V. pag. 279

Habitat in Japonia.

vill non vidi

egyptiaca s. foliis pubescentibus lanceolatis ovatis nudis venosis petiolatis  
simplicibus exstipulatis Lin. Am. scad. 4. p. 295 &

Palaf. s. Ban. alp. Egypt. 61. & 62.

Salix gynaea, foliis olivaceo argenteo Bauh. pin. 274.

Habitat in Egypto

ramisuperne incani folia petiolata quadrupolliciana  
subtus glauca ad costam villosa subacuminata

elleptici

babylonica s. foliis serratis <sup>margin</sup> glabris lanceolatis, ramis pendulis Lin. Spec. pl.

pag. 1443. 4

Garb. arabum Rauw. iter. 103. Salic. app. 30.

Salix arabica, foliis triplicis Bank. pin. 475.

Habitat in oriente

Cortex flos purpurascens. Folia sive vel sexpolluciana bene  
sine petiolo

purpurea L. foliis serratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus oppo-  
sitis. Lin. Spec. pl. pag. 1444\*

*Salix virens nigricans*, folio non serrato Bauh. pin. 473.

*Salix rubra minima fragilis*, folio longo angusto Bauh. hist.

p. 215.

Et habitat in Europa australioribus

Portus quae purpurascens. folia bifida pollicaria angusta  
basi in veris integerrima brevissime petiolata supra veris  
apicem attenuata

Specie cum *Sal. helice* conjungitur ab Hoffmanno sub  
nomine *Sal. nonanda*

*Salix* S. foliis serratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus opposi-  
tis obliquis. Lin. Sp. pl. pag. 1444.

*Salix Helice* Theophrasti Dalech. hist. 277.

*Salix tenuior*, ~~foliis~~ foliis minore utraque glabris fragili  
Bauh. hist. 1. p. 213. fig. 2.

Habitat in Europa Australi ad sepes, locis agris &  
Rami tenuior quam in precedente petioli <sup>ut</sup> laxior foli-  
saepe versus apicem subito decrescenti nec attenuata.

myrsinoides L. foliis serratis glabris ovatis venosis. Gaeger. coll. 2. p. 136

Lin. fl. Lapp. 353. Tab. D. fig. 7. Et. Tab. 7. fig. 6.

*Salix alpina*, foliis angustioribus splendens serratis / cheukra  
N. alp. 340

Habitat in Alpibus Norvegiae, Helvetiae Italiae. 5 onia <sup>longa</sup> ~~longa~~  
Indivisus sesquipedalis Rami gracili fuso-purpurascens fere  
distorti glabri. folia oblonga acuta pollicaria venosa nitida  
nuda anni proteriti anni maridi. Amenta masculina hirsuta  
pollicaria <sup>longa</sup> ~~longa~~ obtusa. foeminea crassiuscula.  
Capsula villosa ~~stata~~ glabra

— oblonga

*Saxifraga foliis obverse ovatis acutis fenatis glabris fl. Ros. v. 1. p. 270 150*  
an *Saxifraga pumila* folio ovali basi fenato Gmel. fl. Sib. 1. p. 160. t. 35. fig. 2.

Habitat in alpibus circa borealem lacum usque in Cant. Jethalshoi  
Vimena erecta vertice perfusa, ramulis annulis brevibus. Folia copiosa exsternu-  
cata, brevissime petiolo acuminata, versus petiolum attenuata, basi que  
subintegra

non vid.



*S. divaricata* foliis ovato-lanceolatis undato-venatis glabris ramis divaricatis  
Fl. Ros. v. 1. p. 2. p. 159.

Habitat in summitate alpium Daunia

Affenis P. phyllis folia

Caudex crassitie digiti a radice dichotome ramosis fuscus, ramis brevissimis  
rigidis divaricatis, terro adpressis, luteo-fuscis. Folia in extremis ramis coe-  
in quibusdam lanceolata, integripinula, in aliis ovato lanceolata, grossius  
venata, venatibus subundatis obtusis, glaberrima, exstipulata  
Amenta foeminea ex eadem gemma ac folia subsessilia, aphylla, vix polli-  
cana, congesta, dense papposa

non vidi

5. Rhamnifolia foliis ovatis obtusis serratis glabris, subtus glaucis Gmel. fl. Sib.  
1. p. 159. n. 13. t. 35. fig. 1. A. fl. 105. 1 p. 2. p. 167.

Habitat in paludibus subalpina Sibina  
Vires vix pedales, radice subramosa. Folia glaberrima, ovata, versus  
petiolum magis producta, apice rotundata, obtuse serrata seu crenulata  
subtus magis minusve glauca

*S. betenifolia* foliis sessilibus ovatis Dentato-serratis venosis nitentibus Pall. ed.  
3. app. p. 759. n. 134 Tab. h. h. f. 7. Gmel. fl. sil. 1. p. 191. t. 35. fig. 3 fl. Prof  
1 p. 2. p. 167. Tab. 82.

Habitata in rupibus calvis montium ex Alpibus in Davia

Truncus prostratus magnitudine Arb. alpini, truncus digitalis cortice luteo. tam  
breviculis tortuose confectis. Vicia in extremis ramis confectissima, parva, ovata, venis  
crassiusculis reticulata, nitidula, rigida, sessilia, per ambitum serrato-dentata: den  
ticulis distinctibus, patensiusculis, acuminatis, inaequalibus. folia perflentia in  
alterum annum. Amenta mascula e gemmis foliaceis antiquis terminalibus  
longitudine folii, tenues, squamis distinctibus, villosis diandris et triandris.  
foeminea folio breviora, capsulis paucis magnisculis confectis

non vidi

arbuscula foliis serratis glabris subcapitatis subtus glaucis, caule  
suffruticeo

Frøyn. fl. austr. 5. T. 400.

~~Salix foliis serratis glabris obovatis Linn. fl. Lapp. 357. T. 1. fig. 6.~~

~~IV. Salix foliis integris glabris ovatis Linn. f. fl. Lapp. 357. T. 1. fig. 6.~~

<sup>3, 6.</sup>  
V. Salix foliis serratis glabris lanceolatis utrinque acutis fl.  
Lapp. 360. T. 1. P. fig. M.

Habitat in Laponia campis arenosis 5

Caules spithamei ~~et pedales~~ erecti fusco purpureo p. inter rami  
sparsi distanti, glaberrimi. ~~Stem~~ <sup>Stem</sup> simpliciter ~~et~~ <sup>et</sup> ~~ramis~~ <sup>ramis</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~serratis~~ <sup>serratis</sup>  
capsula glabra <sup>nonum latioribus</sup>  
aliam misit Thunb. ~~sub hoc nomine foliis junioribus serratis~~  
~~foliis~~ ~~allopiciulis~~ capsulis unianis

Denique tertiam legi ramis elongatis pappum interdum villosi  
foliis longioribus amentis longioribus ~~et~~ <sup>et</sup> ~~planis~~ <sup>planis</sup> ~~et~~ <sup>et</sup> ~~stipula~~ <sup>stipula</sup>  
ovata serrata ad basin petioli ~~et~~ <sup>et</sup> ~~hoc~~ <sup>hoc</sup> ~~fig. E.~~ <sup>fig. E.</sup> fl. Laponia  
ad folia non ea lata sed angusta

herbacea 7-foliis serratis glabris orbiculatis fl. lapp. Tab. P. f. 9. <sup>fl. Dorn. Tab</sup>  
117

*Salix saxatilis minima* Bauh. prodr. 159. p. 474.

*Salix alpina lucida* repens, alni rotundo folio Boiss mus. 2.  
p. 14. t. 1. fig. ult.

Habitat in alpebus Norvegiis, Lapponia, Helvetiis &

Enitulus pollicaris vel palmaris sub terra repens ramosa ramis  
diffusis filis purpurascens folia ungui subana rursus  
sub pollicari petoli utrumque superne pilosupula venoso reticu-  
lata et amantia brevia capsula glabra

*Salix humilis montana* folio rotundo G. Bauh.

retusa l. foliis subseratis glabris obovatis obtusissimis Lin. l. V.

*Salix pupilla humilis* Cam. ept. 108.

*Salix alpina angustifolia* repens - non iniana *Bauh. prod. 154*

non. 474.

*Salix alpina, serpyllifolia* *Lucido Boec. mus. 2. p. 10. t. 1.*

Habitat in alpidis Europa australis &

*Eridiculus palmaris* subterram repens ramosus <sup>longicaulis purpurascens</sup> ramis sparsis <sup>fove distichis</sup>

Folia sessilia glabra pinnatifida in interdum ramosa oblique  
fibriosa obtusa basi acuta integerrima vel serrata plura  
ex eodem gemma. Amenta brevia glabra squama oblonga obtu-  
sa. Capsula glabra

Salix

Habitat in America meridionali Comerson dedit Fusca

reticulata L. foliis integerrimis glabri ovatis obtusi Len. Spei. pl. p. 134 46x  
fl. Dan. tab. 212.

Salix pumila folio rotundo Bauh. hist. 1. p. 12.

Salix foliis integris glabri ovatis subtus reticulatis Len. fl. Lapp.

35. 9. 8. 0. fol. L. 7. fol. 1. 2.

Salix alpina rotundifolia repens <sup>Moric mus.</sup> <sup>Secundo folio Moricon</sup> <sup>hab mus</sup>  
Salix alpina <sup>minima</sup> lucida repens <sup>alpi</sup>

Habitat in Alpibus Capponia et Helvetia §

Fruticulus palmaris rami cortice fusco per purpurante glabri  
Solea petiolata semipollicaria oblonga venos reticulata  
per nigra tenella subtus villosa venosa statura fere nuda  
albida. Armenta masculina unguiculata intans villosa  
Lyrama <sup>obovata</sup> ~~subrotunda~~ <sup>superne</sup> fusca glabra

— oblonga



myrtalloides L. foliis integris glabris ovatis acutis. Lin S. V

Salix foliis integris glabris ~~ovatis~~ ovatis alternis Lin fl. hupp  
357. T. D. fig. 9. V.

Habitat in Europa borealiore & <sup>inaequali.</sup>

Planta humilis vix pedalis Rami glabri fusci. Folia petiolata  
semipolluciana subter glauca obscure venosa. Capsula ovata  
glabra

Specimen ab Altonogauda & foliis minoribus obscure ovatis  
mucronatis pallide viridibus transversis nervosis obsolete venosis  
on Specie Diversa?

Salix capia Vill. fl. Delph. 3. p. 76 B. tab. 50 fig. 11

*Solea* S. foliis integerrimis glabris subobovatis confertis pellucido.  
Lin. fl. Lapp. pag. 295. no 356.  
Habitat in Lapponia 5

Serpilli folia - S. foliis ellipticis subtus glaucis. Scopoli fl. Carn.

Gaeq. fl. austr. v. 298

Habitat in Austria

integra l. foliis integris glabris linearibus oblongis obtusis Thunb. fl. jap.

S. V. pag. 280.

Habitat in Japonia

Chloris I.

michi ignota

*Sesja* L. *Folus oblongo-lanceolati acuminati* Hoffm. Sal.  
Tab. 7. D

non vid.

micromata S. foliis lanceolato oblongis mucronatis subtus glaucis

Thunb. prodr fl. cap. pag. 6

Habitat in cap. b. sp. 5

folia integerrima pollicaria Vernisfme venosa Stamina 8 qu

Squamis ovato conicis

*Salix*

1. *capitata* foliis linear lanceolatis integerrimis glabris Fl. Ross. v. 1. p. 2. pag. 148

Habitat in arena inter Volgam et Rhymanum locis aquaticis

Virgultum virgatum, saepe altitudine hominis. Virga gracilis, lentic flavo, glaberrimo nectatis

obliqua fimbria et stipulata, angustissime linear lanceolata, acutissima, subtus glauca  
feracissima. Amenta inter folia pollicaria, Pappus tenerimus non valde prolixa  
affinis *rosmanifolia*

non vidi



cuncta l. foliis integerrimis utrinque villosi obovato appendiculato

Lin. l. v. flor. Capp. 369. V. D. 4. 4

Salix folio rotundo minore Rai angl. 3. p. 450. Dill. app. 37.

Habitat in Europa boreali sylvis

Chrysantha L.

accedit ad auctorem omnibus partibus autem major

*S. serotina* foliis oblongis acutis integerrimis pinnatis, stipulis lanceolatis deciduis Pall.  
ib. 3. p. 759. app. 135. Sal. Non. Fl. Ross. 1. p. 2. p. 134

Habitat in arenosis vadis et insulis Volga

affinis prodecedenti

~~Trinax~~ *serotina* in siccioribus arborescit. Stamina crassa fragiliora, striata vire  
scenti aspectu. Folia juniora ovato-lanceolata, pinnato-argentea; adulta oblonga  
acuta, saepe dudumante longiora, mollia, subtus venosissima. Stipulae nullo nisi  
ramis lecturae linearis-acuta. Amenta pedunculo, aliquot folioli  
infructo a gemmis lateralibus; mascula sesquipedalium, hirsuta, squamis confectis  
femineis longissimis. feminea breviora capsulis masculinis crebris, tomento  
albescens. an *Salix aegyptiaca* affinis

nunc ignota

accidit ad Salicem in flora Dan

Canupnota

*S. lanata* foliis ovatis undique villosissimis, sepulis ovato-acutis

*capitata* Pallas

Habitat in ~~caucaso~~ summis partibus alpium caucasicarum.

Arbuscula prostrata, fruticosa, ramis subsessilibus  
cortice fusco et sicco tomento obductis. Folia crispifolia, ovata  
subacuta, sessilia, cast. gemma, utrinque tomento fusco argentato densissime  
villosa. Sepula in summis ramis ovata acuta, etiam villosa. Anthera  
ta fronsina marginata, lateraliter pedunculata, uno alterove folio stipitata  
capsulis tomento albis

hespita L. castipulata, foliis ovatis mucronatis utrinque  
hespiti Thunb. prodr. fl. cap. pag 6.  
Habitat in cap. b. spei 5  
Folia integerrima

non vidi

1. arctio foliis integerrimis subtus villosis obovato-rotundatis fl-ros J.

1 p. 2 p. 170

ad sinum obersem versus mare glaciale

arbuscula via sesqui pollicari, crassitie calami cygnei, a basi ramorum rami  
digitales crassipuli terra accubantes cortice spadiceo lutescente. No  
pulo nulla. Folia pro planta majuscula, pollicem latiora, crassius reti-  
culata, supra nitentia subtus tenuissime villosa, petiolata. Amenta foemina  
magna bipollicaria, crassitie digiti minimi, Congius pedunculata  
duobus vel tribus foliis stipata majusculis. Capsula conferta, crassipula  
conica, extus tomentosa cana