

Salix.

glauca L. foliis integerrimis subtus venis sparse villosis ovato-oblongis  
Lin. Fl. Lapp. 363. T. 7. fig. 5. et T. 8. fig. P.

*Salix alpina pyrenaeica* Bauh. pinod. 15. g. pin. 474.

Habitat in Alpibus Lapponicis et Pyrenaeis &

*Salix seneca*

villars flor. Dalph. 3. p. 702. Tab 51. fig. 7

Rami fusco purpurascens, supra villosi <sup>supra nigro-hispidi</sup> subtomentosi. Folia oblonga  
juniora villosiora prope subtus subsericea. Amenta breviter unguis  
culcitra crassa lanata

— oblongis

mibi haud satis nota

*S. Gmelini* foliis ellipticis lanceolatis, integris subtus fereis Gmel. fl. sib. 1. p. 163. n. 19. fl.  
Rosf. 1. p. 2. p. 153.

Habitat ad Feniceam et Baiualem inque Dauna  
affinis viminali virgo lutea vel fuscipetalis. Folia integerrima supra cana  
subtus argentata. Ripula nulla in adultis. Cimento fessile in gemmis foliis  
masculina polliciana, calamo tenuiori, pallescente villosa, foeminea crassiori, con  
ferdim umbriata.

non vid.

appendiculata L.

Salix arctica fl. Lapp. tab. 8. fig. 0.

Habitat in Lapponia

*Fraxinea* f. foliis ovato-lanceolatis villosis stipulatis.

*Salix foliosa* est rotunditate acuminata Bauh. pin. 474

*Salix fraxinea* foliis ovatis, ovato lanceolatis villosis stipulatis  
pulis gracilibus Villars fl. Delph. 3. p. 777.

Habitat in Delphinatū

*Salix integerrima* affinis lanata

michi ignota

Depressa L. foliis for lanceolato - ovatis utraque acutis subtus  
vellopi Lin fl. Scapp. 361. Tab. P. fig. n fl. Sw: no 994  
Salice folio rotundo acuminato integro subtus laniceo  
Hall. hist

Habitat in Lapponia Helvetia

lanata l. foliis utraque lanatis subtortendis acutis linn fl. lappon

360. fig. 4 et. l. 7. fig. 7.

Salix humilis latifolia erecta. Bauh. prodr. 159. p. 474

13. Salix depressa foliis integris subtortendis vellosis canaliculato-ovatis utraque acutis fl. lapp. 361. t. p. fig. 11. fl. suec. n.

1794

Habitat in alpebus Lapponia

~~Ranunculus foliosus~~

Utraque tomentosi ovato-lanceolatis  
capulis globosis

non vid.

nubida f. folus ovatis obtusi mucronatis utraque subrotundi  
Gmelin et. 3. 4. 20  
Habitat

non vidi



*Sensulatum Empleurum* Hort. kew. 3. p. 340

*Diosma unicapularis*: capsulis unilocularibus Len. Suppl.  
pag. 155 \*

Habitat in C. bono p. 5

Rami per perispermum teri glabri alterni, inferne teretes superne  
et linea a basi petioluli decur rente subani petio. folia breviter  
hinc petiolata alterne frequentia linearia lanceolata  
bipolliciana glabra <sup>utrinque</sup> punctata proposita subtus supra coram  
subtus rugosula. peduncululi axillares folitarii capellares

arenaria L. foliis integris ovatis acutis supra subvillofis, subtus tomento-  
sis - L. V.

*Salix pumila*, foliis utrinque candidantibus et lanuginosis Bauh  
pin. 474. Gmel. fib. Gmel. fib. 1. p. 164. t. 36. fig. 1.

*Salix* foliis integris utraque ~~hispidis lanceolatis~~ subtus villo-  
sis ovatis acutis Lin fl. Lapp. 362. t. D. fig. O. G.

Habitat in Europa paludibus <sup>5</sup> Gmel. fib. 1. p. 164. t. 36. fig.

Rami <sup>hyperme</sup> lanati inani. Folia juniora lanceolata vel

oblonga <sup>loper</sup> pro parte angustata juniora e villis densis

longis albida state glabra capsula inanis hispida

Parva helvetia Villari fl. Delph.

\_\_\_\_\_ foliorum oblongorum capsulis tomentosis

addde Syn. ex Haller

Lapponum L. foliis integerrimis hispido canaliculatis Lin. fl. Lapp.  
366. N. O. fig. J. Hall. Helv.

Habitat ubique in alpebus Lapponiis, Helvetia &

facies Poitea. Tamen bypocidali rami superne anciano tomentosi.  
Folia bipolliciana subtus proferim hispido tomentosa supra sta-  
te glabriora utraque cincta. Amentum demum lateraliter  
polliciana et ultra lanata.

incubacca 1. foliis integerrimis lanceolatis: subtus villosis nitidis, stipulis  
ovatis alutis. fl. Suec. 007. 095.

*Salix pyramidalis* brev. angustaque folio inc. ano Bauh pin. 474

*Salix pyramidalis angustifolia* 2. Flus-hist. p. 86

*Salix pyramidalis angustifolia inferna lanuginosa* Bauh-hist. p. 212 } De herb  
Vall.

Habitat in Europa praesens durissimis, uliginosis

Rami incani folia breviter petiolata. folia subtus propositum  
juniora ferricea supra glabra venosa.

add Hall. Syn.

~~incubacca~~ *incubacca* Dubaut

Supra l. foliis integerrimis ovatis subtus pubescentibus. Lin. Sci. pl. p. 1447. x  
fl. lu. 897. Jacq. fl. austr. 5. T. 409. coll. 2. p. 200

Salix pumila, foliis utraque glabra Bauh. hist. 1. p. 217.

Habitat in Europa pratis humidis &

Rami diffusi procumbentes superne villosi inferi folia  
utraque villosa supra interdum glabra subtus sericea superne  
stipulis lanceolatis. Capsula glabra

Salix folio subrotundo Bauh. prodrom. 159. p. 474 herb. Vaill.

---

subtus sericeis superne stipulis lanceo-  
latis appendiculatis

Syn. Bauh. hist. Dubour  
et Salix a variis aenonyma dicta eriantha

Jaquini  
S. foliis integerrimis caniscolatis obtusis que ciliatis  
pubtus villosis Hist. Synops. plant. austr. p. 529  
Salen p. 100 Jacq. fl. austr. t. 409  
Habitat in Austria

mihi ignota

reperit. <sup>pilosis foliis</sup> foliis integerrimis lanceolatis utraque <sup>medicinalis</sup> caule repente  
Lin. Spec. pl. pag. 1447.

Salix pumila latifolia L. Pluf. hist. 1. p. 25.

Salix alpina pumila rotundifolia repens, inferne subinerea Bauh.  
pin. 474.

Habitat inter montes succis, locis humidis &

Rami purpurascens folia parva semunquiculanā venella  
utrinque villosa adithora supra glabra subtis sericea. Capsula  
glabra a

an mea Lin. videtur esse Salix fusca Hoffm

amblyopia "

Erhart

non vidi



polymorpha

Ehrh.

microgona

rosmaninifolia L. foliis integerrimis lanceolato-linearibus striatis sessilibus  
fuitus tomentosis Linn P.V

Salix humilis repens angustifolia Lobel. ic. 2. p. 137. Bauh. hist.

1. p. 214.

Salix humilis angustifolia Bauh. pin. 474.

Habitat in Europa campis depressis &

Rami supini folia supra glabra fuitus nitida. Cappula villosa  
la cinerea

Rami sparsi virgati, cortice purpureo, supere angulati utran-  
gemmo purpureo. Folia angustissima vix petiolata, interdum  
tripolliciana supra glabra. herb Vaillart

formosa. S. foliis obovatis lanceolatis que subtus glaucis subpubescentibus stipulis semicordatis acuminatis  
Salix cinerea foliis subserratis oblongo-ovatis subtus glaucis subpubescentibus, stipulis semicordatis acuminatis  
Wieder. Baden. Baumz. pag 350  
Habitat in Europa montibus  
Rami glabri. Folia  $1\frac{1}{2}$  pollucina basi vespis integer  
nima. Stipula parva

humilis S.

prope astusculan

Cinerea L. foliis subferratis oblongo ovatis subtus subvillosis, stipulis dimidiato  
cordatis Lin. Spec. pl. pag. 14494

*Salix foliis integris glabris lanceolato-ovatis* Lin fl. Lapp. 350.

Habitat in Europa nemoribus paludosis subhumidis &

Rami superiores villosi. folia petiolata subtus uniana inter

dum integerrima capsula uniana stipula interdum

nullo pene supra nervo subavenia subtus venosa

pedicellata Desfont

*S. acuminata* foliis ovato-lanceolatis, subtomentosis, superioribus integris, inferioribus crenatis Hoffm. Sal. 2. p. 39 Tab. 6. fig. 1. 2.

in herbario deest

excelsa P. foliis sessilibus ovato-oblongis acuminatis subtus villosis  
inferioribus integris Gmelin et. 3. 7. 34. fig. 1.

Habitat.

non vidi

caprea l. foliis ovatis rugosis subtus tomentosis undatis superne denticulatis  
Lin. Spec. pl. pag. 14404

*Salix latifolia rotunda* Bauh. pin. 474.

*Salix foliis pubescentibus utrinque villosis ovato-oblongis fl. lapp.*  
365. V. O. fig. 5.

13. *Salix foliis oblongis subtus villosis: inferioribus crenatis superioribus  
integris* Lin. fl. lapp. 367. V. O. fig. 11.

V. *Salix foliis ellipticis lanceolatis subtus sericeis appendiculatis*  
Gmel. fl. 1. p. 169.

Habitat in Europa siliis & pubescenti

Rami teretes <sup>pubescenti</sup> folia petiolata 3-4 pollicari supra  
glabra subtus villosa pallidiora gemmae axillares  
glabrae

— ellipticis lanceolatis subtus villosis

varietas e Lapponia foliis utrinque villosis integerrimis



hybrida *S. fraxinifolia*, foliis ovatis subtus tomentosis, filamentis semi-  
bifido Villars fl. Delph. 3 pag 770.

*Salix foliis fraxinifoliae ovatis subtus tomentosis filamentis*  
*semibifido Scop. fl. Carn. ed. 1. 406. n. 1.*

Habitat in Delphinatu  
affinis Caprea

*Salix cymata*

*oleifolia* *S. folius lanceolatis* <sup>subintegerrimis</sup> supra splendidioribus, subtus lanuginosis. Vill. fl. Delph. 3 p. 184. tab. 51. no 20.  
*Salsus folius oblongis* subtus villosis Lin. fl. Cappon.  
no 367. tab. 8. fig. 11.  
Habitat in Capponia et Delphinatibus.  
affinis *caprea*

Daphnoides S. foliis ellipticis acuminatis subserratis inferna glaucis, super  
ne nitidis, julis brevibus dense villatis fl. Delph. pag 765 tab 50  
no 7.

Habitat in Delphinatu

affinis Sal. Caprea

Stipulo lanceolata

— lanceolata serrata

mibi ignota

Pontederis *S. foliis lanceolato-oblongis serratis* <sup>luteis</sup> ~~inferne~~ glaucis  
*Salix pumila nigricans foliis oleagineo serrata* Pont. Comp.  
140 et 144

*Salix Pontederis foliis densis oblongo-lanceolatis, serratis*  
*glandulosis, inferne glaucis, julis oblongis, basi foliis*  
Villars fl. Delph. 3. pag. 766. Tab. 50. no. 0.

Habitat in Delphinatu  
an varietas *Daphnoidis*  
foliis subtus villosis

*S. sibirica* foliis ovato - lanceolatis subserratis tomentosis rigidiusculis, pappi ovatis  
subdentatis fl. hos. v. 1. p. 2. p. 156.

Habitat ad rivum subalpino tencisco

Virgulto vix altitudinis hominis. Stamina lutea parum ramosa virgata pulchre flava,  
parte juniora saepe tomentosa canescentia. Corolla crebra, alterna, brevis petiolata,  
fructu obsolete 5-meris <sup>is 9-12</sup> tenuissimeque denticulis subserrata, valde nervosa, rigidiuscula  
in quibusdam utraque tomentosa - alba, interdum subtus interdum nuda. Stipula  
persistens ovata, acutissime altero latere denticulo notata

non vidi

conifera L. foliis ovato lanceolatis acutis subtus planis pubescentibus  
virescentibus Walden. Ber. Baumz. p. 347

*Salix conifera*, foliis ovato lanceolatis acutis serratis alter  
no subtus tomentosi, floribus dioicis Wanzent. Baytr.  
pag. 123. tab. 31. fig. 72.

Habitat in America boreali

Rami pubescentis Verdetor. Folia 3-4 pollicaria stipula  
semitordata dentata angulata. Amenta masculina  
crassa hispida

hinc pedunculata *Salix platyphylla* Leucophloos Dalech. hist. 276

videtur

Sci. her. b.

Vaillanti

*Salix* foliis longis latius cuspidatis subtus cum nitore canescentibus  
bin. Pluk. a. alm. p. 320

flava S. foliis lanceolatis acutis petiolatis supra pubescentibus subtus  
tomentosis glaucis Schoepf. mat. med. Am. p. 147.  
Habitat in America

mihi ignota

alba L. foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus: jern  
tani infimis glandulosis L. V  
Salix vulgari arboreo Bauh. pin. 473

Habitat ad pagos et urbes Europae  
rami flavescens. Folia tenella integerrima



*Vitis L. ex stipularia, foliis lineari-lanceolatis petiolatis rugosis subtus  
tomentosis Hort. Kew. 3. p. 393.  
Habitat in Pennsylvania 5*

terminalis l. foliis subintegerrimis lanceolato lineantibus longissimis acutis  
subtus ferrugis, ramis vixatis An. Spec. pl. pag. 1448. y

Salix foliis longissimo angustissimo utrinque albedo Bauh. pin. 474

Salix foliis angustis et longissimis crispis: subtus albi antibus Bauh.  
hist. 1. p. 212.

13 Salix ex foliis lineari-lanceolatis integri subtus incanis Gmel. p. 1.  
pag. 162.

44 habitat in Europa ad pagos;

rami superne uti folia subtus ferrugis supra glabra  
ovata angusta attenuata. <sup>Folia</sup> Stipulae subulata

exstipulata, foliis lanceolato lineantibus longissimis subinte-  
gerrimis planis subtus ferrugis

✓ Salix virens Cens. Villarsii huc pertinet terminalis vero Villarsii  
nemidiana Ramondio. Deuter

mollissima

<sup>retina</sup>  
S. foliis linear-lanceolatis mollissimis utrinque tomentosis  
Hoffm. fl. Deutsch. 1. p. 43.