

Salvadora

L. perpia L.

perfusa Salvadora Lin. S. V. pag. 166.

Rivina paniculata ib. pag. 165.

Pisus arborea; foliis oblongis, integris confisis & obovatis. descr. pag. 32. t. 8
Embelia Burmanni Rebe obf. Bot. Taf. 4. p. 23. n. 69.

Rami levissimi, glabri, versus apicem obtuse *Vetragoni*, pallidæ cotyle
racemuli horizontales
albo. ~~opposita~~

Folia elliptica, integerrimæ opposita, petiolata, elliptica, integerrima
crassa, pallida, nervosa.

Racemi axillares, patentæ: racemuli horizontalibus superioribus
semper minoribus.

Calyx minutus quadrifidus. *lacinia* rotundatis.

Corolla monopetala, persistens, quadrifida sive pallida flava, qua
drifida. *lacinia* ovalis, acutis, reflexis

(*Embelia Rebe Burmanni* Bl. ind. p. 62. tab. 23. distincta planta ex
foliis alternis & riliquis, ut videtur ex specimenibus Hort. Herbarie)

Lit. D.
p. 13.

31

~~in omnibus convenit quare perhaec sum de veritate synonymorum.~~

~~virini deducit~~
Cet. Burmanae ~~est~~: Embelia grossularioides Koenigii ^{virgi} est in Herbario Horto
piceo Ill: Linnæi sub nomine Salvadora persica. Cis fuscus arboreus Dr. Wohl
in omnibus convenit cum Embelia grossularia: Koenigii quare de veritate
synonymorum plane convexus sum. Rivina paniculata ut pote eadem
planta ac Salvadora persica in Systemate Vegetabilium delectur, quod jam
monuit Immortalis Proceptor in Spec. plant. pag. 178

~~Cum calyx minutus est, corollam et calyculum atque inde corolla~~
~~concolora~~

Cum calyx minutus corollam ante inclinans eaque non colorat a laevius
corolle vegetab; in definitione generis posteriori perficit. Certe adest,
deoque Salvadora in secunda divisione Tetrandria monogynia collo
coloratur Tab. ¹⁶ representat plantam secundum specimen a Koenigio vix
for. fig. a flos magnitudine aquata a late ¹² visus. b corolla cum pannibus
et pistillo

persica Salvadoria Lin. S. S. p. 166. Jan: act. Engl. 1749. n. 491. Dact. symb.

Bot. p. 1. p. 12 Tab. 10

Pivonia paniculata Lin. S. V. pag. 165.

Cuspidaria arborea; foliis oblongis, integris crassi 80 ft. de fr. pag. 32.

Embelia Burmanni Retz. off. Bot. fop. 4. p. 23.

Habitat in Arabia, Persia et India orientali;

Prami terete articulati; articulis bipinnatis, pallide
viridia uti folia. & soler pet colato, opposita bipinnata

Oblongo-lanceolata, integrerrima veni simplicibus glabri
crassiuscula. Racemi attillares, oppositi palmares; Com
positi brachiat. & lobi oppositi. pars foliorum sub rami
ficationibus inferioribus

rales

capitulata Salvad. foliis ovatis acuminati, capitulis astillatis dous. fl.
Cochinch. pag. 87.

Habitat in Cochinchina 5

Arbor mediorum ramosissima. Sola inqualiter ferata afferrata
alboerna suffractolata. pedunculi astillari capitulo. Sflora. pedicell
brachyspica. Cal: 4-5 paritudo perspicens. Corol. O. Stigma bifidum. Baixa
parva cut ea ful apie didyma 1 sperma. Semen anellatum

non vidi.

biflora Salv. foliis lanceolato - ovatis, floribus geminatis Lour. fl. Poeh.
reg. 80.

Habitat in Cochinchina sylvis?

arbor 10 pedalis. Rami tortuosi, patentia. Solia subferrata aperta alterna
flores axillares, pedunculis longis. Cal. 4-partitus, corolla 0. Stylis 2 filis.
Bulla lutea biloba 1 perma. Semen non anellatum Lour.

non vidi.