

Salvia

56

~~fig.~~ *Salvia*

Cal subcampanulatus 2-labiatus: labio superiore
3 dentato. Cor. ringens. Tilam transverse
pedicello affixa

Lantestenoder Salvia

ex gr. Risto Grapvald.

Semilis S. verbena ea at folia ovata, bipinnata, omnino glabra, duos vel
trium parium in cæule. Pedunculus bipedalis, verticilli sex florib.
bracteae calycis breviores. Calyx ea lycis superioribus coronatum utriusque.
I cornum depresso carrum. Corolla calycis non longior facie subtilis gibbosa
calyx superiorius parum brevioris inferius concavum latius latealebat
oblongis planis brevioribus intermedio

~~pulchra~~ *Connemera pumila* diffusa, foliis lanceolatis vaginis et raro
ciliis ciliatis Ad-phi. h. n. Parf. 1. pag. 106
~~Habitat in Amer. merid.~~

non vidi

Salvia

affinis Descomes

Pauli Tripedalis vellosa Viscosus ac ut e angulatus. Dolia cordato - erata dentata
to erosa a 7o pollici longa pollicis duos latu rugosa, vellosa. Racemus elongatus
verticilli de 8 antar sexfieri. florum bulbos sibi. calyx nervosus vellosus
glandulosus, dentibus mucronato incombens. Corolla purpurea calyco dimidio
longior. calix superius concavum vellosum stylo parum brevior emarginatum
inferius ^{dubior canum} pollicum, ex agnatum laevius lateralebus breviter lanceolatus oblongus
stamina fani & longiora ab galae breviora ex arcis & levile breviora dilatata
tum membra rara cum stylis in longitudine galae. palatum pallidum ma
culae duae minutae purpureae. labii albi compresus. Corolla pallida
purpurea. Brevis in longitudine calyx
an modo varietas Bermudis colore diverso refert figuram Aodini

Bulbodium 4. ~~Scapo raro~~, floribus solitariis, foliis fulcentis reflectis Thunb

40. n. 3.

Siphonochilus minus angustifolium, flore magiore variegato Bauh.

Si p. n. 41.

Siphonochilus appressum angusto folio alternum Col. Exphr.

2. p. 5. t. 7. fig. 1.

Fritia quadrangularis de la Roch. Duf. pag. 16

Fritia bulbocodioides ob. p. 19.

Procus vernus angustifolius IV. Plaf. nov. 1. p. 200.

Fritia bulbocodium Scapo unifloro brevissimo, foliis angu-

Portio - 265 lati caulinis, segmentibus septuplicatis den. Sy. t. 13. p.
76. Mant. p. 320.

Habitat in asenophi mani mediterranei ^{3. v. 4.}

Bulbus magnitudine nucis concli habet loci. Tolea ³ sepe spathula
vagina basi rectangula angustissima acuta, infimum velutina longus
extremam reflexam velutina ejectione si quis superne latibus ion-
vatus marginibus oppositis accidens vel digitale pauciflorum
flores in scapi ramis terminalis sump florentur flor unicus antefactus
velutini inter spathula recordat. Spadix extensus creta, exundis
alter festa species differt Thunb. forte diversa

Adua

aura

Habuit et in Graecia

Praeoles plures; erecti, pilosi, angulis & tubi superiori in pedunculo elongatis bipedales divisus ut crassus & non penitus ansaeo. Dolia
pediculata cordata oblonga rotunda alia & ova subsinuata rotunda,
obtusa caulina dentata acuta omnia rugosa & subtus venis
exterioribus glabra sed nitidula subtus pilosula Scabriuscula
verticilli remoti, sex flori flores & subcesiles. 13 rachis cordata
et valde attenuata laevis subtus pilosae supra glabra
arvensis infimae calycis longiores & superiores breviores. Palyn
villosum labium superius & indentatum brevis infelix bifidum
flores facile

cadunt ad diem Porolla curvata unguiculata pubescens labium superius formi
ad explicationem non compunctum

Catena integrum non compunctum
labio laterale obsoletum labio superius longitudine & superius pallidum
pennis longioribus labio longiori filamenta Staminibus non vestis longo filamento longior 3 mm.
(exinde) inferius brevior apice dilatatum nigrum

affinis sibi bullata dicta corolle labium inferius coni avum medio
labium superius subtiliter

Denudatus C culmo angustis, involucro subnullo Lin. Sappi. pag. 102. & T. V

pag. 90

Habitat ad C. b. spic.

Pulvis nudus sequitur daliis angulis est foliis membranaceis. Umbella
multicordata radis bipollis canibus vel brevioribus. Fruis 3-6. foliis.
linearis compresis unguiculatis. Squamae lanceolatae fuso ferruginea dorso
virides apice patula squamula membranacea ovata ad basim pedicello
num. Involutum folium virg. pollere

Specie foliis aggregatis subfemis patentibus

Squamae apice patula

egyptiacæ Salvia foliis linear-lanceolatis denticulatis rugosis, bracteis ovaliis
mucronatis.

Horminum egyptium minissimum ramosissimum Lippi Boesh. Engdb.

1-p. 6.

Salvia egyptiacæ, foliis lanceolatis Denticulatis, floribus peduncula-
tis hisp. ^{gypt.} L. ^{69.} T. ^{100.} Jacq. hort. 100.

Melis sa perennis. floribus sessiliatis utringue ter nopalum
culatis, foliis oblongis crenatis. Forsk. Descr. p. 100.

Habitat in Egypto, Canario?

Lanis suffritiosus, rigidus, palmatus, ramosissimus, in Canaria pilis
baribus reversis adpresso. Solia sessilia, unguiculata, marginé

undulato-denti reflecta^{nt}, triangula parum attenuata inferioria in petiolum
cylindrica, villosa, bracteis ovato-acuminatis, parvo. Flores tres utringue spiculati
canescens, lati, parvi. Calyx tubulum superius indivisum, inferius profundè
bifidum, oris aperto resinozo paucitate.

Planta a Canaria altior, tenerior, non rigidus quam egyptiacæ

~~h. egyptiacæ~~ solitaria, calyx stellato ciliatus. H. 1. T. 100.

tubiflora Sol. foliis cordatis crenatis subgracilis calycibus trifidis, corollis longis spissis
tubulatis, filamentis exsertis Smith. fol. 8: fasc. 2. tab 26

~~Habitat in Lima.~~

non vidi

cretina ² Salvia foliis linearē lanceolatis, floribus digynis, calycibus diphyllis

Wilden. Spec. I. p. 120

Salvia cretica angustifolia Blas. his t. p. 343.

sgt. vey. 69

Salvia cretica foliis lanceolatis calycibus diphyllis Lin ^{K.}
Nov. Act. Nat. C. T. 3. p. 479. Etling. Sol. no. 3.

Salvia Venetii folia Riv. monop. t. 28 t. 120.

Habitat in Crete 5

Terriculus sequipedalis, facile S. officinalis, basi ramosus: Rami
erecti, villosi Tomentosi, crenatentes. Folia longe petiolata, basi atten-
nuata, crenulata, inferiora obtusiora, rugosae, bipinnata vel
ultro, pubescentes Tomentosa. Flores vestiti, subspatiati. Bractea
ovata. Calyx foliata subequalis; superior Tridentatum, inferioris
semibifidum: Corolla calycis longior.

Varietas forte S. officinalis ex mente Etling. ^{at} Wildenowii

Aureo Salvia

Habitat in Carolina Mechanic Rest. 4us.

Caules 3-4 pedalis: rami glabri. Dolia remota, bipinnatis, lacinias rotundatae, semper angustiora, integrifolia, glabra, loria. Raceme axillares et terminalis, 3-4 pinnato-pedunculati breves, terni plurimque, interdum oppositi. Flores nutantes, aurei calyx & operculis vellosus, labium superius oratum, inferius bifidum.

~~nubia Salvia foliis caniculato-ovatis duplicato crenatis; tubo corolla incurvo Muos.~~

~~Com. Gott. 1770. p. 90. t. 3. f. V. pag. 70. 21.~~

~~nubia S. foliis oblongis subcordatis inaequilateraleibus negoſi crenatis bafi fabauitii~~

~~H. Kew. I. p. 42.~~

~~Habitat in Africa~~

~~Paulus herbari uti petroli. Dolca petiolata inferiora bafi ~~auncula~~^{lata} altera
que vel interdum gemino ab altero latere ~~cam~~^{et} auncula altera
parum per petrolum longius occurrente quam altera ac uta inaequaliter
crenata, bi-pollis coria supraemam duo intermixta crenata ferplea. vertice
li racemosi 12-14 florib. pedicelli breves pubescentes. Bractea ovata
calyx parum brevis attenuata. Calyx bracteae pubescens dentes superiores parum brevi
er laniculata inferiore pubescens. Corolla parva calyx parum longior~~

>

~~erecta La Mart. nubiam ad ~~ab~~ nubetuan var. A.~~

lavandulifolia? Salvia foliis linearibus oblongis crenulatis subtili incanis, pedunculis
tulig. elongatis, caule fructuoso.

Salvia Hispanica, lavandulifolia Tournef. inst. 101

Habitat in monte Montayo inque montosis circa Siguenam Hispanio?

Pauli & fructibus vix palmans erectus, aphyllus, sternit insculpis superna ramosus. Rami, erecti, striati, obscure tenuiori, canescentes, in pedunculos longos desinentes. Folia petiolata, vix pollicaria, semiunguentata, acutiusculata, inferne in ramis confusa basi obtusissima, inferne in ramis confusa, Duum parum supernae remota, supra rugosimaculata; glabra; pubescentia e ramento tenue incana, superiora parum majora, ut inque rigosa, et villosa. Pedunculi simpliciter basi utrinque ramos anti. Verticilli

#quodni-quinque
que

emotili. flor: floribus sessilibus. Bractea evata, parva aiuta, parvo.
Palpias multi striatis, vidi purpureo-virides, pubescentes, aiuta
quin quidentati, bracteo-tripli longiores. Corolla calyx duplo longior.
Odorem fere camphore spargit.

in modo varietati S. officinalis.

maxime affinis S. officinali, in modo varietas? Cultura doceret.

⁴
officinalis Salvia foliis lanceolato-ovatis crenulatis, verticillata
floris, calycibus ^{muconatis} bracteis longioribus.

Salvia major Dicks. hst. 248

Salvia officinalis; foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus
spicatis acutis. Lin. S. t. 845. Vag. 69

Lobata B. Salvia minor Dicks. hst. 249.

Habitat in Europa australi

Sept
Paulus fructuosi, basi ramosa & solio petiolata, part. ^{uni vel bi} pollicaria, rugosa
laca. Verticilliflora: floribus breviter pedicellatis. Bracteas ovatas,
attenuatae in mucronem nervoso, decidua. Calyx striatus, incano & cyprea
perastris: Calyx dentatus in mucronem attenuatus, pubulatus.

~~cretica~~ Salvia foliis lanceolatis, calycibus diphyllis s. V. 60. 2. Spec. pl. 33. 2.

~~Habitat in Creta. Nov. Ad. H. C. Tom. II. 3. p. 479. Ehrenb. des. pag. 10. n. 3.~~

~~Salvia foliis perangustis sinuatis, longis petiolas insidentibus canescens Platea
phyt. T. 57. f. 1.~~

~~Habitat in Creta 5~~

~~Salvia cretica angustifolia Claf. h. v. pag. 343.~~

~~Integerrimi sequentes ad facie officinalis basi ramosa rami erecti
vellos ^{tomentos} canescentes. Folia longe petiolata basi attenuata & venula
tomentosa pubescentia inferiora obtusa rugosa hyalina vel ultra subtilis
flora vesticillato subspicata. Bractea ovata. Calyx
foliolo subaequali duplo bona superiore & id entatis expe-
nere semitrido. Corolla calycis longior.~~


parte mera varietas s. officinalis ut jam credit Schreb.

⁵ + *Salvia incana Tomentosa*, foliis cordato-ovatis negosis, floribus axillariis =
bus solitariis

Ex Horto Banjino

Habitat in Oriente an. H. A. L. 1. 5

Rami obtuse tetragonoi ~~et~~ ^{ad} ~~alia~~ ^{alia} folia petiolata, vix pollicaria, obtusa
adultiora obscurae runcinata, pubescentes albidiora, juniora integerrima, Superia
venosissima: radimenta ramulorum ex omniibus assillis. Pedunculi
axillares, brevis simi, solidarii; uniflori. Calyx folio quadrupliciter brevior,
striatus; pilosus; pilo-apice glanduliferis; quinque-dentatus; dentibus acu-
tis. Corolla calycis dimidio longior. Styles corolla longior.

~~herbacea s. herbacea petula articulis apice compressi emarginato-bifidis
I. V. p. 522 f. - Dan. tab. 303. Batt. opus: f. 2. p. 105. V. 50~~

~~Salecornia adempt. d. 2.~~

~~Habent in Europa ceteris maritimis O.~~

~~herbacea s. herbacea petula, articulis apice compressi emarginato
bifidis, specie atellanis oppositis pedunculatis squamu-
obtusis Wilden. spec: pl. 2. p. 23~~

~~hali geniculatum J. salecornea Baeh. hist. 3. p. 705. 104. 23~~

~~deandru secundum Moehring. specia articulata floriferi
approximati monandri in quavis articulo~~

6
grandiflora Salvia foliis cordato oblongis crenatis, verticillis multifloris caly-
cibus acutis bracteis brevioribus Etling. Cal. n. 3.

Salvia flore magno Rivi. monsp. ior. t. 127

Catifolia B. Salvia Catifolia Ferrata Baeh. p. 237.

Salvia ^{territo} vel crispo folio latiore Monis. hist. 3. p. 399 B. 11. T. 15: f. 7

Habitat  in Oriente

Fructus s. officinalis diversa caule altione, tomento dense late, vi-
petioli canato: foliis inferioribus 3ope palmaribus; crenatis nego-
majoribus; viridiioribus: Verticillis floris: Bracteis medianis calyx
corolle que duplo majoribus: Calyx histo dentibus ovatis acuti.

Cultura faciet multum metadur, ut sere diversa planta apparet

duodecim

~~spinosa Salvia foliis oblongis repandis, calycibus spinosis, bracteis cordatis mucronatis con-~~

~~Cav. l. V. p. 71. 7. S. Mart. 26 Etling. Scir. 24. pag 35~~

~~Hornimianum synicum Baeh. Pin 230. prodrrom. 114. - Matthei. Monson. h. 3. p.~~

~~392. f. 11. t. 16. f. 2.~~

~~Habitat in Egypto ♂~~

~~Caule pedalis obsolete quadrangulari peli rani glauca capitato; sunt
tota planta conspicuus brachiatu, dolia petiolata ovata subcordata
nigra pubescens, obtriangularis repanda, summa pectinata, acuminata den-
tata. radicilli triflori. Bractea cordata, ciliata, longe
mucronata, concava calyx longior. Calyx tubulofusus com-
presus: labio superiore tridentato inferior bidentata. Corolla
tubus calyx parum longior. Galla emarginata.~~

trilobata ~~Salvia~~ Tomentosa, foliis petiolatis rugosis subtrilobis: lobis in Vermadio
productione oblongis; latera libus orato obtriangulari. ~~suppl.~~ 188.
Salvia coerulea purpurea baccata extensa Lob. adv. p. 239.
Salvia cretica pomiifera Plus. hist. 343. Mons. hist. 3. p. 399.
9. 11. t. 15. f. 4.

~~Salvia~~ quinquefolia Rivin. monop. cori t. 131
~~Salvia~~ auriculata; foliis lanceolatis supra auriculatis subtri-
ngulatis; Tomentosis, floribus spicato-verticillatis, calycibus ventricosis
Tomentosa, Mill. Dick.

foliis petiolatis ^{alvei} baccata; foliis orato-lanceolatis serrulatis obtusis
et lanceolatis supra Tomentosis, verticillis paucifloris, calycibus acutis Ethiag.
bispliatis-pinnatis Sals. n. 44.

^{his} pilosis Salvia Plusii; foliis lanceolato-oratis, integris serrulatis,
obtusis imperforatis caeruleis lanceolatis spicatis calycibus acutis verticibus equaliter decoloratis
1-p. 68.

^{glaucis} Salvia coerulea pomiifera, flore albo Tournef. cor. 10

Habitat in caulis Archipelagi, Syria

Habitus S. officinalis. Tota cano-tomentosa. Solia sexque pollicinae,
summa & opere integra, inferiora plenumque trilobata, interdum quinque
lobata, interdum latere altero bilobata, altero unilobata, rarius lobis ab
alteris lateris distinctus: Lobis intermediis multo major, crassis, vel ora
quadrangularibus: laterales oblonga, omnia exserta, obhesa. Bractea
longitudine calycum conditæ, crassi, pilosissime. Vertebræ ^{do-decim} floræ
floribus breviter pedicellatis. Calyx et bractæ sulcatis punctis resinosis
sic adpersi, pilosi, pilis plenumque glandulosis.

B. quædet foliis inferioribus unius vel bilobis: lobis lanceolatis, alterius
partes latens parum majora ~~rapta~~ inferiore, majore: foliis superioribus
bisilibus, simplicibus.

pomifera **S**alvia ~~racemosa~~, foliis ovato-lanceolatis rugosis crenatis, calycibus
ampliatis tubis bracteis ovali exsertibus longioribus

P. 225. Salvia cretica frutescens pomifera, foliis longioribus in anis
et cuspidi Tournet. id 1. p. 92. t. 92. Cor. 10.

Salvia pomifera, foliis lanceolato-ovatis integris granulatis,
floribus spicatis, calycibus obtusis Lin. ~~Linn.~~ Syst. veget. 69

Salvia fragifera; foliis cordato-oblongis crenulatis obtusis tomento-
sus, floribus subspicatis, calycibus trifidis Ebeling. Salv. n. 5.

Habitat in Creta, Palastino, Syria

fructibus trispicatis, inferne rubeis, ramosus. Rami ^{rami} Kra-
sice penne anserina, tomentoso-albi solis, petiolata

bifida follicularia, lanceolata, basi ovata, obtusa, rugosa, utrinque
ciliata. Verticilli approximati, sex flori. Bracteae decidue,
acutae scuta. Flores breviter pedicellati, magni. Calyx
campanulatus, magnus, villosus, nervosus; apice coloratus,
conculo tubo amplior, trifidus: lacinia superior rotundata;
inferiores oblonga. Corolla pubescens.
Aliud specimen in herb. fuscovi vidi foliis basi cuspibus, latioribus alter-

Cedare bascot brionibus.

~~multiciliata~~ Salvia tomentosa ~~racemosa~~, foliis palmata data oblongis obtusis in crenatis
calycibus hispidis bracteis lanceolatis, caule herbario.

Habitat in Oriente ~~Aeg.~~ Desfontainii ^{herbario}

caules plures, ercti, semipedales, basi foliosi, uti tota plantam ^{tomentosam}
toso incana, superne inter flores pilosi vesticilli pilosi. folia
petiolata, semi-pollucaria, venosa - subnigra. Petidi foliis longioribus in
cani pilosi. Vesticilli distantes, petiflori. Bractea calycis brachiorum
calyx capax fructiferus campanulatus, magnus, membranaceus, ver-
sus: laciniis rotundatus.

~~of all the world's nations~~
~~of all the world's nations~~

~~Prospernum orientale~~; foliis linearibus angustis, summitate br. flori peris
Euppaniculatis pubescens. La Marv. Illust. 1. p. 15.

Habitat in Oriente.

~~Caulis herbaeus ramosus, cotyle rotundata crenata absque
ovulo armato foliis linearibus basi versus ex parte in angusta glabr obtus costula
bris & a crenata flor. in verso opaca ramosa pedunculata alter
no distante folia florula linearia flora longiora.~~

10

incarnata ⁴ Salvia, foliis pinnatis serratis, caulis proeumentibus hisutis

Eting. Salv. n. 15.

⁹ Horminum Chalepense, alato folio, flore rubro. Monis. hist. B.
p. 394. t. 11. t. 13. f. 19.

⁹ Horminum arboreum alati folio, flore rubello Plath. alm 106.
t. 194. f. 6.

Gretosum villosi ^{Habitat in Oriente} ⁴ Salvia ^{longe petiolata, quinquejuga}
^{Caules quadrangulares}. Folia inferiora pinnatas superiores ternata,
^{impari} ^{majore, e qualiter serrata, cum ma} ^{80 pe} ^{sessilia} ⁴ ^{longe}
^{magni, carnei. Semina rotunda, nigra. Eting. l.c.}

[#] foliola ob
longa, nigra
^{apicis} ^{interiora}
minora.

An hui pertinet. Salvia bracteata; foliis pinnatis hisutis, calycis laevis
pubescens, bracteis foliaceis calyce longioribus, verticillatis multi-
floris Brussel hist. nat. Alep. sess. Germ. 2. p. 145.?

nutans *Salvia* foliis cordatis inaequaliter basi exstipis, caule nudo, spica ante flore
Scandam vernis N.V. p. 72. 46. Sp. pl. 39. 32. Elleng. Salv. 47
Salvia foliis cordatis obtusa crenatis, spicis florum nutantibus Act. Petr. 1747
p. 378. t. 14

Salvia caule nudo spica florente pendula Hall. Com. Got. 1751. p. 210. tab. 11

Habitat in Imperio Rutheno 4

- Caule errectus oblique tragoeus pubescens ad medium et inferne foliis us
superioribus aplyllus. Folia radicibus cordato oblongo palmaria vel
frithamda supera glabra subtus vellosa cinerascens flos alter
basior panum inferius profunde inaequaliter crenata obtusa.
Petiolis foliis longioribus folionem. caulinam duum plana petola
ta fit nudura ruficalem. Racemi ad apicem caulei
plures oppositi & iuxta quoad ripollentes nutantes. vestitelli
s. vel roffosi. Brachia cedato, nervosa acuminata. Palycas
conversi non reflexi fructu i latro superiori minute dentatae open
se bidento. Corolla saturata cineri interdum albi

cordatis oblongo crenatis

foliis oblongis basi inaequaliter cordatis exstipis caule nudo

spicis ante floriferam cernuis

interrupta ¹¹ Salvia foliis interrupte pinnatis, caule frutescente erecto Schousb. obs.

1. p. 10. t. 1.

Habitat in Mauritania Schousb. loc. 5

Caulis simplicis, tri-quadrangularis, inferne glaber, superne villosus.
Folia petiolata, bipinnata et ultra, interrupte pinnata: foliolo quinque
maiora, bispinositata, brevissime petiolata, oblonga vel lanceola-
to-oblonga, terminale bi-tripinnata ^{unum, duo vix quartum} folio pro minori, altera
latera basi eis breviora: Duo ~~et~~ ^{et} ~~et~~ inter majora, subrotunda, sessilia
multo vix minora; omnia crenata, obtusa rugosa, subtilis albidio tonante-
ta. Bractea ovata, obtusa, brevis sima. Verticilli remoti, per florae flo-
ribus pedicellatis. Calyx tubulosus, ampliatus, villosus - ramosus,
sulcatus; labium superius tridentatum, dente intermedii brevissime mi-
nore bifidum. Corolla magna, albido-coeruleens: galea bifida, extre-
mum rotundata.

~~nudicaulis s. foliis radicibus lanceolatis negoſi ^{erupti} venatis, caule sat aphylio
Salvia mesjeriae floribus verticillatis, foliis cordatis; caule pubnudo,
foliis oblongis negoſi ^{erupti} pubnatis 800 f. deca pug. 10~~

~~Habitat in Arabia~~

~~Folia omnia radicalia protervulae, primo ramificatione attenuata
bipinnata ^{subpetiolaria} bipinnata ^{subpetiolaria} subpetiolaria. Caulis petiolaris, aculeo ^{subpetiolaris} Tetragonus. Calyx
pubescens et Corolla s. verticillata. Bractea collata~~

12 # *Salvia hispida viscosa*, foliis interne pinnatis, foliolis oblongis crenatis, basi
alatae, lvs. brachiat. in squamulis terribus, calyxbus inflatis
Salvia orientalis foliis alatis obscurae videntibus odore *Salvia vulgans* Tourn.
ref. Por. ~~II.~~ secundum ^{hybrorum} ~~Vaillantii~~

Horminum chalepense alato folio chaperense, flore magno subfusco
Mon. hort. 31 p. 394. 3. II. t. 13. f. 19.

Salvia orientalis lat-folia hispidissima viscosa pinnata, flore & calyx
purpureis inodora Boch. Legib. 1. p. 167. t. 167.

Habitat in Oriente & Asia

Cypriana *Salvia* pinnata; foliis lyrate-pinnatis in ^{sys} Veg. 72 Eting.
jubat Herbaria Salv. no 14

Vaillantii Habitat in Oriente

~~Discretitione~~ Pauli ad scandens, Tetragonus. Solia petiolata,
interne pinnata ^{imper} ^{bif.} lvs. : pinna alterno-petiolata, re-
mota, oblonga, inequaliter crenata, latere interior brachio, intimo
minore, terminali maxima. Pedunculi terminales, elongati. Flores ver-
ticillatos, axillaris, remoti, utrinque soli vel quatuor. Bractea
parva, orato pubescens, acuta. Calyx magnus, unicostatus, obliquus, trinervius
denticulatus, coloratus. Corolla purpurea; labium inferius superiore multo major

pulosa Salvia foliis cordatis obtusis perditis pedicellis utrinque racemiisque pilosis, bracteis
lineariis lanceolatis pedicellis brevioribus

Habitat in Pene Dombey herb fructuosa

Pauli herbae eae; erecta, superne bifida; pilis raro adpresso. Solia breviter petiolata, remo-
tissima, polliciana vel ultra condita, oblonga, obtuse ferrata, supra nervosa, nervis ^{bus} canescens
fibris, subtus pallidiora, venosa, utrinque pilis raro. Pedicelli bifurcatura et apice ra-
morum. Verticilli 3, orthoflori. Flores ericti. Pedicelli ^{per} calycis pilosi, vix unguiculati.

Bracteae linearis lanceolatae, pedicello breviora. Calyx nervosus, longitudine calycis pe-
dicelli, trifidus; lobis acutis, acutis. Corolla calycis parum longior; galea pulsa, parum
curvata, fimbriata et pubilla parum brevior. Semina glabra, venosa oculis armata.

monte-folca

acetabulosa 13 Salvia foliis oblongis crenatis rugosis inferioribus vernatis superioribus simpliobus, calycibus campanulatis patentibus
Salbej Rauw: hoc. I. p. 121.

Salvia orientalis peregrina Rauwolfi. Gesn. op. Schmid. D. I. p. 131.
t. 12. f. 103.

Salvia orientalis, frutescens, foliis crenatis, acetabulis moluis
Tournef. Cor. 10

Salvia acetabulosa; foliis obovatis dentatis calycibus patentibus
pilosis; caule frusticoso lin. max. 25. Et lin. gal. n. 6.
Habitat in Oriente. Est herbario Tussiori.

Caules suffruticosi, ascendentes, pilosi. Solia inferiora longe petiolata, terminali-pinnata: foliola oblonga vel ovato-subrotunda, obtusa utrinque villosa, pubescentia, terminale fere pollicare late salia triplo minora; folia subinfimo verticillo decipit, evanescere solata. Vetricilli est-Septem, a medium infra medium caulis incipientes, octoflori, viscosi. Bractea cordata, vix longitudine calycis, rotata. Calyx er. magne, nervosi, pilosi, trifida: Lacinia

ovato, acuto, colorato. Petolla calyce angustior, glabra.

~~Hanc quoque eidi in coll. herb. Tussor Aliud specimen in herb. Turzio vid. quoque
cum saquidate synonymo~~ Salvia orientalis, foliis alatis, majoribus et serratis Tournef. cor. II. 8
An folia omnia interdum simplicia?

Aug 1780

17th

Aug 1780

rose folia¹⁴ Salvia foliis pinnatis in ariō, foliolis serratis; calycibus ringentibus.

Smith ii. ined. l. p. 5 - t. 5.

Salvia orientalis, foliis olate minoribus et erubatis, odore mari Tour
nef. Com. p. 11. En herbario Vaillantii

Habitat in Armenia. Herb. Massi 4

Paulis suffruticosus; palmaris vel ultra, adspersus pilis albidis, inferne ramosus. Ramū simplices. Sölle pedicelata, bi-juga: foliola
pedicelata, terminale semi-pollucare, lateralia minora, obvoluta,
supra lineata, villosa, subtus invenia. Spica terminalis, brevis.
Flores oppositi vel utrinque gemini, breviter pedicellati. Bractea
orato-lanceolata, in cono ^{cibengae} / calyce longiores. Calyx bilabiatus
inclusus: corolla labium superius tridentatum, inferioris bifidum
dentibus in setas breves attenuatas, oratio. Galea villosa

Varia foliolis lanceolatis, ultimo saepe concavis, paucis
majoribus majoribus. an hui pertinet Salve

~~vulneraria~~ Salvia

~~folia~~

Salvia orientalis foliis alatis amplioribus non crenatis odore mani Tournes. Cor.
frag.

Habitat in oriente herb. Kuf.

Caules suffruticosi, pedatae, simplices; obtuse pedunculi, e Tomento Veneris fimo supercice
one ann. Solia petiolata, pennata, 2 puga. Soleola subpetiolata, terminalia pollicia
re, in tenor 4. 2 plo vel 4 plo minora, supra eternata, in extremis, subter villosa,
fibras centra, nervosa. Petrola villosa subpetiolata. Verticilli remoti. Bractea
orata. Calyx villosi, purpurei, quinque fidi: laciniis orata, acuta. Corolla cyl
ica dimidio longior

8 Cabiofolia

vulneranifolia 15 Salvia foliis pinnatis, foliolis linear - lanceolatis integrerninis,
bracteis ovalis acut attenuatis calycis squamulis

Salvia orientalis, foliis alatis non crenatis odore mari. Tournef.
cor. II. fida herbarii Vaillantii

Salvia Blabosifolia; villosa, foliis subbipinnatis: pinnae bi-
g. tripartitis, linear - lanceolatis, integris dentatis; verticillis
ppicatis. La manth. in Diar. hist. nat. 2. p. 44. t. 27.

Salvia taurica Habl. Taur. 202. n. 33.

Salvia vulneranifolia; foliis pinnatis integrerninis, foliolis ver-
miculati maximo Welden. Spec. pl. 1. p. 149.

Salvia Habliziana; foliis pinnatis integrerninis, foliolis lanceo-
latis subequalibus: superioribus geminatis Welden. in Diar. bot. Schindler
1799. p. 289. t. 2.

tenuifolia

13 foliolis angustissimis, inferioribus subbipinnatis

Habitat in Tauria Mayer Pharm. cul. Stettiniensis, in Armenia ~~et~~
~~hostis~~ ^{ensis} ~~parvum~~ et herbarium Vaillantii, β Rudolph. Prof. Petrop.

Tanacis desquipedales, δ simplices, obtusa et rugosa, superne a omento te-
nus pino incani. Dolio patiolata, in feriora quinato-pinnata; pinnis Termit-
natis sopae quinco, superiora ternata, supremo tripartita: foliis subsessilis
veste

villoso - subcanescens, nervosa, ultimum pollicare, lanceolatum vel oblongum, lateralia
et opere duplo vel triplo leviora minora. Petioli villoso, pubescens. Verticilli remoti, bi-quadrati
ante - est flori. Bractea infimo calyce parum longior, superiores ejus longitatis.
Calyces campanas lati, villoso, interdum purpurei, nervosi, bilabiati. Labium superius
tridentatum: inferius bidentatum; dentibus acutis. Corolla fere pollicans: galea vil-
losa. Volutis ceras superior, longior: ambo arctenifera.

Varietas β. Differt: foliis angustissimi, inferioribus sub bipinnatis, vel pininis opere tri-
partitis, facile fere Scabiosae columbario: calycibus testibusque majoribus minor-
ibus villoso! Corollis majoribus. An hoc p. pinini folia Pallas. Taur.?

Planta hodi Parisini, que si specimen hebarie Vaillantii in oraniis
conveniunt cum specimine ab amicis. Meyer missum, Cum est hebarie Tour-
nef. unicum synonynmum in hebario Vaillantii transiit, vix dubito quin eadem sit
~~be~~ s. vulnesariorum Wildenowii, suppecor enim quod illa ^{descritto} corollam regundam
Julio Schleimani adumbravit. Sic quoque persuaderem, quod Lamarkii s. Scabiosae
folia non differunt, cum fructuosa eam quasi in Tam in hocco Parisiensi quam in her-
bario ippicis, nec alio modo videlicet supra descriptam. Soli soli quidem latior et
Lamarkii terminali subserratum perfracte sericeo secundum figuram b. c. sed vero
utilema terminali subserratum perfracte sericeo secundum figuram b. c. sed vero
que ac
penicilla
hoc differentia sericeo milie e culturam ^{penicillata} Potnam dat Peruano, sed unicuique notum est
quam irrenescere loci notabilis plantarum in hocco indicatur. Demum bracteas, calyces et cor-
ollas in s. Hablitziano, et p. prote attendit. Tercies foliolae terminalia ^{penicillata} que sunt in Lariis foliis

16 *Salvia* foliis inferioribus bipinnatis, & superioribus pinnatis
foliolis oraliter dentata sinuato-dentata, superemis indutis lanceo=
stis +

Salvia Komph. exot. V.P. 387.

Salvia japonica; foliis bipinnatis glabris Thunb. fl. jap. 22.
f. 5.

Habitat in Japonia

Paulo simplex, erectus; pedulis et bipedatis. Solie petiolata.
pinno subpetiolata. Panicula trichotoma: pedicellata,
collata verticillata. Bractea lanceolata, glabra. Calyx
hispidus, bilobatus, quinque dentatus Thunb. L. c.

~~Fulgens~~ Salvia foliis cordatis ac uti crenatis nigrofisi, verticillatis pubnudis, cuncte per
bacca

~~Salvo fulgeno~~ foliis ovato acutis cordatis crenatis, nigrofisi floribus vesti
ciliatis fulgidi Cas. et de ser. pug. 15. Tab. 23.

Habitat in Mexico 4

Caules Tripedales, Tetragoni, fibris scabulis, rami erecti patulis. Folia subter
vomentosa. Verticilli sex flor. Bractea secundum acuta. Calyx beloha
tus glaber striatus. Labio superiore integrum inferiore bifido. Corolla
longior petiolaris, coriacea fulgens simia. Labium superius late
geminum apice villosum. inferius trifidum lacinias laterali
bus revolutis, intermedia crenis tribus. Stylus apice barbam barbatu
Cas.

non vidi

17

paniculata ~~#~~ Salvia foliis obovato-cuneis formibus denticulatis caule glanduloso
sciente Lin. Mant. 25 et 511.

Salvia minor ethionica foliis chamoleagni asperis Breyne. Lant. 169. t. 5.

Mons. Hist. 3. 3. II. t. 16. f. 13.

Salvia chamaeleagnae, foliis cuneis formibus caninatis base attenuatis
superne serratis, floribus racemoso-paniculatis Brey. cap. 3.

Habitat in Cap. 6. Spec. 5

Stems erectus, obtuse tetragonous, purpurascens, ramosus. Ramuli villosi in
basi, scabri. folia nisi semipeltinaria, breviter petiolata, base atten-
nuata, superne serrata, juniora integriformia, costa villosa, scabria
scuta, pamum acuminata. Panicula brachiatæ; sedunculis inferiori
bus ramosis. Flores oppositi, pedicellati. Bractea oblonga, aliud, deci-
dua. Calyx majestulus, campanulatus, pilosus, purpurascens, den-
tibus labii inferioris oratio, acutis, subcuspidatis, geminis, superioris
terni. Corolla purpureo-violetta.

~~graveolens~~ Salvia

~~Silacea aggittata fructuans foliis spinosum
Habitat in Egypto et Aegyptio et Asperu~~

Paulis fructuosa. Rami villosum spini. Sola petiolata, bipinnata, sursum sensim
minora, cordata, inqualiter crenata, inferiora subpinnata, obtusa, utrinque rugosa,
crassa, villosa incana. Pedunculi superne 1-2 pinnatae. Verticilli 2-3. approxima-
ti, efflori, hermafrodis. Bractea cordata, attenuata, calyx brevior, supra glabris.
Calyces breviter pedicellati, campanulati. Labium superius, ovatum, indivisum, infe-
rius bifidum: laciniæ acuta. Corolla galea linearis falcata, style brevior, pileosa.

^{pernati}
afriana¹⁸ Salvia foliis inferioribus ^{obtusis} ^{subrotundis} basi truncatis dentatis, superioribus oblongis
subintegerrimis, calycibus hispido-velutinis

Salvia africana frutescens, foliis scorodoniae, flore violaceo Com. host.

2-p 101. f. 91.

Salvia africana; foliis ^{subrotundis} pernatis; basi truncatis dentatis
Lin. Sept. Vay. p. 71. Mell. Dat. n. 11. c. 150. v. 10-225. f.

Habitat in Cap. b. spic., locis argilliosis t.

Rami purpurascentes, subcanescentes. Solia sit unguiculata, inferior
subpetiolata, superiore petiolata, serrulata, basi dentato-pubicollis,
superior et juniora sessilia subserrata vel integerrima; omnia sub
quo reticulata, Tomento tenue & immo iniana, supra viridiora. Spicæ
terminales: verticillis ^{triangularibus} floræ. Bractæ rhomboides, acutæ, calyx
breviores, extus pilosæ. Calyx campanulatus; dentibus obtusis.

~~foliaginodes Salvia~~

~~Habitat in Carolina Herb. fuis.~~

~~Affinis arvensi. Caulis oculo armato villosus. Solea lanceolata, supra glabra, ob
fissure nervosae, subtiliter venosa, venae majoribus oculo armato villosi et punctatae: flo-
rula integerrima. Racemi axillares, superne, et ex apice, 3-4 pollicares. Verticil-
li remoti, pauciflori. Bractea subulate. Calyx exanimis frustulis; labium su-
perius oratum, inferius levigatum. Corolla calycina triplo longior. Galea villosa~~

colorata 19 Salvia foliis oblongis subintegerrimis lanceis, calycibus pilosis fructu-
feris grandefactis venoso-reticulatis

Horminum agnacum frutescens, cisti fenniae foliis subrotundis
mois. hist. 3. ~~B.~~ 11. t. 16. f. uer.

Salvia colorata foliis ellipticis subintegerrimis Vomentosis, calycis
limbo membranaceo colorato Lin. Syst. Veg. p. 71

Salvia integrifolia Mill. ii. 150. t. 225. f. 1.

Habitat in Q. l. speci arenosa manis littoralis

Salvia barbata, foliis ovaliis subintegerrimis rugosis Vomentosis,
calycibus dilatatis venoso-reticulatis hispidissimis La March. illustr.

1. p. 72.

Cop.

Habitat in ~~Q. b.~~ speci arenosa manis littoralis

unito pedali: Rami ^{superiori} obscure Tetragonoi, canes centes. Solia pediolata, irix pol-
lio aro, subtus Terminis venoso-Subroso et majores canes centes, obtus ^{et} rima:
inferiora perata, ramis aunculata, superiora integerrima. Spicula Termina-
ter. Verticilli ~~flori~~ flori. Bracteae rhomboides subrotundis, parum acute mentatae. Co-
lytis campanulatus, hirsutus, deum amplectus, scaricosus, reticulatus, angusti-
neus.

quodri

21

~~mexicana~~ Salvia foliis ovatis utrinque alumenatis serratis l. V. 70. 25. Blang. f. 35 Aug. 30
+ ~~Tilarea mexicana~~ alispina, facie Heliotropii Bill. Clth. 339. V. 254. f. 330

Habitat in mixtis humectibus 5

+ ~~Funaria~~ Heist. prof. ad Epist. Burckh. p. 92 Tab. 1.

Caule erecto ramoso rami purpurei. Tolia basi integerrima, rugosae, pubescentes
fomentosa, petiolata. Verticilli florali in racemum longum digesti. Calyx
longus hispatus. Labium superius integrum, inferius bifidum. Corolla pubescens
tubus calycis multo ~~longior~~ major cymbiferus Schreb.

Ramica lana doto, calyx brevior. Polystachys rufa (L.) Desf.

Covar. v. ad Dijon 1. Aug. 16 Feb 26

Rami meani. Tolia attenuata, subtus mollescens nervosae, nervi supra
nervis exani. Racemosi fructu maturi: verticilli 12 floris 15, calyx ante alter
frustra, vellosa: labium superius ovatum, indistinctum, inferius bifidum
lacinia exalvata, ciliata superior. Corolla calyx cimicis longior: zalem
recta, obtusa, sessilis: inferius estus hispatus hab. f. 1.

~~non~~

aureo²⁰ Salvia foliis nanis inferioribus basi truncatis dentatis superioribus
oblongis integerrimis, calycibus fructiferis ampliatis.

Salvia africana frutescens, folio pubescente flore mag-
no aureo Com. hort. 2. p. 103. t. 92.

~~Salvia aurita~~. folio pubescens integerrimis: basi truncatis
dentatis Lin. Syst. Veg. 71.

Habitat in Cap. b. Specie justa circulos⁵

~~infusione~~ Umbra obscura vel rufa, tenui incanis. Voles ^{semipole} supra
~~Ciliata~~ in petiolum attenuata, obtusa vel acutissima, cinq^{ue} a tenui
to tenue glaucescentia, coriacea, avenia, rudimenta foliacea ramorum
et omnibus articulis. Racemis terminali, erectis. Flores oppositi.
Bractea ovata. Calyx campanulatus, ^{racemosus} villosus, canescens: lacinias
ovatis, obtusis, fructiferis amplior; limbo subicundo, venis capillis
reticulatis. Corolla magna.

regla S. foliis deltoidibus venatis, calycibus tubulosis coloratis. Cava pedunculata terminalibus geminis unifloris. Cavan. t. 5. pag. 33. tab. 455

Habet in regno mexicano 4

Paulus orgyalis, ratnophorus. Solia petrolii longiora, subtillosa, profunda ^{tenuer} pedunculi brever. Calyx semi-pellucens et ultra purpureo viridi, tripartitum ovato, acuto, nervi novem venosi. Corolla coccinea, intra loborum incisuras ventricosa: Labium superius elongatum, concavum apice emarginatum; inferius dependens, tripartitum: laciniis obtuso medicei paulo longior. Cavan.

nivis 20.

Salvia glauca, foliis lanceolatis integrimis albo-tomentosis,
ramis desiccatis. Thunb. prod. p. 96.

Salvia lanceolata, foliis lanceolatis integrimis brevissime tomento-
sosis, calyculis obtusis corollam tubo brevioribus La Martini. illust.
t. p. 72.

Lit herbaris La Martini

Habitat in Cap. b. Spec. Herb. La Martini et Rozeni 5

ramis ramosus, rigidi: Rami superne testiculi, in coni.
folia inferiora petiolata, superiora testicula, pollucaria, levigata,
aventia, acuta. Racemi terminali. Flores oppositi,
oppositionibus, ~~tri~~ pedicellati, brevi pedicellatis. Bracteae
parvae, linearis. Calyx infundibuliformis, semi-pollucaria,
triangularis, villosus: Corolla oblonga, obtusa, tubo corolle ampli-
or. Corolla pollucaria: galea pubescens, recta. Styles galea
longior.

Arbus quatuor

~~patula~~ *Salvia silvosa*, foliis inferioribus cordatis inaequaliter dentatis superiori
bus cordato-lanceolatis, bracteis calycibus equantibus.

~~Scarsa~~ *Salvia Lusitanica*, glutinosa, ampliissimo foliis Tournes ^{p. 179} casta.
Habitat in Lusitania - Heb. Hispaniæ.

Tacca Sol. clarea. Caulis herbaceus, villosus. Folia ^{inferiora} imparipinnata,
petiolata, grosse acutaque serrata, venosa. Verticilli plures
remoti, villosi-virores. Bracteæ cordatae, concavæ, acuminatae.
Calyx cuspidati. Corolla alba, glandulosa punctata.

non virale forte mitad. epp. Salvia et Tacca. orient. & pub. nomine portante

²²
dentata Salvia foliis linearibus oblongis serratis, verticillatis bifloris, calyx ibus
obtusis. Hort. Kew. I. p 37.

Salvia nigra; fruticosa, foliis lanceolatis dentatis omentosis, ramis erectis
virgatis Thunb. Prod. 96.

Habitat in C. b. ppe 5

Strobiles semipedales, ramosissimi: Ramis superne de V. agone sub
canescens ~~lato~~¹⁸. Folia petiolata, unguicularia, angusta, et angue
interna, spicata terminalis, 13. alte rhomboides. Calyx late
membranaceus, campianulatus, magnitudine so africana
minime colorata apicibus erectis albos, prosternum basi, bilabia
tus: lobis ternis obtusis.

~~Sylvestris~~ Salvia foliis cordatis lanceolatis ~~undulatis~~ undulatis bi-jugatis maculatis acutis,
bracteis coloratis florae brevioribus s. N. p. 69. II. Spec. pl. 34. g. Taiqu fl. Austr.
Tab. 212. + Scop. fl. 1. 32. Ethn. s. 37 pag. 34.

Horminum sylvestre Matth. species

~~Horminum sylvestre~~ Claph. 2. p. 31.

Verbascum salviolum L. f. c.

Horminum sylvestre salviolum majus vel maculatum B. Pl. 239.

Habitat in Austria inferiori, Bohemia agronum marginibus, vineis &

~~Sylvestris~~ l. foliis cordatis negofo serratis, bracteis coloratis florae brevioribus - acuminata
tib, petiolis calycisque similiis ibus Horst. Kew. I. p. 34.

Ramis erectis villosis. folia infra longe petiolata, superius
breviter ovato lanceolata basi cordata, inaequilatera renata
negofo supra etiam completa cilia pubes. ^{frumento} terminali
repente. verticilli post florae in spicas longas digiti. Specie ante
descripta.

~~superne ramos
ramos~~

floriferentia Tetracycla. Bractea ovata acuminata purpurea
longitudine calycis. Calyx frustis villosus, purpurascens
labio superiore brevissime tridentato inferiore beudo acuto
Convoluta concreta tubo longitudine calycis. Calix superius
petiolis albis punctis glandularibus albido adpresso
per diffusum paucioribus, concubus calycibus

2324 *Verolina* *Salvia* foliis subcordatis obtusis glabriusculis inqualiter obtuse pecto-
ris, calycibus illos viscosis corollam subquadratis
Salvia foliis cordato-ovatis serratis rugosis; bracteis subrecticiliatis
genit, calycibus *vidantatis* Ad. spic. t. p. 10. t. 2.

Salvia *Verolina*, foliis cordatis serratis mollibus, floribus racemosi-
mentis spicatis, corollis ex six calycem excedentibus lin. ~~Ad. 25.~~ ^{25.} *Taiqu-*
collet. t. p. 450. *Ic. var. t. 3.*
Habitat in *Ohio*. Specimen meum communicari *Ordinarii* 85.

Pauli base Rami illori, subia nescienter. Solia petiolata, pollicinae et ultimae, tan-
frutescens ^{mit} mollii, ciuilo armato villo raro ad spessa, tenella parum villosior, magis
quiepredalis: rugosa, ad ultima supra planiora, obtusa, ovata vel bulviflora. Verticillati
septemnover ^{florib. pedicellatis. Hasta cincta} ~~in~~ ^{octo} in singulo verticello. Bracteas
et septem-nover ^{parvi} ~~minutis~~ calycis nervosi, dorso viridioribus, floriferis tubulosis, fructi feri parum
nutantes ^{ampliores} semina oblonga, glabra, loria. *

pyrenaica Salva foliis obtusis erosis, staminibus corolla duplo longioribus s. v. p. 70
obtusis ~~virginea~~

23. ~~Lepid. 36. 46~~ Etling. p. 42. pag. 44 *

Horminum pyrenaeum glutinosum Angustis folio Herm. parv. 187. f. 187.

+ Habitat in Pyrenées Ab. Quos.

Solarea pyrenaica, glutinosa, foliis spinatis Tournet inf. 174

Pauli bicarinatae et altero velloso - rufous ramosa. Sola oblonga, margine serrato crenata acutu-puncta rugosa vellosa velutina glutinosa petiolata. Verticilli post florae racemosi. Covula concava labrum superius paleatum. Styles e labio superiore prominent Schreb.

Folia inferiora petiolata, spinulosa, cordata, dentata sinuata obtusa, venosa superne glabra, subter nervis rare pilosa: superiore sessilia oblonga. Pedunculi terminalis, elongati, excurvi. Verticilli quadriflori ramosi. Pedunculi excurvi patent. Bractea cordata, attenuata, reflexa. Calyx et corona punctulatus villosum: labrum superius oratum, bidentatum ascendens, inferius trifidum; lacinus lateralis evanescens, intermediae subulata. Rovella oculo armata & parva pilo punctata pilis obsoletis. Galea foliata, acuta

non adi

247 Salvia foliis cordatis obtusis crenatis rugosis subtus incarnis, calyculis villosis
viscosis corolla amplioribus. Pubescentibus.

Salvia dominica; foliis cordatis obtusis crenatis pubescentibus corollis
Calyce angustioribus Lin. Spt. Vega 70 Swartz. obs. 107. t. 1. f. 1.

Habitat in campus et pratiæ Ætio Indio occidentalis &

Pauli basi frutescens; erectus, striatus, pubescens, purpureascens; ramosus
foliis petiolata, unguiculata vel panunculata, interdum ovata, mollesca molles-
cansque illera, subtus magis. Flores verticillato racemosi. Vertice illave
motu ~~flori~~. Bractea minuta. Calyx et floriferi tubulosus, dorso colora-
~~tus~~ Calyx tubulosus, dorso semina non procedente.

Calyx dorso coloratus, floriferi tubulosus, bilabiatus: labium inferius bifidum; superius indistinctum, facies fenus tubulosus, floriferus compresus clausus. Corolla candida: labus calyce brevior, compressiusculus: labium superius calyce sit longior, subfornicatum, emarginatum, inferius multo maior, bifidum; laciniæ laterales planè scuto, intermedia majora lobata. Filamenta spermia versi medio ad recta. Stigma lacinia rotundatum, lobo altero erecto, altero breviore, apice patula. Richard.

Vancalem s. pendula credit Richard quod quoque suspicet cel. Swartz, unde tom
affines sunt utique sic limites inveniuntur et non nisi uti plantae
spontanea a culta differre videntur.

major. quales sotterne sanguifugae
per herbarium plemente uelutati. foliis petiolatis. foliis
tela exaltata brevior, cordato, aciculata, independente. lacinia uirginiana. lacinia
uirginiana folio leuissimo, minus deinde circata, diffusa, oblonga, minima. lacinia
uirginiana folio leuissimo, minus deinde circata, diffusa, oblonga, minima. lacinia
glandulosa exaltata, pedunculus styliferus, utriusq; uirga non exaltata, lacinia
oblonga, foliis petiolatis, foliis petiolatis, foliis petiolatis, foliis petiolatis, foliis petiolatis

Calamintha
oder

25^a

Salvia foliis ovaliis crenatis incisis, pedunculo axillari bis-
verticillato.

Habitat in Domingo Desfontaines 5.

Dicitur: Rami tenuissimi, subpunguiscentib; superne canescantibus;
Tetragonis dolia petiolata, iuxta unguicularia, sursum sensim minor,
ut inque mollia, subtus major canescens et vidente fere imperceptili; tri-
quaternaria quinque nervis, avenia, margine ut inque crenis tribus val quatuor
ramulorum paris, obtuso. Pedunculi axillares, ut inque folio triplo breviores,
in axillis inferioribus uniflori. Calyx superne parum amplior, nervosus, subciliatus, bilabi-
tus, lobium superius indistinctum, inferius bidentatum, dentibus acutis. Corol-
la calycis duplo longior, coenobio lobium inferius bilobum, subtili, ut
galea pubescens: lobi laterales linearis oblongi, intermedii latiori
et longior obcordatus. Genitalia corolla parum longiora. Stylus super-
ne barbatus, bifidus: lacinia altera, a, brevis, parum latior revolute, altera
recta.

Dominica Salvia foliis cordatis obtusis crenatis subtomentosis, Corollis calyce angustis
nibus l. V. p. 70. 18. null. D. 1. - y. Sp. pl. 35. 13. 188. obs. pag 18.

Habitat in Domingo

Caulis basi frutescens exsiccatu pubescens purpureopurpureus ramosus. Folia petiolata
cordata; crenata subrugosa parva, molles subtillespora coarctata
flexu verticillata rameosus. Bractea minutus linearis. Coleya glandulosi
specie a ferulina. Differt omniaco parum

Calyx oblongus, tubulosus, 2 lobatus. Labium inferius bifidum, superius entegrum
viscido pubescens, capite corolla clausus. Corolla canidea, tubus calyx brevior
compresso culus; calix superius calyx non longior, emarginatum, sulformicatus
inferior multoties major, trifidum; lacrima lateralis planiuscula, intermedia
majora lobata. Ostatim spinae versus medias dentata. Stigma lanceolata alter
lobus erexit, alter leviter, apice rotula retorta.

26
occidentalis Salvia foliis erato serratis, spicis latis, bracteis cordatis anista
tis, calycibus glanduloso-pilosis
Verbena minima Chamom. folio Sloan jam 64. his t. 1. p. 172.

t. 107
Salvia spicata repens, melissa minoris folio, floribus fasciculatis
alternis Brown jam 117

Salvia occidentalis; foliis ovali serratis spicis latis, bracteis corda-
tis subtrifloris Iwantsch prod. p. 14. fl. Ind. Occid. 1. p. 43.

Salvia procumbens, foliis erato rhomboidibus serratis caly-
cibus pilis glandulosis hispidis caule procumbente Le Ma. BN
illustr. 1. p. 72.

Habitat in Antillis. ♂

Caules ascendens, ramosus, pedales, diffusus, Vetricosus, glaber. Dolia
pediolata, sit pollicaria, basi rotunda acuminata; supra pilis rufis adpersa,
pubes glabra. Petrolis pubescentes, rubri. Rameo parvo. Calyx editato-
angulatus, parvus, indentatus. Corolla cerulea.

~~barbata Sal. folia orata subtrigemini rugosus tormentosus calyculis dilatatis venoso
reticulatio rugosissimis La. Mark. T. Enc: pag 72.~~

~~Habitat in cap. b. sprei
varia folia minus acutioribus~~

non vidi

tenella²⁷ Salvia foliis cordatis, caule glabriiformi repente, spicis ad secundas
tibus sexarum prod.^{p. 14. Pl. 2.} Fl. 2. 2. p. 45. v. 2.

Habitat in glareosis et graminosis montium altis Timorum Jamaicae
Quadrin-quinque掌叶，^{pollicaris;} inferne filijo repens; subdivisus, ad secundas
stipulas, pubescens. Dolia petiolata, semipollicaria vel panus ultro
remota, profunde serrata, obtusa, supra subnervosa, illuc raro ad spicas
orulo armata subtus venoso pallidiora glabra[#]. Verticillata^{quadrata}: floribus gestis
to punctata basi pedicello, minutissimae coeruleis. Bractea ovata, minutissima
Calyx & Tridentatus, pilosus: pilo-glanduliferus.

Triloba Salvia Tomentosa foliis petiolatis rugosissimis. In lobis: lobo intermedio producto
oblongo; lateraleibus ovato obtusis. L. V. p. 72. 40. Suppl. p. 80.

Habitat in monte Syphili t^h

~~Habitu Sal. officinalis. Tota cano Tomentosa. folia olea ternata
olea semplicet. differt ab officinali bracteis longitudine calycum
rugosissimi non crassi non venibus subnem branacei calycibus nudi
ruber deinde ruber latioribus. Bractea cordata~~

bracteis longitudine calycum

tiliofolie ²⁸ Sabice foliis cordatis rugosis crenato-equaliter serratis acutis,
calyculis glabriusculis aristatis Symb. bot. 3. p. 7.

Habitat ——— 4

Pauli eretius; villosus ciliatus, obtuse tetragonum. Solia petiolatae
bipinnatae, via pubescens, pubescentia prosertim venosae et leviter
rugosa. Petiolus longitudine fere folie. Verticilli ^{post-ante} ~~post~~ folio. Brac-
teo subulata, decidue. Calyx campanulatus, lineis ^{ante} et ~~ter~~ pilo-
sus: latius orati acuminatis superior in virga. Corolla calycis
parum longior, coerulea. *

Valentina Salvia

Barrel. obf. 233. 4 cor. 317.

Habitat in deserto Mariae Valentini herba tuff.

Tacces s. nemorosa. Paula villosum, superne canescens, herbaceum, ramosus: folia
sessilia, cordato lato lanceolata, acuta, inqualiter serrata, venosa, subrugosa,
supra glabra, subtus villosa. Pedunculi terminaler. Verticilli 6 floribus
stantes. Flores sessiles. Bractea cordata, valde attenuata, calyx longior, villo-
sa, basi colorata. Calyx coloratus, striatus, villosus: Labium superius adspic-
tum, oratum: inferius bifidum; laciniis crenulatis. Corolla parva: galea
villosa

Micrantha 29 Salvia foliis cordatis crenatis bullatis margine undulatis obtusis
glabris, bracteis ovatis calyx brevioribus
Habitat in America coldiore?

Ramis erectis, pedalis, panum ramosi, viridi - canescens. Folia
petiolata, pollicaria ^{venosissimas} _{inferiora} crenato - subrotunda, minora; sup
eriora opice declinata, sessiles, tenui : sedimenta ramelorum
est aciculis omnibus. Verticilli sex flori. Flores pedicellati, minuti.
Palycer paleatus, glauerti, villoso - glandulosi. Labium superius int
egrum; inferius tridentatum, panum longior. Corolla exserta: Labium su
perius bifidum; laciniis declinatio: inferius duplo longius; diocesal
bidui; lacinia intermedia longior, bifida. *

Pentauraea phaeolata

~~Carduus et tenuis ericofolii minores, squami et aculei negantibus Tournf. Cor.~~

~~Habitat in Creta hab. Mus.~~

~~Paulo angustatus; lanatus, olate glaber. Sola radicaria sive Pent. grandiflora; lancea ter
minalis interdum lanceolata: superiore sessilia, pinnatifida; lancea lanceolata, integriforme.
Pedunculi terminales; uniflori. Calyx basi subaristatus; olate glaber; synanthe apice aca-
ta squa mula fusa exalata, spine sericeo-pilosa flavo-fuscante; basi lanati, patentis
fimi~~

30 *Lamium submentosum*
plumosa. ~~foliis~~ subtomentosis, ovatis crenatis, pedunculis axillaribus verticillatis, caule
fruticoso, et ~~virgineo~~ subtomentoso + quatuor-quinque
at illuc.
Salvia plumosa: foliis subtomentosis acutis crenatis, pedunculis ~~4-~~ in unifloris, style plumoso. Sl. Pers. l. pag. 26. tab. 37 fig. a
Habitat in monte province Tarmo. languida
caulis angustis, erectus, ramosus. Ramo brachiatilis. Folia petiolata, acuta
venosissima, rugosa, subtus leviter lanuginosa. Pedunculi ~~4-~~ quatuor-quinque in angulo articulati
la folia breviora petiolis longiorer. Calyx bifidus, non rosulatus inter se
Corolla purpurea, extus hirsuta. Calix superior emarginatus. Styles
purpureascens. Sl. Pers. l. c.

patens ³ Salvia foliis sub hastatis crenato-serratis subtus incanis, floribus
axillaribus terminalibusque oppositis.

Salvia patens; foliis sub hastatis crenato-serratis subtus incanis, flo-
ribus oppositis. Cavan. ii. s. p. 33. t. 454.

Habitat in nova Hispania.

Caulis tetragonus, bipedalis, villosus. Folia inferiora petiolata, flo-
ralia subsessilia, subtus tomentosa. Flores superne, peduncu-
lati. Calyx campanulatus, pilosus, labiatum: labio superiore
integro, acutissimo, inferiore bifido. Corolla coerulea: Labium
superius elongatum, concavum, pilosum: inferius dependens,
tripartitum: lacinia laterales obtusa, breves; intermedia la-
go obcordata. Anthere ex pedo. Styles superne barbatus. Ca-
van. l. 5.

Leucantha Salvia foliis lanceolatis rugosis crenulatis, floribus verticillatis
calycibus tomentosis ^{subtus cinereis}

Salvia Leucantha foliis lanceolatis, longis, rugosis, crenulatis, flo-
ribus paucatis, calycibus tomentoso-violaceis (var. f. et desig. nov.)
16. Tab. 24.

Habitat in Mextico

Caulis erectus, Tetragonus, 3 pedales. Folia angusta, longa, subpeti-
ciano tomentosa, Petiole breves. Spica terminalis elongata
verticillata multiflora. Calyx tomentoso-violaceus rectus. Cabium
superius integrum inferius bifidum. Corolla alba. Cabium superius
integrum: inferius trifidum. Styles superius utraque barbatus
var.

regla³² Salvia foliis deltoidibus crenatis, pedunculis terminalibus geminis-
unifloris, calycibus tubulosis coloratis +
Salvia regla, foliis deltoidibus crenatis, calycibus tubulosis coloratis
Cavan. ic. 5. p. 33. t. 455

Habitat in regno mexicano 4
Gaulis orygialis, ramosus. Sola petiolata, subrillans, proser-
tum venosa. Pedunculi breves. Calyx semi-pollinans et ultra,
purpureo-viridis, hispidus: lacinia orata, acuta, nunc
noveremur sic ~~racem~~ venosi. Colle coccinea, infra labiorum
incisuras ventricosa: labium superius elongatum, conca-
vum, apice emarginatum: inferior dependens, hispida vix:
lacinia obtusa, media paulo longiore. Cavan. b.c.

~~Tubigera~~ Salvia foliis ovatis feratis acutis, floribus vestitallatae ¹⁵ ~~fructuosa~~
Corollam tubo elongato villosa
Salvia tubigera foliis ovatis acutis feratis mollebus: floribus fructuosa
erectis, tubo longissimo Cavan. Ge: et Dafur: pl: 1. pag: 16. tab.

25.
Habitat in Monticis 4

Rauli Tetragonum erectus; orgaletis monopodiis - Tolca mollea - Verbielli
fer flori. Corolla coriacea tubis cylind. prolecanis labium
superius integrum inferius trifidum laciniis reflexis. Stylus apice
barbatus Cavan.

Leonoroides³³
~~formosa~~ Salvia foliis cordatis crenatis, floribus ac illaribus ver
ticillatis, caule frutescens

Salvia leonuroides: calyx & labio superiore integrissimo, styllo bifor-
mam barbatum, floribus ac illaribus interrupte verticillatis, foliis corda-
to-crenatis Glossin obs. bot. p. 15. t. 2.

Salvia formosa; foliis subcordatis, corollam galea barbata,
calycibus trilobis, caule frutescente L'Herit. Pl. nov. 1. p. 41.

tab. 2.

Habitat in Peru

caulis ramosus; brachiatus. Rami obscuri tetragonoi, glabri. Dolia pe-
tiola tv, bipinnata, oblonga, obsoleta nervosa-venosa, pubes-
cens, rugosula, subdancetaria. Pedunculi axillares, ^{mentes} ^{adspersae} ~~quinq~~, breves,
uniflori. Calyx lobis tres ovatis, acuti, basi multistriatis, glaber.
Corolla coccinea: galea barbata.

Salvia nodosa foliis cordatis superioribus ovatis deltoidibus, per recto
pedunculis axillaris nodosis, galea hispida L'Herit. Pl. nov. 1. p. 25. t. 41. f. o
affinis ~~formosa~~

nuncinata *Salvia* *scabra*, foliis nuncinato-pinnatifidis dentatis, floribus fructu
verticillatis L. V. p. 72. 51. Suppl. p. 84

Habitat in C. b. f. 4

Hort. Schoenov. 5. t. 8.

Paulis *erectus* *ramosus* *brachiatu*, pubescenti viscosus. Sola inflo.
ra petiolata, ^{oblonga} *oblonga* *sessilis* ^{caulis pro} ^{at} *peltata* et ultra, oblonga
lacinia dentata. Vertice albo-nigra vel nigra, dent terminalis
major. Verticilli plures remoti, 6 flor.: pedicelli breves, in axi
pleri parvi. Bractea calyx breviora cordata ^{opposita} ^{caudata}, *Polyg. dantes* *spinulosa*. Cord.
la coerulea

non vide

34

fulgens Salvia foliis cordato-ovatis crenatis subtus pubescentiis, corollam lobis
Galea villosa, caule herbaceo

Salvia fulgens; foliis ovato-acute cordatis crenatis, rugosis, flan-
bus verticillatis fulgidis Cavan. ic. 1. p. 15. T. 23.

Habitat in Mexico.

Pauci Tripodales; Vellozoni, & Cabrius cul. Nam ex alto-patuli
villis reversio canescens. Tolia petiolata, palliania et ultra, &
utrinque villosa molia, vix rugosa, subtus canescens, obscure

obtusiuscula nervosa: Petioli Conjugatione per folii Racemos Terminalis
ppalmatis et ultra. Verticilli ~~3~~⁴~~5~~⁶, quadri-vel sex flor.

Bractea caducio. Palys campanulatus, glauca, villosus: labi-
um superius dividitur inferius bifidum. Corolla per epiphyllo-
no, coriacea fulgentissima: Labium superius, integrum rectum:
inferius trispicatum; lacinias lateribus revoluta, intermedia trirenata.
Style apice bifurcata barbatus. *

35

nape formos-

~~Chamomylodes salvia~~ caule decumbente, foliis ovatis & renatis subtriangularibus, tomentosis. Casan. 4. 2. p. 77. tab. 197.

Habitat in Mexico 4.

Caules & tomento brevi albovires pro quo pedales. Sola haec
inter petiolatis nigra. vesticilli post florae ad proximatis
ramulos terminantes. Hypoleio oris Bractea ovata adusta deci-
dua. Calyx oblongus. Corolla saturata coerulea longite-
nue calyri. Labium superius formicatum. Corollas

35 34

Salvia foliis cordatis acutis serratis tomentosis seratis, corollis caly
ceduplo longioribus angustioribus Hort. Henr. I. p. 43.

Salvia cotinea; foliis cordatis acutis acutis serratis, subtus molles
nudus Etling. Salv. n. 11. verticillata sub terminali racemo Linn. Scop. p. 80

Salvia cotinea; foliis cordato-oblongis obtuse serratis, calycibus
in positio: labio corolle inferiori amplissimo Mees. Comment.
Gott. 1778. p. 86 t. 1.

Salvia cotinea; foliis cordatis acutis acutis serratis, subtus
molles tomentosis, racemo terminali verticillata Linn. Scop. p. 80

Habitat in Sonda 4

Ramis intanet, folia petiolata, pollicaria et ultra, patentia,
attenuata, acut, venosa, subtus mollescens, equaliter serrata,
serrulis mucronis parvo terminata. Verticilla racemosus
foliis brevibus; sedimenta foliorum in axillis. Verticilli racemosi
~~ex flor.~~ Bractea ovata, attenuata, decidua. Calyx viridis per
puras, angulatas, villosas, tritobus. Labio mucronatus raceme
Corolla pulcherrime subro: laeviora intermedia labii inferioris sub
verte

Holcus major, obcordata. Glomecta exserta. Styles barsum parum incisobatus,
altero latere subbarbatus *

ex Salvia amara flore ciliatoe Mons. hist. 3. p. 3998. II. V. 168.
g. huius pertinet

365

Pseudoterranea Salvia foliis ovatis acutis serratis, cuncte pilosis.
utrinque villosi.

Salvia pseudoterranea foliis ovatis acutis serratis, cuncte pilosis.
racemo terminali sessiliato, cuncte pilosae. ~~Coll. 2. p. 302.~~
2. t. 209. Coll. 2. p. 302. Gori. 1. t. 207. Coll. 2. p. 302.

Habitat in America calidiora 5

Caules erecti, ramosi, tripudali, a pilis longis molibus dense his
fusci. Folia petiolata, bipinnata, basi acuminate, acutae, dentate
venosa. Racemus terminalis, elongatus. Verticilli remoti, sex
fieri. Bractea ^{solda} ovata, acuminate, calyx brevior. Calyx tubularis,
spinata, dorso colorata. *

~~nelotica (Staphoi) ^{can facie}~~ S. foliis ovatis vel oblongo denticulatis supremis cordatis
dentato laci angulatis

~~vestitutus Habitat supreme ramosa
caulis pilosus folia inferiora petiolata superiore sessilia raro pilosa
sub prima verticello dentato angulati. Verticilli sex flor
brevicordata ova excurrente calyci quam breviori dente ornata caly
ci fabulosa~~

~~Solanum nelotica L. Goequ. host. Ital. 92.~~

an facie milo.

37

incarnata ~~#~~ Salvia foliis ovatis acutis serratis glabriusculis, bracteis ovato-
lanceolatis caducis, calycibus brevisimis quinque dentatis +
Salvia incarnata, foliis ovato-acutis serratis: bracteis floribus
brevibus caducis: calycibus parvis quinque dentatis. Cavan. in Ann.
hist. nat. p. n. 4. p. 112.

Habitat in Nova Hispania, ob pulchritudinem in hortis culta
Paulis subpurpureoscar, glaber, exceptis ramis junioribus. Rami
frequenter. Solia petiolo longiora, venosa, supra obscurare vindicta,
bulbus pallidiora parum villosa. Spica decipi pedales. Verticilli
quadriflori: flores breviter pedicellati. Calyx tubularis, villosus
et linea dimidia longus, bilabiatus; dentes quinque, interdum brevi-
acuti. Corolla incarnata, plus quam pollicans, extus panem
villosa: labia equalia: superius integrum. Genitalia corolla lon-
giora. Diffedit a reliquo salvo Americano, calycibus multo minori-
bus respectu corolle quam in omnibus Cavan. l. c. calycibusque
quinque dentatis. Cavan. l. c.

H. quadrivalvis

glandulifera *Salvia*

Salvia glandulifera foliis ovois serratis: verticillis subsessilis: calyci
bus bracteis, ramisque glanduliferis Lavan. in dict. an. hist. nat. 2. n.

4. p. III.

Habitat in Peru.

3839 ~~folia~~
incurva & foliis cordatis acutis serratis, labio colycinis incurvo, corolla galea
bifida. fl. Peru pl. 24. tab. 42. fig. 6. +

Habitat in ~~Cordillera~~ Andes Peru

Ramis hirsutus, bipinnatis, erectus, superne ramosus. Solia longe petiolata,
reflexa, non oscura, rugosa, subtili levissime pubescens, pubescens. Ver-
ticilli racemosi ~~flori~~ flor. Bractea ovata, decidua. Calyx tubulosa-
campanulata. labium superius indutum; inferius lispum. Corolla calyci-
duplo longior, purpureo-coccinea. labium superius concavum; inferior
obtuse trifidum. fl. Peru tab. 42.

4
Quadrinotata

FF

39

⁴⁴ amethystina Talvia foliis cordatis acutis serratis subtus canatis ver
siculis nudi, calycibus trifidis, corollis pubescensibus Smith.
ie. ind. 2. p. 27. t. 27. +
Habitat in nova Granada 3.

Paulis suffruticosis, hirsutis. Solia petiolata, cordato-oblongas,
rugosa, supra viridia hirsuta, subtus sensim canata alba.
Petioli hirsuti. Verticilli remotiusculi, subtus ex florib. floribus per
ellentis, hirsuti. Calyx campanulatus, angulatus, apice colo
ratus, intus glaber. Corolla calyx duplo longior, viridis tunc
violacea. Labium superius fornicateum, integrum, extus
densissimum barbatum, margine tantum rufum; inferior
trilobatum, extus pubescens. Stylus hirsutus. Smith. l.c

~~polyglaucya~~ Salvia

Habitat

~~herb. suspir.~~

Caulis herbaceus, erectus, fuligatus, ramosus, subcaneus. folia petiolata,
orata, sasque pollicaria, serrata, verisimiliter supra glabra, subtus rugosa, molles-
centia longitudo. Bractea minute pinnata, Verteilli quadriflor. Flores
secundi. Polyg. brevis, in canis, dentibus tricus tuberosatis. Corolla latissima
superior recta in aqua. Corolla unguiculata

o.

Baranell-

tubiflora ⁴⁰ Salvia foliis cordatis crenatis subpilosis, floribus necemosis ^{secundis}
longioris subgeminatis, pedicellis calycibusque lanatis t.

Salvia tubiflora; foliis cordatis crenatis subpilosis calycibus tripli-
catis, corollis longis semi tubulosis, staminibus ex parte Smith. et. em.

2. p 26. t. 26

Habitat lino Dombe. Et herbario Thunni.

Paulis suffruticosus, triatus, superne illosus. Folia petiolata,
venosa, supra glabrescens, subtus pallidiora, nervis marginisque
pilosus. Ramei terminales (consecandi?) bracteo ovato, mu-
cronato nervoso, piloso, decidue. Calyx tubulosus, parum ven-
osus, nervosus trifidus: lacinia subobtuse, acuto, inhu-
mabre. Corolla calyx triplo longior, tubulosa, incurva, lobis
trebus pilosa: lacinia subobtuse. Stamina ~~8~~ octo.

~~amethystina Sal. foliis cordatis acutis serratis subtus canatis, vestitelli nudis
calycibus trifidis cordatis pubescentibus Smith &c. fof. 2. tab. 27~~

~~Habita in nova granada 5~~

non ordi

47 *Salvia*
Cuspidata foliis cordatis inqualiter serratis - subtus punctatis, verticillat remota
lebris calycinis & ramos pedatis +
Salvia cuspidata, foliis cordato-sagittatis inqualiter serratis, pinnis longis,
verticillis multifloris remotis, calycibus cuspidatis fl. Pers. 1. p. 23

Tab. 40 fig. 6.

Habitat in collibus Cheuchin 4

Caules suffruticosi, oxy ali erecti, obtuse tetragoni. Rami brachiat
pubescentes. Solia breviter petiolata, venosissima negra, subtus minia
to-punctata. Racemi terminali. Verticilli ~~flor~~ # flor. Bractea
ovata, acuminata, concava, punctata, decidua. Calyx bilabi
tus, oblique canaliculatus hispidus, incarnatus punctatus, labio in
superiori bifido: cuspide intermedio longior. Corolla coenile, ca
lyx duplo longior fl. per l. l.

42. 47. ~~Apula~~ ^{aria}
acutifolia. foliis cordato-oblongis, obtuse serratis, triangulis tomentosis caule
fructicosa, floribus secundis +

Salvia acutifolia: foliis cordatis obtuse serratis, piceis sed villoso-pubescentibus.
1. p. 24. t. 38. f. 5. b.

Habitat in pratis humidis Charentia 5
Caeruleo-vires, ramosus; Ramæ tomentosæ, fuligineæ. foliis petiolatis, acutis,
interdum bi-serrata, venosissima, supra nigra. Vertebrilla ~~floræ~~ floræ, approp
best-duodecim mati: floræ pedicellatae. Bractea orata-lanceolata, acuta, caduca
tum tomentosa. Calyx tomentosus, intus scaber: labio superiore intus in inferiore
lepidus. Corolla purpurea. Stigma villosum, exsertum. 86. per