

Salvia

1. aegyptiaca L. foliis lanceolatis denticulatis, floribus ped. verticillis subtrifloris, bracteis minutis calycibus monophyllis
2. cretica L. foliis lanceolatis, calycibus diphyllis
3. officinalis L. foliis lanceolatis-ovatis crenulatis, verticillis racem. flori, calycibus acutis bractea longioribus
4. grandiflora L. foliis cordato-oblongis crenatis, verticillis multifloris, calycibus acutis bractea brevioribus
5. triloba L. foliis ^{trilobis} trilobis: lobo intermedio ovato-oblongo, calycibus bracteam ^{aequantibus}
6. pomifera L. foliis ovato-oblongis ^{crenatis} ~~interris~~ ^{integris} ~~calycibus~~ ^{bract.}
7. fragifera L. foliis cordato-oblongis ^{crenatis} obtusis ~~sonatis~~ ^{sonatis}, floribus suboppressis, calycibus trifidis
8. acutabulosa L. foliis obovatis dentatis, calycibus denticulatis campanulatis pilosis verticillis racemosis
9. occidentalis L. foliis ovatis serratis, spicis laevibus bracteis cordatis subtrifloris

10. dentata L. foliis lineari oblongis serratis, verticillis bifloris calycibus obtusis
11. africana L. foliis ^{subtus incanis} ~~ramorum~~ spatulatis basi truncatis dentatis, iamulorum
oblongis, calycibus hirsutis, bracteis rhomboidibus
12. colorata L. foliis ellipticis subtitergerrimis adnatis tomentosis, calycibus ~~lucis~~ fructu
perovum limbo membranaceo colorato
13. aurea L. foliis subrotundis integerrimis, basi truncatis dentatis
14. paniculata L. foliis obovato cuneiformibus denticulatis nudis, caule ~~fr~~ scabro.
15. cordata L. foliis cordatis acutis tomentosis serratis corollis calyce duplo
concreta angustioribus. ~~obtusis~~
16. serotina L. foliis cordatis inequaliter serratis obtusis mollibus, calycibus
viscosis acutis verticillis multifloris
17. domatica L. foliis cordatis obtusis crenatis hirsutis villosissimis, corollis calyce
angustioribus verticillis paucifloris
18. veneta L. foliis cordatis, caule filiformi repente, spicis ascendentibus
19. tiliofolia L. foliis cordatis rugosis crenatis acutis, calycibus glabris ~~glabris~~
angustatis glabriusculis
20. nilotica L. foliis ovatis obtusis denticulatis, supremis cordatis dentatis
~~abyssinica~~ subangulatis
21. nilotica (Poir.) L. foliis serratis angulatis crenato-dentatis, calycibus
serratis angulis margineque faucibus ciliatis

22. napifolia S. foliis cordatis crenato-dentatis: inferioribus hastatis pyraticque
 dent. bis calycibus ^{acutis} verticillis subnatis labio superiore breviter obcordato plano
23. verticillata S. foliis cordatis crenato dentato: infimis auriculatis, labio superiore
 fornicato floribus verticillato rademosis dentibus calycibus obtusis
24. aucta S. villosa foliis ovatis dentatis auriculatis, floribus verticillato-
 speciatibus
25. uncinata S. foliis uncinato-pinnatifidis dentatis, floribus verticillato-
 speciatibus
26. nubra S. foliis oblongis subcordatis inaequaliteribus rugosis crenatis basi
 sinuatis interrupte pinnatis
27. pinnata S. foliis ~~lyratis pinnatis~~ foliolis oppositis oblongis
28. incarnata S. foliis pinnatis: foliolis ematis
29. aponeura S. foliis inferioribus bipinnatis, superioribus pinnatis
30. formosa S. foliis cordatis, corollam galea barbata, calycibus trilobis
 caule pubescente
31. hermannum S. oblongis foliis oblongis obtusis crenatis, bracteis summis terilibus majori-
 bus coloratis corollam galea falcata
32. rudi S. foliis oblongis crenatis obtusis, corollam galea semiovalata
33. hispanica S. foliis ovatis petiolis utraque basi mucronatis, specibus imbricatis
 calycibus trifidis
- nudicaulis S. foliis radicalibus lanceolatis rugosis crenatis, caule subaphyllo

35. verbenacea L. foliis ovato-oblongis sinuatis serratis brevifloris, corollis calyce angustiori
^{capitulis}
36. claudesana L. foliis pinnatifidis serratis rugosis, spica obtusa, corollis calyce an-
 gustioribus. caule simpliciter
37. scabra L. foliis lyratis dentatis rugosis, caule paniculato-ramoso
38. lyrata L. foliis radicalibus lyratis dentatis, corollam calice breviter
 39. Corsicae L. foliis lyrato-auriculatis, caule subaphyllo, corolla calice dimidiate
40. canariensis L. foliis hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis.
41. metiœana L. foliis ovatis utraque acuminatis serratis
^{inferioribus lyratis summis}
42. abyssinica L. foliis cordatis ovatis rugosis ~~emissis~~ ~~glomeratis~~ calyce breviter
^{crenatis ciliatis}
43. indica L. foliis cordatis sinuato-dentatis, verticillis subradiis remotis
^{separatis}
44. glutinosa L. foliis cordato-lanceolatis grosse serratis acuminatis
^{summis}
45. homatodes L. foliis cordato-ovatis rugosis tomentosis, calyce breviter
^{tuberoso}
46. pendula L. foliis cordato-oblongis summis amplexicaulis, verticillis
^{sub} radiis, corollis calice glutinosi
47. austriaca L. foliis cordato-oblongis sinuatis crenatis, racemis vellosissimis
^{ramenibus longis}
48. urticifolia L. foliis ovato-oblongis dentatis, petiolis alatis
49. pyrenaica L. foliis oblongis obtusis vix serratis, ramis vellosissimis
^{obtus}

96
pratensis Salvia foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexibus,
verticillis subnatis, corollis galea glutinosis lin. Syst. Veg. 70 Pollich
pal. n. 20

Gallitriche agreste Cuba no 2. 200.

Orminum sylvestre Duchol. 569 hist. 569

Horminum pratense, foliis serratis Bauh. pin. 230. Rivin. Monop. irr.

incisa t. 36

laevigata Horminum sylvestre ~~4~~ foliis profundius incisiss Bauh. pin 239

agrestis Horminum sylvestris 4. altera species Plus. hist. 2. p. 30

Scalaria agrestis flore albo Hort. Eichst. Vern. ord. 9. t. 20. p. 3.

Salvia agrestis Habitat in Europa pratis 4

Stis; foliis cordatis, caulis erectus, subhirsutus, obtuse tetragonus. folia ovata, cordata, acuta,
summis amplexibus duplicato-crenata, interdum incisiss, rugosa, subtus pallidiora,
plethi caulibus villosa, inferiora petiolata. Bractea parva, cordata, acuminata. Ver
corollam galea villosa, inferiora petiolata. Bractea parva, cordata, acuminata. Ver
labium squan
te. lin. Amon. Poulta coeruleo-violacea: Galea magna, emarginata, punctis gla
uc: 9. p. 399. Vinosis adpressa.

Cochinchinensis Garriana. Lour. fl. Cochin. pag. 15. †

Habitat in Cochinchina ad Cantonem Tinanum

Caulis herbaceus, 2 pedalis, simplicis sponus, teres, pubescentissimus, erectus.
Folia subulata, opposita, crassa, extus striata, intus serrata. Spica
terminalis, elongata, erecta. Flores aurei, bractea solitaria, hispida, bre-
vis. Cor. petala 2, opposita, subrotunda, acuminata, serrata, plicata:
2 lanceolata. omnia pilosa, equalia. Filamentum planum,
subulatum, basi curvatum, utraque alatum. anthera magna,
terminalis, cohaerens. Germen[†] compresso-rotundum, pilosum - stylis
crassis, filiformibus stigma convexo, papillosum. Capsula com-
pressa, pilosissima, 3 valvis.

Puparium

novi

Homatodes Galvia foliis cordato-ovatis rugosis tomentosis, calycibus hispida,
radice tuberosa Lin. Spec. pl. 35.

Horminum sanguineum asphodeli radice. Triumph. obs. 69 t. 69

Horminum sylvestre majus homatodes glabrum, flore coerulea, ita
Licium Barr. rar. 234. t. 109.

Horminum sylvestre maculatum tuberosum Mois. hist. 3. p. 394. 8.

ll. t. 14. f. 15.

Habitat in Galia 4

Radix longa, tuberosa. Caulis erectus, leviter hispidus, viscidus.

Folia inferiora petiolata, suprema sessilia, cordato-oblonga, crenata,
rugosa, subtomentosa, maculis sanguineis vix picta. Racemi

* Bractea cada laxa verticillati: pedicelli villosi. Calyx pubescens, sub calyci
40, attenuato, lobum superius obtusum, ciliatum, indivisum, corolla coerulea
breves. purpureo: galea basi coarctata, villosa *

nemorosa *Salvia foliis cordato lanceolatis serratis planis, bracteis coloratis, cotolla latius
infrimo reflexo* L. V. G. 12. ^{appaliter}

Horminum sylvestre B. vel *Horminum sylvestre v. salvi folio* Clus. Pan.

Horminum sylvestre salvi folium minus Bauh. pin. 139.
monj. h. 3. t. 14. f. 21.

~~*Sclarea foliis salvis minor f. glabra* Tournef. J. R. 4. 100~~

Habitat in Aethiopia, Tartaria &

Differt a *sylvestri* ramis paucioribus, caulebus calycibusque minus
pelosis, foliis angustioribus sequa liter serratis minus tomento
si

Sclarea orientalis betoniaefolia acutiuscula como purpureascente Tournef

Inde hab
Turcia

cord. pag. 16

Sclarea armena betoniaefolia acutiuscula

Tournef

varietas procer. fci. Schreber .h.

eodem synonyma ex Clusio huius affert Bauhin. in Pinace ad ad. verbenacam.

pyrenaeica ⁹⁸ Salvia villosa-viscosa, foliis dentato-sinuatis obtusis
& laminiibus corolla duplo longioribus
S. larca pyrenaeica, glutinosa, foliis & sinuatis Tournefort. inst.

179

Horminum pyrenaeicum glutinosum angustifolium Herm.
parad. 187. t. 187

Salvia pyrenaeica. foliis obtusis crenatis, & laminiibus corolla
duplo longioribus Lin. Syst. veg. 71.

ramosis

Habitat in Pyrenaeis. ~~Habitat in~~ Ex herbario Fuspidi
Caulis bi-ubitalis et altior. folia inferiora petiolata, guttu-
mosa, cordata, dentato-sinuata, dentato-sinuata, verso
& o, supra glabra, subtus nervis raris villosa; superiora
resiliata, oblonga. Pedunculi terminaliter, elongati, inia-
ni. Verticilli ~~flor~~ floribus pedicellatis. Bractea cordata
attenuata, reflexa. Calyx campanulatus, villosus: lobi
um superiorum ascendens, bidentatum; inferiorum tripidum;
lobis inferioribus, intermedia subulata. Corolla coerulea, or-
lo armata & sparse punctata pelus obsoletis; galea falcata,
acuta

quadri-pest

44. 96

viscosa ⁹⁹ Salvia villosa-viscosa, foliis cordato-oblongis rugosis ^{ius ciliis} acutis ^{crenula =}
ti, bracteis cordato-subrotundis acuminatis.

Salvia viscosa; foliis oblongis obtusis eros-crenatis viscidis, flori-
bus verticillatis, bracteis cordatis acutis Jacq. miscell. 2. p. 320

Fr. var. t. 5

Habitat in Italia 7

^{# quadringue} Caulis erectus, sesquipedalis, parum ramosus, villis apice glandulosis,
uti tota planta lectus. Folia petiolata, [#] pollicaria, remota, infim
^{# crenulata pub} ora basi subcordata, [#] superiora ovata-oblonga, supremo sessilia
^{erosa} verticilli plures, remoti, sexflori & flores bipedunculati. Bractea
calyce brevior. Calyx quindentatus: dentibus mucronatis. Corolla
tubus albus: labium superius villosa viscidum, purpureo-san
guineum; inferius dilutius coloratum *

Salaria

Salaria africana praecox annua Tournef. 7. R. h. 1777

Habitat in Africa boreali herb. Mus.

Caulis erectus, pilosus. Solia inferna petiolata, ovata-oblonga, tri-polluciana, obtusa, basi alba
nucata, obsolete dentata, venosa, venis raris pilosissima, penosa scissile, ovata, acuta, dentato-
subrepanda, caeterum similia inferna. Pedunculi superiores, uti pedicelli villosi-
si: pedicelli utraque duo, brevissimi, inferni remotiores. Calyx bilabatus: labium
superius ovatum indivisum, inferius bifidum, ^{omnes} mucronati. Corolla magnitudine salis
salariae; galea villosula. Stylus longus. Antherae proappendentes

98 100
virgata Salvia foliis oblongis cordatis rugosis crenatis, pilis caulis calycis
que apice glandulosis. Hort. Kew. 1. p. 39

~~Salvia virgata Jacq. hort. 1. p. 14. t. 39. 63.~~

Salvia orientalis verbascifolia, flora partim rubra partim fla-
vescente Tournef. Cor. 10. secundum Willdenow.

Horminum creticum Rivin monop. t. 63.

Salvia virgata Jacq. hort. 1. p. 14. t. 37.

Salvia virgata; foliis oblongis cassis obtusis glabris, spicis virga-
tis Elling. Salv. n. 43.

Habitat in Oriente & y

Caulis quadripedalis, erectus, obtuse tetragonus, pilosus. Folia in-
feriora petiolata, altero latere ^{bonis} breviora, supra glabra, subtus
sericea, uti petioli hirsuti, ~~spicae laterales et terminales~~ suprema
gambilia, acutiora. Spicae terminalis et laterales, longissima, recta
divergentes. Verticilli remotis & imi, 8 ex flori. Bractea cordata,
acuminata, calyce longiora. Calyx hirsutus, bullatus, lobis superioribus
re tridentato, inferioribus bifido: dentibus acuminatis. Corolla pallida
virescente

Rosea aut coerulea; latris inferioris lacinis lateralibus lanceolatis - King.

C. C.

~~Radix plumbago, erecta, simplicis, demersa - in am, supra
radices plumbago, basi pilosa. - Corolla petalata, purpurea, sub-ovata
oblonga, et tubo corollae, venosa, venulata, venosa, utrinque demersa. ut
na. - Petala tubo corollae, in am, pilosa. - Vaginae supra, demersa,
6 flori. - Calyx quatuorlobus, campanulatus, onguis, membranosus, vero
su, lacinis reflexis. - Bractea lanceolata, calyce breviori~~

Radix plumbago, erecta, simplicis, demersa - in am, supra

King

101
bullata 99 Salvia folius cordato-oblongis rugosissimis bullatis, caule piloso,
bracteis cordatis acuminatis, staminibus corolla brevioribus.

Habitat in Lusitania Schousboe 4

ramis duobus
vel quatuor
Caulis ^{in planta} hemipedalis et ultra, obtusa ^{in planta} ~~vel~~ ^{in planta} ~~genu~~, scabriusculus, spontanea
vir ramosus, aphyllus, in culta ramosus; ^{ramis 2-4} folia duum paria, ^{um} proter folia
sub ramificationibus. Estia petiolata, bipolliciana vel ultra, obtusa
inaequaliter crenata, valde rugosa, supra glabra, subtus ⁱⁿ costa et venis
majoribus pilosa; flax superiora sub ramis sessilia cordata, acuta,
vel acuminata. Nascuntur elongati. Vesticilli remoti, ^{vel} ~~longi~~. Bractea
longitudine calycis, subtus villosa, proaequaliter versus marginem, supra
glabra, patentissima, suprema colorata. Calyx ^{pubescens} ~~purpureus~~ apice
per supra purpurascens, brevo elevato carinata, subtus striata
vix purpurascens: labium ^{acute} superius tridentatum; inferius bifidum.
Corolla purpurea, parva: galea recta, compressa pubescens, et
calyx ad sparsa punctis albidis: labium inferius ^{superiore brevius} ~~conicum~~ ^{inter}
media subcrenulata, laterales breviores, lineari oblonga, obtusa. Stamina
longitudine labii inferioris. Stylus bifidus, galea parum longior
Affinis S. disermadis, at folia laeviora, caule paucis, subramificationibus
cordata, bractea ~~pro~~ ^{floribus} purpurei

theor data.

hysopifoloides Gratiola foliis lanceolatis subseratis articulo caulino brevioribus S. V.
p. 64. 4. Mart. 1774

Gratiola indica minor vero *hysopifoloides* Planch. alm. 180. V. 193. fig. 1.

Habitat Tranquebaria in agris oryzaeis O

Tota ~~habitu~~ ^{caulis} digitalis vel fistulosus erectus plerumque simplicissimus

interdum ^{inter} ramos caule breviora, tetragonis. folia sessilia subicosa

lobata ^{inferior} integerrima ^{super} et profem interdum utraque dente utris, remotis

fructu ^{simplex} reflexo ^{subternis} seminaque ^{subternis} Pedunculi in axillis superioribus alternis

Basis folii laevia ^{simplex} foliis longioribus. Flores longitudine fere pedunculi

nitens ^{capitulum} ^{capitulum} ^{capitulum} ^{capitulum}
capitulum ^{capitulum}
capitulum ^{capitulum}
capitulum ^{capitulum}

variat foliis omnibus lanceolatis, vel inferioribus oblongis
setorato oblongis

— sessilibus subintegerrimis, pedunculi axillaribus
unifloris foliis longioribus

100
Diermas Salvia foliis cordato-oblongis ovatis, petiolis marginatis, stans 2
nibus corollam aquandibus Lin. Sy. Voy. 71

Horminum sylvestre majus, flore albo, integris foliis Mausel
ic. 107.

Sclarea sylvatica flore albo Peronnet. inst. 179.

Habitat in Syria &.

Tota planta vilis longis pubescenti glutinosus, caulis erectus, basi ca-
li-pollinarius mosus. Folia cordato-oblonga, vel oblongo-lanceolata, per petiolum mar-
se-pinnatispergine angusto decurrentia, villosa, rugosa, crenato-erosa. Bractea cordato-
attenuata, longitudine calycis. Verticilli remoti, sex flori. Calyx 5-
dentatus. Corolla alba, villosa. tubus longitudine calycis
an S. diermas in Mart. 310 eadem ac S. foetida Esting. 2 lingitua
Esting. ?

ciliata 2. foliis lato linearibus confectis, retusis serrato subciliatis
Coctera ciliata: stipite vindi, vaginis imbricatis, foliis distichis
apice retusis, ciliatis margine et apice basi amplexantibus. folia
superiora Forst. descr. pag. 157.

Habitat in mari rubro.

Stipes interdum pedali compressus versus folia latior articulat.
articulis brevioribus annulis obliquis. Folia disticha, digyllum
pollicem lata fruticosa valde ciliata, inferiora magis
subtilia sine fer. nervoso serrata, apice obtusa emarginata
bassos vagina flavicante cuneata, pollicari margine
amplexante folium superius. Vagina columnam facit
compressam caule multo latiorem Forst. N.

103 101

nudicaulis Salvia foliis radicalibus lanceolatis rugosis ~~errone~~ cronato ~~errone~~, cau-
le subaphyllo.

Salvia merjamie floribus verticillatis sessilibus caulis, caule sub-
nudo, foliis oblongis rugosis puberulis Cosk. Dec. 10.

Habitat in Arabia Dorpha.

caulis ^{herbaculis} semipedalis, erectus, villos cinereus, superne divisis in ramis
floriferis, diphyllis. folia radicalia, brevissime petiolata, plura, polli-
cano, acuta, rugosis dima, subtus canescentia. verticilli remoti, 3
fiori. bractea ovata, acuminata, calycis brevioris. calyx navosus, filis
biatus: labio superiore breviore, ovato, subdentato; inferiore longiore bident-
ato, dentibus acutis. Corolla parva

clandestina Salvia foliis serratis pinnatifidis rugosisque, spica obtusa, corollis calyce
angustioribus. L.V. p. 70. 22. Spec. pl. 36. ~~Et~~ ^{Et} Hist. p. 20. *

Thorminum sylvestre, inciso folio, coccio flore Italiae Barr. ~~24.~~ ^{28.} 270

Salvia foliis pinnato dentatis aperi hirsutis, verticillis pilosis, floribus
apetalis Zinn. fl. Gott. 290.

Habitat in Italia &

Pauli pythamoi vel palmari ^{arcti} pedales, ^{arcti} obtusi villosi ^{arcti} viridi
prostitum ^{arcti} superne interdum superne rami duo. 8 foliis
oblonga angustiora quam in verbenata, ^{arcti} pinnato
pinnulo ^{arcti} ~~ob~~ line ^{arcti} pinnata rugosissima crenata, obtusa petiolata. Duum parum
aut distincta in caule. ^{arcti} sessilia. Spica truncata. verticilli remoti 6-8
alternis inq. ^{arcti} flori. Bracteae cordato acuminate ciliata. Calycis
lei ^{arcti} obtuso ^{arcti} magni strati pilis glutinosi adpressi. corolla ^{arcti} conleca
calycis duplo longior

104 - 102
Sylvestris

Salvia foliis cordatis rugosis biserratis, bracteis coloratis flore brevioribus, pilis calyce caulibus calycisque simplicibus Hort. kew 1. p. 39
Storminum Sylvestris Matth. ~~cap.~~ 888.

Salvia Sylvestris; foliis cordato-lanceolatis undulatis biserratis maculatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus Lin. ^{pl.} *Spec.* 349.
Jacqu. aust. 3. p. 7. t. 212.

Habitat in Austria inferiori, Bohemia agrorum marginibus, vineis. ~~in~~ Germania 4

Caulis erectus, ^{ramosus} villosus. ~~folia infima longe petiolata, superiora brevius, suprema semiamplexicaulia, ovato-lanceolata, basi cordata~~
~~inaequaliter ~~crenata~~ crenato-serrata, rugosa, subtus tomento tenui vestita~~
~~capitula illi sex flori in spicis longis digesti. Spicis ex alio sup~~
~~mis et apice, longo; ante florescentiam tetragona. Verticilli sex~~
~~flori. Bractea ovata, acuminata, purpurea. Calyx 8-natus,~~
~~villosus, dentibus acutis. Corolla corulea; tubus longitudine calycis.~~
~~Galea pilis punctis glandularibus albis adspersa.~~

^{Japanica} *Salvia foliis bipinnatis glabris* Thunb. S.V. p. 72. n. 52. Thunberg fl. Jap.
1793. 22. Feb. 7.
Hesperis Hamph. Am. Ex. fasc. v. p. 007.

Habitat in Japonia

Caulis simplex erectus, glaber, pedalis et bipedalis. folia petiolata
inferiora bipinnata superiora pennata suprema lanicolata
indivisa, pennis ovata acuta serrato-dentata ^{sub} petio
lata. Paniculatissima. pedunculi verticillati bractea
lanceolata glabra. Calyx hirsutus bilabiatum 5-dentatum
Thunb.

foliis inferioribus bipinnatis superioribus pennatis

non vidi

nemorosa Salvia foliis cordato-lanceolatis aequaliter serratis, bracteis coloratis longitudine calycis, ^{corolla} ~~corolla~~ labio infimo reflexo.
Gallitricum glabrum, foliis Salvia, flora purpurea Bauh. hist. 3.

p. 312.

Scalaria, foliis Salvia, minor & glabra Tournef. inst. 100
coerulea β. Thorminum orientale, betonica folio acutissimo, flora coerulea
Tournef. Cor. p. 10

albiflora γ Thorminum orientale, betonica folio acutissimo, flora albo
Tournef. Cor. p. 10

+ Salvia nemorosa, foliis cordato-lanceolatis serratis planis, bracteis coloratis, corolla labio infimo reflexo lin. script.

Syst. Veg. 70

Habitat in Austria, Tatania, β & γ in Armenia γ
Varietas δ. sylvestris secundum Crantz et Ehrhger, diversa vero foliis
caule minus ramosa ramis paucioribus; calyce caule calycibusque
minus pilosis, foliis angustioribus aequaliter serratis, minus tomentosis;
bracteis longitudine calycis. foliis in β. & γ. angustiora costa
non diversa.

Specie ante florentiam tetragona; bractea colorata, calycis & glandulae
resinosi floris adpressi

~~Sabinia
formum grandae annuum sicut simile come terens inflore rubro Tournef.
Dor. Habitat in monte Rothm.
Caules multiflori, plures, adscendentes, digitati. Bilia oblonga, multiflori, incana.
vericilli 6 flori. Bractea rhombica.~~

amplexicaulis Salsia foliis cordato-lanceolatis semiamplexicaulis
inqualiter crenatis, bracteis cordatis acuminatis calycis brevioribus
Salsia amplexicaulis, foliis cordato-oblongis duplicato-crenatis
subamplexicaulis, floribus spicatis, bracteis flore brevioribus La-
marck. illust. t. p. 68. horto

Habitat - - - Ex Hort. Parisino 4

Caulis pilosus. folia caulina semiamplexicaulis, bipollicaria,
vix pollicem lata, rugosa, quae lentis villis ^{longis} acuta. Verticilli 8 ex flori,
distanter. Calycis pilosi: lobum superioris brevius, obtusum. *

~~Habitat in montibus Hispaniae~~

~~no. 317.~~

~~argentea foliis lanceolatis oblongis inflexis parvis
Salsia foliis lanceolatis oblongis inflexis parvis
argentea foliis lanceolatis oblongis inflexis parvis
argentea foliis lanceolatis oblongis inflexis parvis~~

angusti folia. ~~S. foliis lanceolatis: inferioribus extus serratis~~ ~~Collatam~~

labro inferiore ^{latissimo} ~~maximo~~ lobo intermedio maximo bilobo

Salvia angustifolia, foliis lanceolatis, oblongis: inferioribus parce serratis, superioribus subintegris verticillis sextifloris Cavan. Ic: 4. pag. 9. Tab. 317

Salvia ^{virgata} ~~lanceolata~~ foliis linearibus, caulebus virgatis, fructibus gracilibus, floribus oppositis Ortega Dec: pl. pag. 3.

Habitat in Regno Mexicanis herb. Fusca: 4

Caule herbaeus, virgatus, pilosus. Folia petiolata, pollicaria, linear-lanceolata, acuta, glabra, inferioribus extus remote serrata: superioribus angustioribus integerrima. Spicae semipedales. ~~Stachya~~ ~~linearis~~. Flores pedicellati, remoti, oppositi (Cavan. utraque 3.) Calyx bilabatus, basin versus sensim angustatus, striatus lobis laciniis lanceolatis, acutis superioribus integris. Corolla saturata ^{ut pollicaria} caerulea, tubus compressus, longitudine calycis: Labium superius inferius multo brevius et angustius compressum, pubescens, inferius latissimum, trilobum: lobo intermedio maximo; laciniis subrotundatis.

parviflora Salvia foliis cordato-ovatis inequaliter crenato-nervis ~~...~~, ramis
terminalibus compositis, bracteis cordatis calyce brevioribus
Armenum orientale, foliis & clava, flore albo, parvo Tournef
Cor. p. 10

Habitat in Oriente ~~Herbario~~ Ex herbario Gussonei

Caulis herbaceus, acute tetragonus, in canis. Folia petiolata, bipollic
cana, venosa, villosa, inequaliter crenata. Verticilli ⁶⁻⁸ ~~2~~ flori. Bract
eae acutae. Calyx villosus, dentibus subulatis. Corolla parva: ~~...~~
una & 4 ^{gula} ~~partibus~~ rectam, stylo brevior.

~~Armeni in canis. Folia petiolata, bipollicana, venosa, villosa, inequaliter crenata, ramis terminalibus compositis, bracteis cordatis calyce brevioribus. Corolla parva: una & 4 partibus rectam, stylo brevior.~~

Armenia
Gussonei

purpurea Salvia foliis ovatis serratis acutis glabris, petioli basi biglandu-
lois, calycibus tomentosis coloratis +

Salvia purpurea; foliis ovatis acutis serratis glabris; calycibus
tomentosis coloratis Cavan. ic. 2. p. 52. t. 166

Habitat in Mexico?

Caulis erigalis, ramosus, glaberrimus, uti totam plantam calycibus et cap-
iti. Folia petiolata. Verticilli terminales, spicati, numerosi, 10 flori.

Bractea brevi, acuta, decidua. Calyx violaceus, interdum albus.

Corolla violacea, calyce multo longior: labrum superius
fornice atum villosum. Cavan.

~~purpurea Salvia glaberrima, foliis ovatis serratis acutis~~

Salentina Salvia foliis cordato-lanceolatis inaequaliter crenatis, bracteis cor-
datiis attenuatis basi coloratis calycis longioribus.

Stomium hispanicum, foliis herba senti, flore coeruleo. Barro-
u 1317. En hebban's

Habitat in regno Valentino locis aridis et deserto Haab. Fusioi &

Facies S. nemoroso. Caulis herbaceus, ramosus villosus, super ne
canescens. Folia infima petiolata, superiora sessilia, lato cordato-
lanceolata, acuta, venosa, subrugosa, supra glabra, subtus villo-
sa. Spicae terminales. Verticilli sex flori, distantes. Bractea
valde attenuata, villosa. Calyx coloratus, 5-lobus, villosus; labium
superius ascendens, ovatum; inferius bifidum; laciniis cuspidatis.
Corolla parva, coerulea; galsa villosa.

Salvia cordata - lanceolata inaequaliter crenata, spith villosa, bracteis
cordatis attenuatis basi coloratis calycis longioribus.

Hispanica Salvia foliis ovatis petiolo utroque mucronatis, spicis imbricatis, calycibus
trifidis S. V. pag. 70. 26. Spec. pl. p. 37. ~~7~~. Ethng. S. 10. * pag. 27

~~Salvia Hispanica Tabern. h. 264. n. 374~~

~~† Habitat in Hispania~~

galectrice affinis man, si non genus aliquod Salvia Hispanica Bauh

~~† galestra~~
H. 3. p. 313.

~~Tabern. h. p. 170~~

Habitat in Hispania

Caulis herpeticus tetragonus obtusus, quadrifidus, pilis reflexis vestitus.
Folia petiolata attenuata, acute serrata bipollicaria basi per
petiolum parum decurrentia ^{vase villosa} ~~reticulata~~. Petiolus basi utroque mucron

obtusis prominente. Spica tetragona tripollicaris, imbricata bracteis
ovatis, longitudine calycum ulcatis. Calycis sub angulo bractea ^{lope}

villosa canescentes ut bractea tri-dentata oblonga ^{sextangula} dentibus lanceolatis
Pavilla corollae calycis parum longior galea villosa

canariensis Salvia foliis hastatis triangularibus - oblongis crenatis
 obtusis Lin. Sy. Veg. 70.
 p. 2.

~~Herminum canariense Tomentoseum~~

Herminum hastatis amplioribus foliis 3: an mod. obovatis,
 caulibus et pediculis araneosâ lanugine villosis Plukenet
alm. p. 189. t. 301. f. 2.

Herminum foliis hastatis Rivini monog. t. 61.

Habitat in Canariis 5

Primi Canari. folia petiolata, bipollicaria, alternata
 rigosa, una cum petiolo tomentosa; [#] haec emi ex axillis
 perianthibus et terminalibus, breves, casti. Bractea ovata,
 colorata, membranacea, reticulata, longitudine calycum.
 bractea duo vel [#] minore, lineares. Calyx compressus,
 subvillosus, margine coloratus; lobo superiore obsolete
 tridentato; in seniore profunde bifido; laciniis oblon-
 gis obtusis emarginatis mucronatis; fructiferi membra-
 naecci, venoso-reticulati *

auricula
 lanceolata.

quatuor

purpurea Salva

Habitat herb. Guspei

Caules herbarici, striati, villosuli. Folia petiolata, sesquipollicaria, ovata, serrata, attenuata, glabra, pallide viridia. Verticilli superne, contigui, octoflori
Flores pedicellati. Calyces breves, bilabati, violaceo-tomentosi: labium superius dente subulato, inferioribus bicus similibus. Corolla labium rectum, subtomentosum. Corolla pollicaria

110 100
triangulari Salvia villosa-hispida, foliis triangularibus dentatis, ramis
patulis Thunb. prodr. fl. cap. 96. t

Habitat in Cap. b. speci

Caulis herbaceus.

Isoploides: Eraa theimum foliis carnosis, Kallio limonibus, Glebenn. m. p. r.
nis axillaris Kaly: huchus pubescentibus, Nuba recurva N. p. 58. 4
duplex. p. dr.
001

occidentalis Salvia foliis ovatis serratis, spicis laxis, bracteis cordatis subtriplois. Schum.
6-7 prodr. p. 14

Salvia l. Brown-jam. 117.

Habitat in India Occidentali 2

non vidi

111 109
Inamona Salvia canescens, foliis cordato-triangularibus inaequaliter dentatis,
bracteis cordatis reflexis
Habitat in Hispania. Schauboe.

caulis
bractea et ca
Caulis herbaceus; penna asperina panem, crassior, uti calycis villis
apicè glandulosis frequentissimis ut canescens, ramosus. Folia petio-
lata, palmata, ^{rugosa} facie, acuta, basi e dentibus majoribus. Subangula-
tu, utroque a villis brevibus crispis canescentia, praesertim subtus
stabienscula, veno subtus costantibus: ramorum floriferorum can-
centia inferiora petiolata, superiora sessilia, ~~si~~ villosa-pulverem

Haec Cucum-
ni sativi

2 Petioli inferiorum
longi.

caulis
Pedunculi brachiati, elongati. Verticilli remoti, sexflori.

8 flores pedicellati, nutantes: pedicelli villosi-virescenti. Calyx ~~cam~~ ^{ca} ~~can~~
nervosus. Calyx ^{indiv} bilabiatus: labio divaricato, bidentato; dent-
ibus in spinulam desinentibus. Corolla magnitudine S. Sclarea, etus

florum, subper
gentem d

nubescenti. Semina oblongo-sublobosa, laeva.
An Salsia Sclarea foliis triangulari, dentato Tournef. inst. 1000?
quod secundum Etling. ad S. Baraldien pediat, ad meo planta a
S. Barrel. recedit quantum a Descriptione ipsius Baraldien
concludere licet, aliud quoque synonymum a Tournef. ad suam
plantam citavit Barrel. scilicet Sclarea maxima, boetica, annua, flori-
verte

bus flora delata caerulea Tournef. inst. 179.

Petalis marginata E.
 diformes calura petals cordato-oblonga orafa, flammulatus corollam equantibus 5. V. p. 70. 29
 + ~~Sp. pl. 167. Mont. 110. 7~~
 Athernum fide re magis, flore albo, inlegis petals Brunel. 4: 107.
 Salvia villosa, bifida, foliis lanceolatis ovatis, serpis petiolum angulatis
 Allon. herb. 119 n. 4.
~~Salvia pallidifolia, foliis ovatis lanceolatis rugosis, inflorescencia~~
 spec: 1. p. 107.
 + ~~Herminium fide cum Bauh. prod. p. 114. Mont. 4. 3. p. 392. fl. 16. 7. 2.~~
 Petala tota velu longo pubescentia apice glanduloso crebri
 fupernis. ~~bot. 1000. 1000~~ ~~oblonga vel oblonga~~ ~~oblonga vel oblonga~~ ~~oblonga vel oblonga~~
 fo per pediculis ~~occurren~~ ~~oblonga vel oblonga~~ ~~oblonga vel oblonga~~ ~~oblonga vel oblonga~~
 curia pediculis fupernis ~~oblonga vel oblonga~~ ~~oblonga vel oblonga~~ ~~oblonga vel oblonga~~
 ta villosa longitudo caulis. ~~oblonga vel oblonga~~ ~~oblonga vel oblonga~~ ~~oblonga vel oblonga~~
 Calyx etc reliquis partibus villosis lobum fupernum aquales
 tridentatum infornis bifidum. Corolla alba villosa. Tubus longus
 tubum caulis

112 40
Barbaliani Salvia foliis hastato-lanceolatis ^{ter} inaequalibus serratis; caule
folioso erecto Etling. Solv. n. 46 +

Horminum Capathi unctuosus folio seu majus hastato folio monis.
publ. p. 273.

Horminum sylvestre majus, hastato folio, flore caesia hispida
Barb. ic. 106.

Habitat in Hispania

Caulis erectus, b. & truncubitalis. Folia ^{reticulata,} hastato-septemloba, ^{da} lobo
medio producto lanceolato, acuta, hirsuta. Bractea parva,
ovata, ciliata, acuta. Verticilli sex flori. Calyx villosus, quin-
quedentatus Etling. l. c.

S. indica Salvia foliis cordatis lateralibus lobatis: summis sessilibus: verticillis subnudis
remotis formis S. V. p. Cg. 17 Sp. pl. p. 37. 21. Jacq. hort. tab. 78. Mart. 310. Ethng. 39
Horminum hispidum, flore violaceo punctis aureo notato Monf. h. 3. f. 11. 7. 13
Jey. 16.

Sclarea indica, floribus variegatis Tournef. J. R. 4. 179

Habitat in India 4
Caule tripedales, obtusi hispiti inprimis basi et ad foliorum ortum densam et
longam barbam proferentes folia inferiora petiolata, cordata, superiora am-
plexicaulia, subhastata inaequaliter dentata, fere erosa, rugosa hispita
acuta. Verticilli longi remoti sex flori. Bractea parva, cordata, acuta.
Flores fere sessiles. Calyx compressus, pilosus viscidus, labio utroque bifido
Corolla labium superius coenulipes falcatum inferius brevius lacina
intermedia externe alba, quoad tub purpureo maculato Schreb.

S. indica foliis cordatis sinuato-dentatis, verticillis subnudis remo-
tis formis Eth. des. pag. 41. n. 39

bicolor Salvia foliis radicalibus cordatis palmatis integris, caulibus bipedatis
oblongatis inaequaliter dentatis, bracteis reflexis.

Salvia bicolor, foliis cordato-hastatis inaequaliter dentatis, spicis
nudis prolongis, corollae tuba candida Car. Mart. illustr. t. p. 69

Salvia bicolor, foliis cordato-oblongis; ramis virgatis; bracteis
reflexis; calycibus nudantibus; corolla tubo inferiore intarime-
ditio saecato Desfont. fl. Atl. 1. p. 22. t. 2. Schomb. ^{des. Egypt.} Asiatica 1. p. 11.

Salvia bicolor, foliis rugosis villosis inferioribus oblongis
lobatis crenatis, superioribus dentatis, racemo verticillato. Sauv.
hort. Schoer. 1. p. 4. t. 7.

Habitat in regno Algerensi & Maritima. 2

Ramuli erecti, bipedati, ramosi, pubescens. Folia radicalia petio-
lata, spithamea, ^{saev. illorum,} ramis palmatis, ^{multifida} laciniis lanceola-
tis, ^{saev. illorum,} pedentatis, acutis; in cultu indivisa cordato-oblonga, ^{saev. illorum,}
atropurpurea villosa, & cabra, in cultu indivisa, cordato-oblonga, denta-
ta, ut caulina inaequaliter dentata, atropurpurea villosa cauli-
na inferiora petiolata palmata, sesquipedalica basi lata, infera

Dentibus majoribus bullatinatis, suprema sessilia ovata laniscolata,
Pedunculis ex axillis supremis et apice caulis, terminales ramosi,
villois, sordide canescentes, interdum pedales. Bractea cordata, acum-
nata, calyce breviora, ^{villosa} ~~hirsuta~~, intus glabra, colorata. Vestibuli
distantes, sex flori: flores pedicellati nudantes. Calyx campanula-
tus, coloratus, villosus viscosus: lobis dentibus quinque mucronatis.
Corolla magna: galea villosa viscosa, coeruleo-violacea, oribus ar-
mato punctis aureis nitidis adperso: labium inferius album.
Cultura saepe villositatem amittit.

~~Species cordata haec flos iniquitatis dicitur, quod in Italia
et alibi in Hispania
flos magni coeruleo-violacei~~
Hierac. Sol. Flos cordata haec flos iniquitatis dicitur, quod in Italia
et alibi in Hispania
flos magni coeruleo-violacei

glabris-
 Algeriensis Salvia foliis inferioribus ovato-oblongis crenatis, superioribus lanceo-
 latis & ubique serrimis, bracteis reflexis
~~Sedaree adrianae prole ex anno 1777.~~
 Salvia Algeriensis; foliis inferioribus ovatis, crenatis, in petiolum
 decurrentibus; calycibus dentato-spinosis, nutantibus; bracteis ~~reflexis~~
 reflexis Desfont. Fl. Atlant. t. p. 23. t. 3

Habitat in Antlante O

Caulis erectus, piloso-viscosus, obtuse tetragonus, ^{ramis} ~~ramosus~~
 longis, virgati. Folia inferiora petiolata, obtusa, per petiolum ^{parva}
 decurrentia, media et superiora pauca, acuta, serrata, saepe inte-
 gerrima. Pedunculi terminales, basi ramosi. Verticilli remoti
~~bi-fert~~ ~~steriles~~: flores pedicellati, ante et post florescentiam nudo nudi. Brac-
 teae ovato-acutae, longitudine pedicellorum. Calyx campanulatus, stri-
 bus villosis-viscosus; dentibus quinque ^{aequalibus} ~~aequalibus~~ subspinosis, superioribus
 brevioribus. Corolla magna; ^{carpae} ~~carpae~~ labium superius falcataem, com-
 pressum, illosum, genitalibus brevibus
 Algeriensis in herb. Turicis, ~~provenit~~ Salvia hincitana anoua latifolia, ~~diversa~~
 90 foliis superioribus ovatis

pomifera *Salvia* foliis lanceolato ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus obtu-
sis L.V. by. 5. sp. pl. 34. 5.

Salvia fruticum inftar gallo ferens Matth

~~*Salvia cretica baicifera* herb. G.~~

+ ~~*Salvia baicifera* Bauh. Ch. 237. Journes. Inst. p. 181.~~

~~*Salvia cretica fruticosa pomifera, foliis longioribus incanis et crispis* Tournef.~~

~~Corol. 20. 44. 1 p. 92. 4. 92~~

~~Habitat in Creta 7~~

+ ~~*Salvia cretica pomifera* Plukh. p. 343. Plukh. Alm. 329. 7. 5. 7. f. 2.~~

~~*Salvia gallifera cretica* Bauh. Met. 3. p. 306~~

~~Solis infinis Caules fruticosi obtusis tomento canis. Folia ut in officinali sed ob-
pinnata bipin-
solicola oblonga ~~Runces crenulata, obtusiora, tomento densiore candidantia.~~
terminata supra plerumque basi auricula duplici parsim etiam quadrupli-
superiore simplicibus Petiol. tomentosi incanis. Verticilli remoti sexflori. Bractea ut
Salvia baicifera in officinali et ob sed obtusa. Flori minores. Calyx villosus lacinis
Egk. Fl. 10. superior tridentato inferior bifido laciniis acutis corolla
n. 4. corolla.~~

~~galla magnetidia et figura pomorum minorum sesiler vel
spicatis villosi proferit in Creta ferri venales et edules.~~

~~Solis ovato-oblongis simplicibus compositive crenulatis obtusis verti-
cilli pauci-floris, calycibus acutis~~

115
lat: folia Salvia foliis remote-dentatis glabris, in densioribus ^{basibus} oblongis ^{superioribus} ~~superioribus~~
^{supremis} cordatis, pedunculis elongatis. Salvia ex

Salaria Tingitana annua latifolia. ~~Herb. Turc.~~ Herb. Turc.
Habitat in ~~in~~ regno Tingitano. ~~Herb. Turc.~~ Ex herbis Turc.

Caulis herbaceus, erectus, rase pilosus, purpurascens, ^{supra} ramis ^{flori-}
feris ^{divisus}. Folia radicalia petiolata, superiora sessilia, tri- ^{tripolli-}
partita, obtusissima, basi attenuata acutiuscula, nervosa-venosa,
suprema minima, venosa, pilis ^{varios} ^{minimis} ^{obsoletis} adspersa. Radu-
culi ^{supra} ^{inferni}, villosi, subviscosi. Verticilli remoti, quadri-
flori: pedicelli brevissimi. Bractea cordata, acuminata, villosa,
indus glabra, calyce dimidio brevior. Calyx campanulatus, striatus,
villosi, bilabiatus: labium superius ascendens, curvatum, acutum: in-
ferius bifidum; dentibus setaceis. Corolla calyce multo major: ^{galea}
calicata, apice oculo armato villis non nullis adspersa, stylo brevior.

Dilamenta propendentes
Valde affinis S. algeriensi mihi ^{diversissima} esse videbitur, foliis ⁱⁿ
palma remote dentatis; supremis cordatis nec lanceolatis serratis, galea
minus minor subvillosa, nec ^{hirsuta}; ramis ^{majoribus}

~~amplexicaulis L foliis cordato-lanceolatis semiamplexicaulis inaequaliter
crenatis caulibus pilosis. Bot.~~

~~Habitat~~

~~ex horto parisiensi ?~~

~~Caulis pilosus. Folium subtus nigro-purpureum, pro pollicem lato
versus illi fissura distincta. Bractea cordato-acuminata calycis
brevior. Calycis pilosi labium superius brevius obtusum.~~

~~Salvia amplexicaulis foliis cordato-oblongis duplicato-crenatis subamplexi-
caulis, r. floribus spicatis bracteis floribus brevioribus. La Mart. Tab.
encycl. pag. 68.~~

###

Salvia villosa, foliis radicalibus cordatis dentato-binuatis, cauli-
ni sessilibus oblongis, bracteis calycis aequantibus

Sclarea lusitanica, glutinosa, amplissimo folio Tournef
inst. p. 179

Ex herbario Pontici Vaillyi

† Habitat in Lusitania Herb. Musci in Babaria Desfont.

facies Sal. Sclarea, tota villosa-viscosa. Caulis crassitie

Petioli villosi, e pennis cygnis. folia radicalia petiolata, epithamsea vel
pini, concava ultra, alia cordato-oblonga, dentato-binuata, dentibus ora-
tes

verticilli remoti, ^{otto} ₁₀ flori
filis serratis; alia ovato-oblonga, obsolete dentato-binuata:
caulina inferiora oblonga, utrinque acuta, remote denticu-

lata. Bractea cordata, saecuminata, integerrima, cuspidata.
Calycis bilabiatus. Labium alterum bifidum, alterum tri-

lobum; dentibus vix pungentibus. Corolla S. Sclarea: Labium
superius lineare, staminibus et stylo brevior.

Aliam in herb. Guss. vidi eam eodem Synonymo, diversam foliis
superioribus cordato-lanceolatis, reliquis vero similis vite

7+ *Salvia patula*; foliis radicalibus cordatis, lanatis, serrato-erectis;
caule calycibusque villosis, glutinosi; bracteis concavis, mucro-
natis; floribus paucis exaristatis Dufour. fl. Atlant. t. p. 25

Synon. a Salvia foliis cordatis dentatis: inferioribus repandis, bracteis cordatis bre-
vitibus acutis, calycibus tomentosis Lin. Spec: pl. 36.

Salvia caule fruticoso, foliis ovatis pinnatis, crenatis nervis hirsutis

Ard. Spec: 1. p. 9. t. 1.

Habitat in Oriente, Palestina &

Stafura Spratensis. Caulis fruticosus, obtuse angulatus. Folia panicula-
to, nervis prima, subtomentosa, repanda, dentata, obtuse crenata.

Panicula brachiata, virgata. Bractea, calycis brevior. Calycis quinquefidi, & quales, acuminati, tomentosi. Corolla alba. Stylus
galea duplo longior Lin. l. c.

africana Salvia foliis subrotundis serratis: basi truncatis dentatis L. V. p. 71. 32. Spec.
pl. 3 P. 25. Elling. 1. 7.

Salvia africana frutescens, foliis pinnatis, flore violaceo Com: hort. 2. p.
101. 7. 91.

Homorinum hastatis amplioribus foliis, paulibus et pediculis araneosa
Lanuzie Pluri. Alm. 105. Tab. 301. fig. 1.

Habitat in C. b. huius locis argillois et

Rami puberuli subarescentes: folia oblonga ut unguiculari
inferiora basi ~~attenuata~~ ^{prolongata} subreticulata superiora basi angustiora ~~oblonga~~
fimbria subtus reticulata ^{venis} ~~venis~~ ^{venis} ~~venis~~
dentata serrulata basi ~~truncata~~ ^{dentata} subtruncata superiora et
inferiora integerrima vel suberrata. Spec. a terminaliter verticillata
2. s. 3 flori. Bractea rhomboidalis acuminata Calycis brevior
calycis campanulati herpetosomi

foliis inferi ramorum spatulati serratis basi truncatis dentatis
subtus imbricatis, calycibus herpetosomi bracteis rhomboideis

119

110 f
Sania

Sania foliis cordatis, inaequaliter crenatis rugosis subtus cauleque inae-
no tomentosis

Seclarea orientalis, foliis Sania, flore partim albo, partim flavo.
Tours ref. Cor. p. 10 Ex herbario

Habitat in Armenia Herb. Russici

Caulis herbaceus. Folia petiolata tripollicaria vel paucum ultra, corda-
ta, ovata, obtusa, utrinque rugosa, supra oculo armato villosula.

Petioles sesquipollicares. Pedunculi terminalis, terni. Verticilli
4-6 flori. Flores sesquialter. Bractea cordata, acuminata, longitudine
calycis. Calyces, uti pedunculi et bractea inaequali: dentibus sub-
ulatis. Corolla parva, calyce paucum longior.

~~candidissima Salvia incana, foliis ovatis inaequaliter dentatis, verticillis
supremis & terminalibus, bracteis ovatis calyce brevioribus~~

~~Sclarea acmena orientalis, foliis rotundioribus, candidissimi
Tournef. Cor. p. 10~~

~~Habitat in Armenia Herb. Vauillant. Mus. or.~~

~~Habitus Sal. sclareae. Caulis herbaceus, crassitie penno anserina,
vel ultra. Folia petiolata, bipollicaria, acuta, minime angulata,
rugosa, verticilli remoti, plures, 4-6 flori. Bractea attenua-
ta. Flores pedicellati. Calyx campanulatus, striatus villosus.
Lobum superius dentibus tribus subulatis, inferius duobus. Corolla
alba, punctis aliquot resinosis adspersa~~

117 #5
austriaca *Salvia foliis cordato-oblongis crasso-binuatis, caule subaphyllo, verticillis*
villosis pinnis, & staminibus longissimis

Salvia foliis rugosis serrato-lacinatis, caule nudo pro, & staminibus lon-
gissimis exsertis. Praet. austr. fasc. 4. p. 230.

Salvia austriaca foliis cordato-ovatis crenatis ad vras incisus vel loba-
tis supra nudis, caule calycibus bracteisque hirsutis dimis lin S. King.

70. #

S. 273.

Habitat in Austria, Hungaria, Moldavia &.

Caulis strictus, obtusa tetragonus, villos longis griseis, proscidium superne cast-
rostitus. Folia radicalia terrea adpressa, petiolata, palmata et ultra, cor-
dato-oblonga, vel oblonga lato-oblonga, supra glabra, venis villosis, subsin-
ata: lobis dentatis, sursum minoribus. Petiolus villosus, folis brevior, caulina
parvum vel attenuum, sessilia, lanceolata vel serrato-incisa. Ma-
cerius pedatis verticilli flori, in feras remoti. Bracteis cordato, acuminato
calyx bracteis longior, densa villosus. Corolla tubulosa: labium superius ar-
*ectum, compressum. **

et per

Salvia foliis rugosis serrato-lacinatis, caule

hu longissimo. Ed. imp. fol. no 41.

511
Austriaca foliis cordato-oblongo crasso binuatis ramosis villosis, staminibus

aurea *Salvia foliis subrotundis integerrimis: basi truncatis dentatis* S.V. p. 71. 33
^{Spec. pl. p. 650. 26. (Linn.) p. 224.}
Salvia africana frutescens, foliis subrotundo glaucis flore magno aureo Com;
Hort. 2. p. 103. t. 92.

Habitat ad C. b. fusi iuxta rivulos h

Rami teretes; fl. s. i. Ramuli tetragon. tomentosi. Folia subrotunda
ovata integerrima, acuta corataeque avenia, tomento dens. glauco
obducta. Nervis terminalis flores oppositi brevissim. pedicella
ti. Calyx campanulatus basi villosus, limbo amplo rubican
do venulis copiosis reticulato trifido. Laciniis subrotundatis
Labi superioris majoris triloba. Corolla magna Schreb.
et colorata mea cum descriptione Schreb. optime convenit
an igitur mea col. aurea Linn. sed tum differentia
et descriptio Linn. haud bona forte quod aureo Schreb. colo
rata Linn.

mibi haud satis nota
confer. Com. hort. et Monf.

~~pro~~ *Salvia* foliis ovato-oblongis ^{lobatis} dentato-subrepandis, ^{lobis} pubescentibus, bracteis cor-
 datis venosis acuminatis longitudine calycis
 Habitat in Africa boreali ~~Arabia~~ ^{Arabia} Turcia & Musci Persini
 Similis S. Virginiana. Caulis herbaceus, erectus, pilosus. Folia infimo-
 ra petiolata, tripollicaria, ovato-oblonga, basi attenuata, obsolete
 dentata, obtusa, venis raris pilosis; superiora sessilia ovata, ac-
 uta, mucronata, inequaliter dentato-subrepanda, costarum inferiorum
 basi similia. Pedunculi ex axillis superioribus & terminales,
 uti pedicelli villosi-viscosi. Verticilli remoti, ^{velati} ~~non~~ ^{best} ~~velati. Brac-
 tea venosa, in cuspidem attenuata. Calyx bilabatus; ~~lobis~~ ^{lobis} tubus
 corum, nervosus: labium superius ovatum, longius; inferius bifidum
 dentibus cuspidatis, inaequalibus. Corolla magnitudine P. sclarea:
 galea villosula, lineari, stylo brevior & labio inferiora brevior;
 labium inferius concavum. Antherae prorepandae.
 In herbariis supra dictis sub sequente synonymo inveni: *Salvia*
afriana prodest ^{amundatus} ~~curae~~ ^{127.} quod Desfontainis ad Algeriam
 per ~~herbaria~~ ^{herbaria} ~~habentur~~ ^{habentur} ~~sed~~ ^{sed} hoc esse diversa~~

^{cordatis}
bicolor Salvia folius ~~radice~~ palmatis integrisque, caulibus

Habitat in Babana herb. Jusf.

Caulis glaber, crassitie pennis asperius. Folia petiolata, suprema sessilia, 4 polluciana, cordata, attenuata, incisae, remote dentata, acuta, venosa, utrinque pilis rari. Pedunculi axillares et terminalis, inaequali villosi, spithamei, verticilli 6 flori, distantes. Bracteae cordatae, acuminatae, supra glabrae, subtus villosae, coloratae, calycis brevioris. Calyx campanulatus, coloratus, nervosus, bilabialis: labia bifida, cuspidata, superior ascendens: fructiferi penduli. Corolla magna; galea villosa viscosa, oculo armata punctis nitidis aureis adspersa, postillo brevior in culta folia semper integra

Folia cordato-oblonga; ramis variegata; bracteis reflexis; calycibus nudantibus; corolla lobo inferiore intermedio 3 partito des. fl. ad.

p. p. 22. t. 2.

Panicula terminalis. Caulis pubescens: superiora folia connata
Corolla magna. S. patens. Galea coerulea violacea, rufescenti alba

123-122
Borshalei

Salvia foliis lyrato-aureolatis, caule subaphyllo, corolla
galea trifida Lin. Mant. p. 26.

Salvia bifida, foliis radicalibus hastato-lyratis dentatis hirsu-
tis Borsh. Descr. p. 202.

Habitat in Oriente?

Caulis in planta ^{culta} ~~spontanea~~, sesquipedalis aphyllus, utroque dimidi-

um verticilli floris: hami duo oppositi, infra infimum ver-

ticillum. Folia radicalia ovata, lyrata, utrinque lato basi-

minore repando-crenata, obtusa, villosa, viridia. Bractea-

calyce breviores, cordata, acuta, integerrima. Verticilli ~~6~~

sex-decem ~~in~~ flori; flores breviter pedicellati. Calyx piloso-viscosi-

cordia coerulea, calyce triplo major: galea falcata, semibi-
fida Lin. C. C.

involucrata Salvia foliis ovatis serratis, spicis terminalibus, bracteis maxi-
mi coloratis Cavan 4i: pag 39. 105.

Habitat in montibus

Caules glabri 3-4 pedales. Folia petiolis longiora, glabra. Verti-
celli 6 flori approximati. bracteis subrotundo acuta concava
ve rosea decidua. Calyx rubescens campanulatus 5natis lati-
um superius unidentatum inferius bidentatum. Corolla sesqui-
pedicari saturate rosea tubo inferne albus superne ventri-
cosa compressa. Calicem superius fornicatum tomentosum inferius
trifidum lobis lateralibus ovatis medio concava orbicula-
ta crenata Cavan.

non vidi

124 429

compressa Salvia sublanata, foliis dentatis; radicalibus cordato-oblongis; bracteis ~~com-~~
~~pressis~~ subrotundo-cordatis mucis gummis sterilibus.

Habitat in Oriente H. Celsii

Affinis S. orthocorys. Caulis herbaceus erectus, tetragonus, uti folia bracteae
 et calyces superne lana tenui vestitus. Folia radicalia petiolata, bipolli-
 cana, cordato-oblonga; caulina sessilia, oblonga; floralia semicomplexa
 caulia cordata; omnia subrugosa, inequaliter dentata; dentibus parvis.

panicula Spica ex axillis supremis et apice, ^{bracteis} compressi verticilli com-
 pressi, copiosi, ^{et} sal decem flori, approximati. Bracteae exteriores subrotundo-
 cordatae, interiores oblongae, omnes calyce parvis longiores, membranaceae, intus
 glabrae, rix venosae, apice purpureo-violaceo, acutae. Calyx campaniformis oblon-
 gus: laciniis obtusiusculis, mucis. Corolla alba et apice purpurea
 corolla. Corolla alba calyce dimidio longior. *

Differt a S. orthocorys: foliis, bracteis ^{mutis} ~~incom-~~ erectis; verticillis compressis,
 gummis sterilibus. a S. argentea foliis et calyce.

Tenella *Salvia foliis cordatis, caule filiformi repenti, spicis adscendentibus* Siebert
prodr. p. 14.

7-0.

Habitat in Jamaica O

folia petiolata ovata subcordata ovata obtusissime serrata pilis
nonnullis minutis supra adpressa subtus pallidiora oculo armata
punctata flores parvi

125
124

coloratis

Scarea Salvia foliis oppositis cordatis oblongis villosis serratis, bracteis floralibus
calyce longioribus Lin. Syez. 72. Etling. Salic. n. 27

Gallitricum Pute 207.

Orminum pativum Fuch. hist. 568.

Hyssopus his. monsp. irr. t. 33.

Scarea vulgare Blauh. t. 122.

Habitat in Italia, Syria &

caulis erectus, crispus, ramosus, villosus, viscidus. folia inferio-
ra petiolata, summa sessilia, ^{reflexa} ~~acuta~~ crenata, villis minutis vestita

Panicula brachiata, verticilli ^{tri} ~~folii~~. Bractea cordata, ciliata
acuminata, concava, calycibus longior. Flores bravissima
pedicellati. Calyx compressus, pubescens, piloso-glandulosus; mu-
crnatus; dens intermedium lacin superioris brevius. Etling. l. c

procumbens - Sals. foliis ovatis rhomboidibus serratis, spicis gracilibus serratis. Caly-
culis pilis glandulosis hispida caule procumbente La Mart. P. Enc.
pag. 72.

Verbena minima Chamodrys folio Sloan. Jam. hist. 1. p. 172. Tab. 107.

fig. 2.

Habitat in Antillis &c.

non vidi.

126-127
Spinosa Salvia. folus oblongis & repandis, calycibus spinosis, bracteis cordatis mucronatis
concavis Lin Mant. 26 (Egyptica). Jacq. coll. 1. p. 39. Fi. rar. 1. 7.

Horminum Synacum Bauh. prodr. 104.

Habitat in Agypto &

Caulis pedalis vel ultra, obsolete quadrangulus, hirsutus adpressus - sive
glutiniferus, brachiatus. Folia petiolata, rugosa, obtusiuscula, sub
pilosa, suprema sessilia, acuminata, per ultimum cordata, attenuata
dentatum. Verticilli sexflori. Bractea cordata, concava, nervosa,
supra glabra, ciliata, in spinulam attenuata, calycis longioris
Calyx tubulosus, compressus, sulcatus, subqualis, dentibus quin
que aristatis. Corolla albo-tubus calycis parum longior: galea
emarginata *

viridis Salvia foliis oblongis crenatis, corollam galea semi orbiculata, calycibus fructiferis reflexis
F. V. p. 69. ~~Quint. 7. Jacq. Mus. vol. 2. p. 366. All. fl. Pedem. 3. C. Len. V. 16. pag. 27~~

~~Thorminum coma viridis Tournes. F. N. 4. 170~~

~~Salvia foliis ovato-oblongis obtusis equaliter crenatis, corollam galea semi orbicu~~

~~lata Hort. Ups. *~~

~~+ Habitat Pedemonti, Hispania & Barbana O~~

+ Salvia foliis ovatis crenatis, bracteis cordato acuminatis sensim deo rescentibus
viridibus in spicam tetragonam digestis Fenn. Gott. p. 296

similis procedenti at vix nisi varietati absque coma. Caulis
palmans vel pedalis inferne ramo uno vel altero saepe simplicibus
sumis obtusis ⁴ fultatis folia ^{et angustiora} ~~et angustiora~~ ^{supra} ~~supra~~ ^{et angustiora} ~~et angustiora~~
sub prima verticilli ^{et angustiora} ~~et angustiora~~ ^{et angustiora} ~~et angustiora~~
dino interdum labii superioris minutus

nervosa
bractes calycis
congruas

Othiopsis Salvia foliis oblongis, crenatis lanatis, verticillis lanatis, bracteis recurvatis
 et sub spinosis. Len. S. Veg. 72. Faug. Austr. t. 211. Ethng. Gal. no 20.

Othiopsis Matthi 1151.

Horminum syniacum album salvia foliis lanuginoso Monis. hist. 3. p. 393. s. 11. t. 13.
laciniata 9. Silarea laciniatis foliis Tournef. inst. 179 4f. 4.

ii *Othiopsis laciniata* foliis Barr. 24. Fi. 180.

Alpini V. Manum aegyptiacum alp. ex ot. 252. Vesting.

Horminum syniacum album salvia foliis lanuginoso Monis. hist. 3.
p. 392. s. 11. t. 16. f. 3.

Habitat in Gallia, Austria, Illyria, Graecia, Macedonia, inque Cap. b. Spei

Thunberg ♂

Caulis erectus, obtuse tetragonus, ramosus, lanuginosus. Folia radicalia
petiolata, saepe epithamum, crassa subinnata crassa, obtusa, lanugine
densa sessita, rugosa, superiora angustiora, acutiora. Panicula

ii. subrotunda brachiata. Verticilli triflori. Bracteis cordatis, concavis, pinnatis
do nervos & aristato, longitudine calycis. Calyx concavus, lobatus, lanatus,
superne ampliatu, trilobatus, dentibus quinque spinulatis
mixtis. Corolla laevissima, pubescens.*

Differt foliis profunde laciniatis v. magis oblongis basi proscindim sinuatis

peruviana Salvia

Habitat in Peru Guspusi herb.

Caules fruticosus, erectus, ramosus: rami incani, rigidiusculi. Folia petiolata, bipollicia
nā et ultra, lanceolata, acuta, glabra, nigra, ^{ante duplicationem in basi caulis} subtus tomentosa, in cana, subavenia, ener
ria, plana. Racemus ^{terminalis}, erectus, bi pollicaris. Verticilli cincti et diflori, ap
proximati. Bractea oblonga, acū mucato, unguiculari, longitudine calycis, decidua.
Calyx tubulosus, subditus, uti bractea, fructus. Corolla calyce parum longior, hirta

W. J. L.

caudata Salvia foliis radicalibus oblongo hastatis dentatis, bracteis cordatis calycibus pungentibus brevioribus gum mis sterilibus.

Habitat in oriente Hort. Celsii

Affinis S. argentea. Paulis herbaceus, erectus; obtuse tetragonus,
^{um nigri} ad presens, uti bracteis & calycibus ^{um nigri} nitris albis pellucidis hyalinis, sub-

petioli
 # folia supremi

bulatis. Folia radicalia longe petiolata, quinque pollicaria,
oblonga, basi inferne cordata, acuta lobis duobus oblongis obtusis,
utri apex folii, obsolete dentatis, pubescentibus, vellis rariis adpresso-
suprema cordato-lanceolata, persequi pollicaria, semiamplexicauc-
lio, acuta, inequaliter dentata, rugosa. Panicula bracteata. Vesti-
cilli remoti, quinque flori. Flores subsessiles. Bracteis gum mis sterilibus
subsessilibus. Bracteis cordatis, acuminatis, acutis, erectis.
Calyx campanulatus, semipollicaris, bilabialis labiis duobus adis-
peritis quinque ovatis, quinque terminatis. Galea linearifal-
cata, apice qua lenticis rare villosa, punctis resinosis adspersa, stami-
nibus longior. *

Solva vltima, folia radicalia oblonga hastatis dentatis, bracteis cordatis calycibus pungentibus brevioribus gum mis sterilibus.

~~Dentata D. foliis linearibus, oblongis serratis verticillis bifloris calycibus
membranis obtusis~~

~~Habitat in Cap. b. Speis~~

~~Fructus albus semipedales ramis ramis superioribus subtetragonis
subcaneiscentibus. Folia petiolata unguiculata angusta utrinque
que incana. Spica terminalis bracteis rhomboidi Calycis
state membranaceo campanulato magnitudine salvia africana
pilis aureis villosis prostratis caespitibus.~~

~~Salvia dentata foliis linearibus oblongis serratis pennatisque verticillis
bifloris latius calycibus obtusis~~

129
argentea

128

Palma folio oblongo dentato-angulato-lanato, verticillis 5em mis-
gerilibus, bracteis concavis. Lin. Spec. pl. 3 P.

Althionis tota argentea cretica lanuginosa Cup. h. ^{St. Cath.} ~~Cath.~~

Habitat in Creta. P

Caulis erectus, subtomentosus, glutinosus. Folia inferiora petiolo-
la ^{tri-~~sept~~} pollicaria, subcordato-oblonga, lanata, superiora sessilia
lanicolata; omnia dentato-erosa. Panicula brachista, pubescens,
viscosa. Bractea ovata, calyce brevior. Verticilli ^{sex} flori multi
de. Verticilli ^{sex} flori flores breviter pedicellati, florentes pe-
rorolla alba, magna: galea erecto, purpurascens-pubescenti.*

Lyrate Salvia ~~foliis~~ ^{foliis} ~~radicibus~~ ^{radicibus} foliis radicibus lyrate dentatis, corollarum galea brevissima
S. V. p. 60. 3. Spec. pl. 33. 3. Elling. s. 25

Horminum virginianum, caule aphyllis, foliis quercinis, tubuloso longo
flore monf. h. 3. p. 395 f. 11. t. 13. f. 27.

Salvia corollarum labio superiore brevior, faucibus patente Gronov. Virg

^{P. 4} ~~730~~ *Videritis Bugula folis mariana*, floribus purpureis longo tubo dona-
tis Pluk. mant. 171.

Melissa chorubens, *Bugula folis* Dill. Elth. 219. t. 175. f. 216.

Horminum virginianum foliis cuneiformi oblongis, caule bifolio L.
Spec. pl. p. 332. 2.

Habitat in Virginia 4

4 *β*. foliis finuato repandis, corollis plerumque imperfectis inferiora
Caules ascendentes rari pilosi. Solii obovata repanda basi lyrate
superius duo ultima subterminalia gemina sessilia oblonga, pilis raris compressis.
Ventricelli remoti sexflori. Bractea ovata acuta ciliata bracteola
utroque duo longitudinaliter calycem lineares. Calyx depressus: lobis
superioribus lato obsolete 5 dentatis inferioribus bifido dentibus omnibus
mucronatis. Corolla purpureo violacea. Calyx superior brevissimus
conicium. *β* foliis finuato repandis differt.

Candidissima Salvia incana, foliis ovatis puberoso dentatis, verticillis su-
premis sterilibus, bracteis ovatis calyce brevioribus
Salvia orientalis, foliis rotundioribus candidissimi Tournef. Cor.

p. 10.

Habitat in Armenia ~~Herb. mus.~~ Ex Herbario Vallantii

Habitus S. silarum, tota tomentosa cinerea. Caulis herbaceus, erectus,
siccus S. silarum, tota tomentosa cinerea. Caulis herbaceus, erectus,
crassitie penna arsenino et ultra. folia petiolata, spitha

minime angustata, sursum sensim minora, remota, ^{trifida} guttus prope dim. tomentosa

Calycis, corradicalia etate glabra. Spico ramoso. Verticilli remoti, ^{trifidi} ~~trifidi~~
flores secundi, pedicellati. Bracteis attenuatis in setam. Calyx
campanulatus, striatus, villosus: Labium superius trifidum
inferius bifidum; laciniis seta terminato. Corolla magnitudine
fere S. silarum, glaber, punctis aliquot resinosis ~~adspersa~~

adspersa. Stamina et ~~calycis~~ ^{stylus} ~~folia~~ longa.

candidissima Salvia

Salvia armena foliis rotundioribus candidissima Tournef. Cor.

Habitat in Armenia

Habitus l. *Salviae*. Caulis crassitie penna asperus et alba, ramosus, herbaceus, in-
canus. Folia petiolata, bipollicaria, ovata, acuta, inaequaliter dentata, maxima
angulata, nervosa, utriusque inaequalia. Verticilli remoti, plures 4-6 flori, supremi
steriles. Bractea ovata, attenuata, foliis brevior. Flores pedicellati. Calyx
campanulatus, striatus, villosus: labium superius dentatum 3 lobi, tubulatus, inferius 2 lobi
Corolla ^{alba} aequat punctis reflexis

131-190
phlomidis

Salvia foliis lanceolatis subintegris cauleque lanato-viscoso
Humb. bot. 1. p. 7
Salvia phlomidis; foliis lanceolatis, dentatis; hirsutis, viscidis.
A 890 Entrad. in Onyct. Arroy. 15 p. t. 4.

Habitat in Aragonia

Tota planta lanato-tomentosa viscosa, incana. Caulis herbaceus,
erectus, dodrantatis et ultra, rarius basi ramosus. Folia plerumque
radicalia, in petiolum angustata, obtusa, basi dentata, nonnulla
interdum dentato-binuata, plurima integerrima, bipollicaria,
duo vel rarius quatuor in caule. Verticilli ^{quodam-1919} ~~quodam~~ flori. Bractea
cordata, acuminata, minime pungens, apice recta, duo minores
q̄ta caulem terminant, & veriles. Calyx sulcatus, longitudine brac-
tearum; dentibus quinque lanceolato-subulatis, inermibus.
Corolla magnitudinis l. Helares.

rugosa L. foliis cordatis oblongo-lanceolatis eroso-crenatis rugosis pilosis subsistis, stamini-
bus corolla brevioribus Hort. kew. 1. p. 42. *

Habitat ad Cap. b. frei

vix efferens L. difformis: differt tantum staminibus brevibus saucem
aequantibus. Flores albi H. kew.

prope difformis colleri

non vid: an eadem cum rugosa

graveolens Salvia foliis cordatis rugosis crenatis inferioribus subsinuatis, spicis
ramosis hirsutissimis, bracteis cordatis

~~Cum herbis~~

Sclarea Aegyptiaca puticans fetidissima. ~~Arab. Fusia~~ Arab. Fusia. Ex herbario Fusia.

Habitat in Agypto

Caulis ~~radicosus~~ radicosus. Rami obtusa Tetrayoni, villosissimi. Folia
petiolata, bipollicaria, sursum sensim minora, inferiora cordata
oblonga, superiora cordata, obtusa, inaequaliter crenata, utrinque
rugosa, villosa, prosetim subtus, incana. Spica spithamea, infera
simpliciter ramosa. Verticilli approximati, pili sordida albissimi
hirsutissimi. Bractea attenuata, calyce breviores, supra
glabrae. Calyx subsessilis, campanulatus, tridentatus: dente superiore
ovato. Cotolla galea lineari-falcata pilosa, stylum brevior

Perflori

papilionacea. S. Solus ^{sub} rhombos oratis serratis supra nitidis, ~~et~~ verticillis multiflori, labio inferiore dependente

^{Dente in partito}
Salvia papilionacea. foliis ovato-lanceolatis, serratis utroque acutis: Corollarum limbo
^{di quadrijlo} Cavan. ic. 4. pag. 9. Tab. 319
Salvia nitida foliis ovatis utroque nitidis, verticillis 12-30 flori corolla laciniis
lateralibus revolutis. Bot. Decad. pag. 93.

Habitat in nova Hispania 4

Erecta. Caulis plures, erecti, obtuse tetragoni, canaliculati, molliter pubescentes,
originales et ultri, Rami brachiati. Folia ovata, petiolata, utroque acuta, obtuse serrata,
basi integerrima, rugosa, patentia, leviter pubescentia, supra nitida. Petioli foliis

Duple breviores, basi bifido. Racemi terminaliter, erecti, supralmares: verticilli
12-30 flori, distincti. ^(6 flori 2 gran.) Bractea ovata, concava, acuminata, caduca. Flores

patenter; pedicelli calycis duple breviores. Calyx pubescens, labio superiore
integerrimo, acuminato: inferiore bifido, acuto. Corolla coerulea, calycis duple
longior. Labrum superius fornicatum integerrimum extra villosum: inferius dependens
obovatum, inflexum: laciniis lateralibus ^{lateralibus} revolutis, ^{intermedia} ut emarginata. Stamina longitudo
ne fere galea: rudimenta filamentorum duorum minima. Stylus villosus, galea longior

121 420
trigritana Salvia foliis cordatis oblongis erodentatis rugosis dimis, bracteis cordatis mucronatis ciliatis, calycibus spinosis.

Clarea trigritana foetidissima, hirsuta, flore albo Tournef. inst. 119.

Herminum trigritanum Riv. monsp. t. 62.

Salvia Trigritana. foliis cordatis erosis, calycibus spinosis Bulla
vis spinosis, bracteis concavis mucronatis. Etl. Falco. n. 30.

Salvia foetida; foliis cordatis inaequaliter dentatis, rugosis dimis, bracteis cordato-acutis ciliatis longitudine calycium Lamarck illustr.
p. 69.

Habitat in Africa boreali &

Caulis fruticosus, ramosus, erectus, villis longis tomentosis adpressis, inter-
mittis alius brevioribus glutinosi, in calycibus et petalis rigidioribus, albi-
dis, pellucidis. foliis petiolata, long. tripollicaria, rugosissima, villosa,
interdum ovata. Bractea longitudine calycis, concava. Calyx amplius,
villosus, punctis albidis saepe adpressus, post florescentiam compressus
par. Corolla alba.

^{lobata viscosa}
acuminato S. foliis cordatis acutis serratis rugosis, ^{attenuatis} verticillis multifloris micropis
bracteis coloratis longitudine calycis

Sabra acuminata: foliis cordatis serratis acuminatis, speciebus Verminalibus
gloribus verticillatis, corolla calyce duplo longiore fl. Peruv. l. p. 24.
tab. 37. fig. 6.

Habitat in praeceptis Pella ad Cantus 2
Caulis ergalis, erectus, ramosus, sulcatus. Rami bracteati, aspergen
tes. Flores longe pedicellati, ampla, patenter, subtus venosissime.
Verticilli 6-10 flori. Flores pedicelli inaequales. Bractea oblonga ob
ovata, acuminata, uncinata, caduca. Calyx tubulosus, res
sus. Labio superiore integro, acuto, inferiore bifido. Corolla uncin
nata, calyce duplo longior. Stylus exsertus. fl. P. l. c.

Ceratophylla 132 Salvia foliis rugosis ^{gimis} lanatis radicalibus bipinnatis fidis
caulicis pinnatis fidis, verticillis summis & sterilibus.

Horminum genus angustis laminesis profunde sectis foliis
Rauw. h. docp. 1. p. c. 9. p. 129.

Horminum rugoso verrucosaque folio cornu cervi expri-
mente Pluken. alm. 106. t. 194. f. 5. Monis. hist 3. p. 393. f. 11.
t. 13. f. 6.

Salvia Ceratophylla; foliis rugosis pinnatis fidis lanatis, verti-
cillis summis & sterilibus. Lin. Syst. veg. 72.

Salvia exasperata; foliis rugosis exasperatis; radicalibus
bipinnatis ~~fidis~~ petiolatis; superioribus pinnatis, sessilibus,
connatis: caule paniculato ramosissimo. Cavan. in an. hist.
nat. madr. vol. 3. n. 4. p. 113. t. 17. Ic. vol. 6. p. 30. t. 558.

Habitat in Mauritania, Syria, Persia ♂

Paulis crassitie pennis aserino vel ultra, cretus, sulcatus,
lanatus, superne pedunculis paniculatis brachiatus. folia radi-
secta

petiolatis; caulina sessilia vel semiamplexicaulia: laciniis alternis
lanceolatis, aequa inaequalis, biouato-dentatis, obtusis, e rugis copiosis
bimis verrucoso-squamosis, utrinque lana longa laxa vestitis.

#Tomar
4000 Vesticilli remoti, sex flori. Bractea cordata, acuminata, spinu-
osa pungente terminata. Calyces sessiles, lacinati; dentibus quin-
que, seta rigida terminatis. Corolla purpureo-violacea.
Lobi in solo pinquiori, ruga parum obliterantur, aequa magis
glabra evadit.

133
ceratophylloides Salvia foliis pennatifidis rugosis petiolatis, verticillis omni-
bus fertilibus hirsutis bimis

Salvia Arduini Spec. 2. p. 12. t. 2.

Salvia ceratophylloides; foliis pennatifidis rugosis, caule pani-
culato ramosissimo Lin. Mant 26.

Habitat in Aegypto, Sicilia.

Planta spontanea Corsicae gaudet caule basi frutescente,
palmani, basi ramoso, e pilis albidis ^{peresis} canescenti: & foliis
petiolatis, supremis tantum sessilibus; laciniis alternis
lineatis, inaequalibus, obtusis margine flexis ^{uno} undulatis
pilos: verticillis sex floris, oppositis, floribus pedicel-
lis: Bracteis cordatis extus, calycibus hirsutis bimis.

#g is, uti antea
dens

Caullis parvis.

Culta multo altior evadit, foliis latioribus, rugis fl-
fare obliteratis, i.e. spontanea folia ruge & rugis numerosis piis sermone
a S. ceratophylla differat quod densa pilosa, nec laxa cu-
pata tecta.

~~Amansifera~~ *Salvia* foliis cordatis acutis crenatis rugosis, pinnis erectis
corolla lobis inferiori amplo Ortega Dec. pag. 4.

~~Habitat in Regno mexicanis 4.~~

~~Caulis plures erecti, velis glanduliferis adpressi. Stipulae
longe petiolatae. Petioli basi pubescentes biallopi. Spicae
terminales sessilibus 6-10 floris. Flores pedicellati
rotundi tubo albo.~~

est *Salvia polytachya* Caran. vol. 4. et in vol. 5^{to} *S. polytachya* Ort. eandem esse
non vidi. dicit autem esse *polytachya*

nutans ¹³⁴ *Salvia foliis cordatis obsolete quinque lobis cassis, caule subrotundo,*
ramentis nutantibus Elting. Ed. v. n. 47

Salvia foliis cordatis, obtuse crenatis, spicis florum nutantibus Kera
Chenia nitens in nov. Comment. Petrop. 1. p. 378. t. 14

Salvia caule nudo, spica florente pendula Hall. in Comment.
Gott. 1. p. 210 t. 11.

Salvia nutans, foliis cordatis inaequaliter basi excisis, caule nudo,
spicis ante florentiam cernuis. Lin. Syst. Veg. 72.

Abitat in Imperio ~~et~~ Rutheno &

Caulis pubescens, inferne et ad radicem foliosus, superne aphyllus.

Folia radicalia, palmata vel bipinnata, longissima petiolata,
cordato-oblonga, basi altera latere ^{altius} sinuato-~~profund~~, acuta, supra-
glabra, subtus villosa, cinerascens: caulina dum parva, petiole-
ta, structura radicalium. Rami ad apicem caulis, plures, oppo-

siti, tri vel quadripollicares. Verticilli ~~10~~ flori. Bracteae cordatae ner-
vose, acuminatae. Calycis compressi, reflexi, villosi, striati. Corolla patu-
rate coerulea, interdum alba. *

non folio

Best-decim

Squarropum Conjunctum species *Squarropi* Hort. Urf. 3* S. V. p. 53.

Rhagrostis foliis arundinaceis Bumb. cent. 3. p. 30. 755.

Habitat ad Wolgam Tataria, inque desertis Caspaeorum O

similis *hypsopylo* sed duplo major, magis procumbens. Caulis glaber
in precedente parum scaber cum villositate quadam. Folia duplo majora
et robustiora. Ramorum apices magis imbricati foliis, hinc quasi spicati
an satis diversa? Lin.

ramosus. Vires luteis albidi striatus. Superne villosus. Folia angustiora
quam in ~~anteced.~~ *hyps.* longiora. Spica unguiculari ped. primo
menstris subsessili, villosa floris inferiori cernitioribus bracteis inferiori
lineari lanceolata superioribus ovatis cuneolata margine membranacea
et foliis mucronis brevi flavescente terminata.

Dea

ramosa saepe sive pallas

Am. nithen. p. 159. Conjunctum species *hec.* quod 55 Bumb. cond

135
hastata ^{Salvia} foliis hastato-lanceolatis crenatis caule pubescente, racemis cernuis Ell. Conf.
^{Salvia}
~~noy 40. 40. †~~

Habitat.

affinis nutanti. Caulis erectus, obtusus pubescens, inferne et ad radicem foliis
sursum, superne aphyllus ramosus. folia inferiora basi inaequaliter et fere
hastata; hamo haste duplici; postico brevi retrosum, antico majore,
antrorsum spectante; tertio minimo his saepe interjecto; lanceolato-triangula
cana, dupliciter crenata, acutiuscula, rugosa, supra glabra, subtus leviter
pubescentia. Petioli lati. folia ramis subpedita parva, angusta, cordato-
lanceolata, fere integerrima pubescentia. Racemi laterales plures et termi-
nales, erectiusculi. ^{nonnulli a/ b/ c/ d/ e/ f/ g/ h/ i/ j/ k/ l/ m/ n/ o/ p/ q/ r/ s/ t/ u/ v/ w/ x/ y/ z/} Verticilli ~~per~~ flori. Bracteae calycis minores
cordato-nervosae, acutae, pubescentes. Corolla S. nutantis Sext. G.
ling. l. c.

betonicifolia Salvia foliis lanceolatis crenatis, caule subnudo, racemis
cernuis Elling. Sal. no 49 +

Habitat.

Convenit habitu cum *S. nutanti*, caule ad radicem et inferne tan-
tum folioso, superne aphylo, obtuso, pubescente. Folia radicalia
quoque per longe ^{isime} petiolata, omnia basi inaequaliter secta, et
lanceolata, inaequaliter crenata, inferiora obtusa, suprema
acutiuscula, rugosa, supra laevia, pubes laevissime pubescentia.

An modo varietas *S. nutantis*? Elling. l. c.

An hui spectat: Sal. acutifolia, foliis cordato-lanceolatis acutis cre-
natis, racemis cernuis nudis, bracteis brevissimis La Mart. illustr. 1.

p. 68^a

~~Salvia~~

~~Sclarea orientalis bitonica folio acutissimo coma purpurascens Tournef.~~

~~Cor. pur.~~

~~Habitat in oriente herb. Mus.~~

habes

pendula 137 Salvia foliis cordato-lanceolatis ^{calat. pule} crenatis, racemo nutante.

Habitat. - Hort. Hafn. 4.

Caulis erectus, simplex, ~~pedalis~~ ^{resquipedalis}, acute angulatus, pubescens, perpetua lineato-puncta

Stem. folia plurima radicalia, duo vel trium parium in ^{remotissima} caulibus ~~caulis~~

cordata, sinu petiolata, bi s. tripollicaria, petentis vevia, pollicem lata, superiora laevia, angustiora, ~~amulata~~ ^{angulata}, rugulata, supra glabra subtus villosa, obtusa. Nervi

verticilli sex flori. terminali, solitarii, tripollicariis ante florificationem nutant sensim

erectis. Bractea cordata, acuminata, longitudine calycis, ilicita, colorata.

Calyx multi striatus: labium superius obtusum, obsolete tridentatum; inferius bidentatum; dentibus acutis. Corolla violacea, magnitudine S. sylvestris:

labium superius compressum, ve pubescens, punctis minutis albidis asperum:

labii inferioris lacina intermedia subrotunda, ~~depressa~~ depressa,

concava, integerrima; laterales lineares, obtusae, erectiusculo. Stylus labio superio
re longiore. *

Ad nutantem differet foliis per petiolum non decurrentibus, racemo solita
ris, flori bravibus. Quidam subop

Differet S. nutante foliis statim ab basi ad in verticillariis, descendentibus per illum nodulum decurrentibus; sinu basico; non operta; crenatis con
dis que o qualibus; racemo brevis solitariis.

prostrata Vernonia racemis lateralibus, foliis oblongo-ovatis serratis, caulibus prostratis L.S.V. Sp. pl.

pag 17. 22. Pollecht. h. n. 15

~~Cha Ternio Vestia foliis Clus. hist. pag 349. f. Halb~~

~~Chamaedrys frunda minor angustifolia Bauh. Pin. 249. Prodr. 117. Bauh. h. 3. p. 287.~~

~~Sernonia foliis vix ellipticis, dentatis, supremis linearibus, ex aliis racemosa Hall. h. fl. 530.~~

Habitat in Germania, Italia collibus ^{ad} ~~4~~ ^{asperis}
caulis palmatis, ^{vev} ^{vetra} densifolia, ^{sem} ^{an} ^{tomentosi} Sollei ^{se} ^{plea} ^{unquicula}
na inferna mucosa obtusipina, ^{et} ^{stipe} ^{ferrata} ^{vix} ^{pelosa} ^{vello}

estima
supremis angustis
subinterprimis

Pedunculi duo ex alio ^{ferrato} ^{ultimi} ^{oppositi} ^{cum} ^{ramulo} ^{inferna} ^{caulis}
~~alterius excrepante foliis lanceolatis subtomentosi. pedunculi~~
Digitales a medio ^{flexerit} ^{vix} ^{pubescenti} ^{floris} ^{conspic} ^{approxima}
si bracteis lanceolatis ^{longioribus} ^{pediculis} ^{calicis} ^{calycis} ^{linear}

more affinium
limba altilior

~~laniceolata ^{con} ^{glabra}~~
^{obtusis}
planis serratis ^{obtusis}
foliis in senioribus oblongis ^{superioribus} lanceolatis
^{planis}
et stipe serratis, caulibus ^{asperis} ^{afien}

~~dentibus subtomentosi bracteis lanceolatis~~

~~Frustrum pelosa et hinc randa a se diffare vident~~

Habitus. folia opposita, plus minusve venoso-nervis. Flores plerumque
verticillato-racemosi in bracteis glipati. Reliqua diversa in di-
versis.

Tomentosa *Panicum*

Galathea in America meridionali herb Thoniani 5

Rami tripartiti. Digit. minimi, flavescente tomentosi. Folia petiolata, opposita
subhamosa ad altera, oblongo-ovata, per petiolum parum decurventia, ad
v. s. f. indurata, acuta, pollicis 5 que lata, remote obliqua nervosa, sub
tus lobata, utrinque villosa, subtus tomentosa. Petioli pollicares tomen
tosi. Panícula terminalis subtrichotoma. Flores unguiculatus ciliatus
tomentosi: lacina ovata, acuta, margine hispida. Stipula oblonga
pollicaris, hirsuta obtusa. Pedunculi pediculi compressi. Fructus polli
cari ad altera cylindrici, basi, glaber, laevigati, basi acuti

Loc: videtur ^{hirsuta} flor. per et diversa et videtur a majori
folia

Stachydis ⁹⁴ Salvia villosa, foliis crenatis, inferioribus ovatis oblongis, superioribus ovatis, bracteis ^{foliaceis} maximis cordatis. ~~acuminatis~~

Habitat in Sibiria. ma cum communicata a Dr. Meyer.

si equaliter
crenata)

Caulis herbaceus, erectus. Solia inferiora ^{rupe} petiolata, bi- & tri-pollicaria obtusiuscula, venella albida. Tomentosa, etate glabrata, virens, superiora sessilia, bipollicaria. Racemi ex axillis supremis et apice, elongati. Ventiliquae 8 est flori. Bracteis remotis. Bracteis radantis rimae infimae & omnes venosae, consistunt ^{foliorum} foliorum, subtus villosae. infimae sesqui-pollicariae, calycis triplo vel quadraplo longior est partem sentem menura crenata, superum semper minor, acuta. Calyx nervosus, nervis pelosis, punctis albidis adspersus, bilabiatus: labium superius tridentatum, inferius bidentatum, denticulis acutis: Corolla calycis pa-
rum longior: Galea albida punctata.

nil nisi vanda culta sal. grandiflora

Senecio salvia foliis cordatis serratis mollibus, floribus racemosis spicatis: corollis vix
calycem exsertentibus L. V. p. 69. 7. Spec. pl. Mart. p. 25. Ehng. l. 12. 4

Salvia foliis cordato-ovatis serratis rugosis, bracteis subverticillis fenis, caly-
cibus tridentatis Ard. Spec. 1. p. 10. 7. 2.

Habitat in Cheo? 375

Caules sequipedales basi frutescenti pubescens subinermis. ⁱⁿfoliis ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia. ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia. ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia.

adultum glabrum tantum rugosa sequipollinaria obtusa. Bractea lanceo-
lata molliter villosa propositum subtus obtuse ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia. ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia.
nave lanceolata ciliata decidua bracteola 40 per statera pedi-
celli brevioribus. Racemus terminalis pedicelli inferne 2-12
superne pauciores. Calyx ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia
foliis bilabratu labis inferiore bidentato acuto, pili ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia ⁱⁿsenescentia
dulces viscosi. Corolla conulea calyce parum longior

^{obtusis}
inqualiter serratis mollibus, calycibus villosis
viscosi acuti

varietas Dominicana secundum Hooker

integri-folea Salvia

Habitat

Herb. Desfont.

Caulis villosus-rufus, tomentosus, superne bracteatus. Folia superiora sessilia
ovato-lanceolata, attenuata, subserrata. Verticilli sessili. Calycis utri-
usculi lobis villosis. Radice minuta, ovata

Species dubia deo que non censui