

Sambucus

1

1. ebulus L. cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo
2. japonica L. cymis tripartitis, stipulis nullis, caule fruticoso
3. canadensis L. cymis quinquepartitis, foliis subpinnatis, caule frutescente
4. nigra L. cymis quinquepartitis, foliis pinnatis folioli subovatis, caule ar-
boreo
5. racemosa L. racemis compositis ovatis, caule arboreo

pubera Cambius

Habitat in Carolina herb. Brit.

Folia saepe trijuga: foliata duo in femarum parium, saepe bi-partita

herb.

Arborescens Pambicibus

Habitat in Tava Commerçon herb. Fus.

Rami teretes, glabri. folia petiolata, opposita, pinnata, superiora ternata: foliola opposita, petiolata, 4-5 pollicaria, ^{lanicollata} argute serrata, attenuata, glabra, nisi subtus in venis, ultima parum decurrentia, in sequentia simplicia, altero latere basi breviora infima saepe introrsum foliolo 1. 2. aucta reliqua minores. glandula saepe prope foliola infima. Pyna quadrifida.

Savonica I.

Herb. Thourini

Folia 4-5 juga: foliola inferior petiolata, lanceolata, serrata ^{ulata} venosa, glabra, attenuata, tripollicaria, exsertum minus. Glandula interdum inter duo inferiora parva. Nervi glabri. Cyma quadrifida

Riana.

Ebulus Sambucus ramis tripartitis, stipulis foliaceis caule herbaceo Lin L.V.
pag. 295

Ebulus Duchf. h. 68:

Sambucus humilis f. Ebulus Bauh. Pin. 456.

15 *Sambucus humilis f. Ebulus folio lacinato Bauh. pin. 456*

Habitata in Europa 2

Caulis sulcatus angulatus glaber. Folium pinnata 4-juga. Foliola
subopposita trifolia lanceolata, glabra anguste serrata, si f. triplo-
licaria, altero latere basi breviora. Pedunculi partialibus tri-
fidis ramosis

si varietas laciniata nigra speciei distincta est, hinc etiam ut speciem
agnoscenda

japonica L. cymis tripartitis, stipulis nullis, caule fruticoso Thunb. fl. jap. p. 125 & L. V. p. 295

Habitat in Japonia

Fruticosa ramis coriariis glabris oppositis, teretibus, patulis. Folia opposita,
perinata cum impari foliola 7. 11. 15 ovata, acuta, saepe acumina-
ta, serrata margine cartilagineo albo, glabra, pollicaria et paucis
ultra. Flores paniculato cymosi terminalis, Cyma trichotoma
absque bracteis. Stylus filiformis Thunb

Folia opposita: foliola lanceolata serrata cyma racemosa herb. Royen

Lusitania Drosera papus radicatis foliis subulatis subtus convexis floribus d. et andris Len.
Spec: 403 * Mant. 360 * L.V. p. 304.

Ros folis lusitanicus; foliis aphodeli minoris Monf. h. 3. p. 620. f. 15. t. 4. f. 2. Plukh alm
323. t. 117. fig. 2. Raii suppl 551.

Habitat in Lusitania

Rapum aliquot foliis; ad apicem florem 2. f. 4. pedunculati. Capsula calyce duplo
longior uniloculari. Planta tota fere apice glandulosa Len. Mant. l. c.

canadensis Sambucus cymis quinquepartitis, foliis subtinnatis caule futescente An
Spec. plant. p. S.V. p. 295

Habitat in Canada &

Media inter Samb. Elaeagnifoliam et nigram habitu nigro ^{at} foliola elliptica magis
ovata, inferiora ternata: Caulis plerumque perit supra terram hinc
Stipula truncata ut in nigra nec expansa in foliola ut in Ebulo
Foliola 3 plici 3 juva anguste serrata, elliptica bi pollicaria Pedunculi
pariales ~~se~~ umbellati Dichotome ramofi flores 3 plici

Zeylanicus *Allophyllus* ^{Lin.} flor. Zeyl 140* P. V. p. 360.

Habitat in Zeylona.

Arbor Persea Jacq. Ramis teretes. Folia ovalia, pithamga integerrima
glabra, venosa, alternata petiolata. Racemi et alis parvis brevissimis
L. C.

negra Sambucus cymis quinquepartiti, foliis pinnatis: foliolis puberatis caule arboroso
Lin. S. V. pag. 299

pulla Sambucus Brunfels.

God. 845

Sambucus fructu in umbella nigra Bauh. Pin. 456

laciniata. Sambucus laciniata folio God. pempt. 845.

vindis Sambucus aeterna specier. God.

Sambucus fructu in umbella vindis Bauh. Pin. 456.

Habitat in Europa, Japonia.

Arbor mediocanis cortice rugoso. Folia 2 puga cum impari. Foliola acute
ternata, petiolata, pubes. arborata terque pollicaria acuminata.
Pedunculi pariales umbellati. Flores pedicellati

S. arborea herb. 4 usq
Folia lanceolata, basi subovata, altero latere basi breviora.

Sambucus

Samb. lanceolata Benth