

Samolus

1. valerandi. L. caule erecto, foliis obovatis, floribus racemosis  
2. prostratus. L. caulibus decumbentibus, foliis spatulatis, floribus axillaribus  
Solitariis

Valerandi S. Lin. S. V. p. 212. Cl. D. Tab. 190

Argallia aquatica, rotundo folio non crenato Bauh. pin. 252.

Cilifne aquatica, rotundo folio non crenato folus rotundi beccabunga Monj  
herb. 2. p. 323. f. 3. v. 24. fig. 28.

β. Samolus africanus, folio rotundiore Walth. herb. 162. v. 23.

Habitat in montibus Europæ, Asia, Africa et America boreali, ad littora  
fontes & rivulos

Caulis erectus, superne in ramos floriferos diversus glaber pubescentus  
semipedalis: rami simplicissimi. folia ~~radicalia cuneata~~  
obovata, radicalia plura majora caulina <sup>follicularia</sup> sespilia  
cylindrica, <sup>alternis</sup> integerrima, mucrone minuto terminata  
racemi ex aquæ ramorum et caulis. flore distantes.  
Pedicelli in medio bractea minuta lineari

Valerandi caule erecto, foliis obovatis floribus racemosis

2 prostratus l. caulibus <sup>proscumbentibus</sup> decumbentibus, foliis spatulatis  
Sheffeldia repens Torr. n. gen. p. 17. Tab. 9. Lin. Suppl. 1363  
Habitat in nova Zelandia

Caulis filiformis, glabriusculus. Folia alterna ovata, basi  
attenuata, obtusa unguiculata superne sensim minora  
pedunculi axillares solitarii folio parum longiores.  
~~Raceme~~ <sup>racem</sup> ~~quingue~~ ~~pediculis~~ ~~sem~~ ~~quamo~~ Corolla quingue ~~stamina~~  
nibus ~~staminibus~~ habet ~~Torreri~~  
Facies peploidi.