

Compositae Wolfia Schreb
Sania g. Arn. cum Sam
gen. Richard

Samyda

1. parviflora L. floribus decandris, calycibus ~~reflexis~~, foliis ovato-oblongis acutis ^{mutatis} serratis
subseratis
to glabris,
2. villosa L. floribus decandris, foliis oblongis subserratis basi obliquis, pinnis subtus
villosis; pedunculis solitariis axillaribus
3. glabrata L. floribus decandris, foliis ovato-lanceolatis integris nitidis, pedun-
culis axillaribus unifloris
4. spinescens L. floribus decandris terminalibus, foliis lanceolato-ovatis obtusis
crenatis glabris, ramis patulis spinescentibus
6. pallida L. foliis oblongo-lanceolatis serratis glabris, pedunculis axillaribus
aggregatis
7. nitida L. floribus octandris, foliis cordatis glabris
8. spinosa L. floribus octandris ramis spinosis
9. pubescens L. floribus dodecandris, foliis ovatis subtus tomentosis
10. semulata L. floribus dodecandris, foliis ovato-oblongis serratis
ulmi folia

Sameya parviflora floribus deciduis, foliis ovato oblongis acuminatis glabris sub
ferratis
Fritex albopescens Mancgr. hist. pag. 81. fide herbarii Mancgr.

Flexuosa Samyda

Habitat in Puerto Rico herb Dayfont.

Crani teretes, flexuosi, supi, superne flavescens allosi. Folia brevi
ter petiolata, patenti, 3-4 polliciana, elliptica, utrinque glabra et
punctata, supra laeva, subtus venis exstantibus reticulata, remota denti-
culata, dentibus subglandulosis, acumine brevi terminata. Petiolus semi-
unculari. Stipula subulata, decidua. Flores axillares, solitarii, sespali;
magnitudine *Samyda serrulata*, subtomentosa, quinquefida. 10 ondra?

Lamyda

Habitat in H. Domingo

Rami pubescentes. Folia petiolata, alterna, oblonga, acuminata, utrinque acuta, crenata, subtus villosa, supra glabra, venosa. Pedunculi axillares, plures, petiolo parum longiores, semiunguiculari. Flores pubescentes. Stamina 8, connata, apice antherifero

Calophylla Lamyda foliis oblongis venosis integerrimis obtusis primis acuminatis,
pedunculis aggregatis unifloris

Habitat Capense Richard herb. Mus. 5

Tota glabra. Rami purpurascens, superne compressi angulati. Folia ovata,
5-6 pollicaria, petiolata, glaberrima, utrinque venis constantibus
pulchre reticulata, subtus discolora, subcoriacea, utrinque rotundata
apice acumine unguiculari terminata. Petioli unguiculares, Pedun-
culi & Tuberculis supra eia unguicular foliorum, pollicares, saepe novem
uniflori. Calycis foliola quinque.

Lamydaz.

Habitat in Domingo? herb. Jusf.

Fructus praemi superne compressi angulati, villosi. Folio petiolata, 1-2 pollicaria,
oblonga, utraque acuta, apice attenuata, mucrone terminata, pellu-
cido punctata, integerrima, subtus villosa subtomentosa. Pedunculis axil-
laribus, plures, uniflori, citandis.

Caesaria

Habitat in Insula Bourbonia Comerson herb. Guss. 4

Rami teretes, glabri, flexuosi, cortice cinereo. Folia petiolata, alterna, bipinnatifida, utrinque glabra, obtusa, basi acuta, integerrima, obsolete venosa, pellucido punctata. Petioli unguiculari. Pediculi atillares. 5-6. longitudine petioli, glabri. Stamina 10. interjectis totidem fatis & illopi

5 serrulata Amyda floribus dodecandris, foliis ovato-oblongis serrulatis Lin S.V.
pag 409 Gaerth. Coll. 2. p. 320. t. 17. fig. 1. Amer.

Quisnoia ulmifolia, flore albo niveo Plum. gen. 4. sc. 146. fig. 2.
Habitat in America.

Rami teretes, flexuosi inferne purpureo-pentes subullosi superne tomentosi
ferruginei. Folium breviter petiolata alterna bipolliciana utrinque
venosa nervosa, vena villosa profertim pubes facta mollis. Flore
obtusifida
dentisuli remoti
fidiuli acuti cras
si usuli
Stipulo petalis
Deciduo
axillares rami subsessili, ~~obtusifidi~~ truncus oblongo mucronatus

Planta junior glandat foliis inferioribus lineariibus, glabris remote denticulatis
superiorum latiora herb. Ruth.

genus: proppium Ruthario Quisnoia dicitur vide Obs. n. 140. b.

Stem in fasciculi paucifloris, axillariibus solitariis: pedicelli brevis prope basim articulat.
Bractea parva, foliolata, plura ad apicem pedunculi communis. Calyx campanulatus, mi-
bello rosens, squae patenti, latioribus incumbentes, una qualibus demum patenti fons
ovatis, una major et extenore, seta terminata, altera apiculo recurvo acuto oppositi
que obtusissimi, extenuosa pubescentia. Stamina usque, 16 uterum 11-12. P. Delpho, tubo

erecto, limbo multo brevior. filamenta dilatata, planiuscula, apiculo terminata, su-
perne distincta. Anthera erecta, oblonga, angulo prismatica, 4-fidata, apice acum-
inata, basi leviter emarginata. Germen ovatum, pubescens densius in stylium rectum
altitudine Antherarum. Stigma capitatum. Emittit capsula ovata baccata
quod nomen nominanda Salomydio preparanda secundum Richard. herb. Ruth.

viridiflora L. foliis oblongo-ovatis serrulatis subtus tomentosis. Alubl. pl.

qu. l. p. 402.

Habitat in Guiana

non vidi

Multiflora - Sanguis flori bus octandris, foliis ovatis utraque acutis infer
ne tomentosis Cav. ii: 1. pag. 40. Feb. 67.
Habitat in Insula Domini 5

2 nitida Samyda floribus orbatis foliis cordatis glabris Linn. V. p. 407.
Samyda foliis nitidis cordatis lobis pinnatis crenatis rudimentis mollibus rubentibus, racemosis tenuioribus alaribus Brown. Jam. 217. t. 23. fig. 3.
Habitat in America &c.

parviflora Amygdalis foliis ovato-oblongis acuminatis glabris subserratis, floribus deciduis

Amygdalis parviflora Loeffl. J. 260.

Amygdalis foliis ovatis cum acumine, fructibus plerumque minoribus confertis Brown
Jan. 217.

Amygdalis parviflora: floribus deciduis, foliis ovato-oblongis utraque glabris
Lin. S. V. pag.

Habitat in Anfulis Americae

Diversa a Capana parviflora Jacq. Rami teretes glabri, juniores fusci ^{laevi}

Rami aneri
glabri juniores

Foliis
superne compressi

Folia petiolata, alterna, me bi s. tripollicaria, acumine longo obtuso
terminata, membranacea venosa, interdum integerrima, interdum levi
ser serrata. Peduncululi a tuberculo axillari, plures, capillares breves glabri
uni flori, petiolo brevior, flori parvi.

Stylus infidus. Stigmata 3 ciliata Ruth

glabrata. floribus delandris, foliis ovato-lanceolatis integris nitidis, peduncu-
lis axillaribus unifloris Sw. prodr. p. 60.
Habitat in Jamaica

non vidi

fruticosa l. floribus decandris terminalibus, foliis lanceolato-ovatis obtu-
sis crenatis glabris, ramis patulis frutescentibus Sw. prodr. p. 68.
Habitat in Hispaniola

non vidi

arborca *Samyda* foliis lanceolato oblongis, longiuscule adamentatis, femula
tis subtus pulverulento subsermentosis Ait. for. her. P. 1. pag. 109
Habitat in America merid.

Et eadem ac *Samyda* a Ryano foliis subtus incanis fida herb. Richard
non vidi.

rallida
glauca *Samyda* foliis oblongo lanceolatis serratis glabris pedunculis axillaribus aggregatis
Habitat in India Orientali Hongkong
Rami teretes glabri flexuosi. Folia petiolata ^{vel 4'} tripollicaria, ^{senesca} glaberrima obtusiuscula
tenuis villosa sicula, patentissima. Flores axillares aggregati, breves pedunculati copiosi.

anuriza lanceolata La Martini hucusque valde affinis folia versis subtus villosa

Dioica Guilfordiana *enervis*, foliis bipinnatis: basi apice simpliciter pinnatis L. S. V. p. 396
~~*Bondui canadense polyphyllum non junosum*, mas et femina Du Hamel Arb.~~

1. p. 103.

Habitat in Canada

villosa L. floribus decaedris, foliis oblongis subternatis basi obliquis, fereis
subtus villosis; pedunculis solitariis axillaribus lvs. prodr. p. 68.
Habitat in Jamaica L.

non vid.

3 pubescens *Samyda* floribus dodecandris, foliis ovatis subtus tomentosis Lin. h.V. p. 409.
Crataeae baccifer folio oblongo integro, flore pentapetalo pallide albo odorato pino
Hort. hist. 2. p. 109. ? *Crataeae* dendr. 75?
Samyda foliis ovatis villosis, floribus confertis, fasciculatis parvis Buron. Jam. 218?
Habitat in amena

folia in mea (si modo hanc) oblonga obtusa supra tertia
mollia subtus venosa reticulata cinerea
Synonyma dubia