

39

~~40~~

Saniclesia

Cal. 5-partitus. Cor. tubulosa, 5-fida: laciniis revolutis, 2
superiores breviores. Stam. 4-2: sterilia. Anth. aristata. Caps
2-valvis, 2-locularis. Sl. per. prodr. s. t. 32.

oblonga 1. Santheria foliis oblongo-lanceolatis subsessilibus utrinque glabris, basi
teis linearibus +

Santheria oblonga, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, petiolis ala-
tis. Flor. Peruv. t. p. 7. t. d. f. 6

Habitat in Peruvia stagnantibus et umbris

† Petioli marginati. Caulis ramosus. Solia basi valde attenuata, apice minus, subcinerea.
~~Pet. marginati~~ Spica solitaria, vel ternis, laterales breviores. Verticilli multiflori.

Involucri foliola magna, integerrima, erecta, pedunculis fere septem
sessilibus. Bractea integerrima, hispida. Calyx luteus. ~~et strobilatus~~

Corolla hirsuta

et Calycis laciniis obovato-spathulatis, superne concavis,
emarginatis, duobus interioribus angustis. Corolla tubum

officinalis Rosmarinus L. V. Sp. pl. pag. 33. Hall. hist. 250. Scop. Fl. Car. 30
Rosmarinus sylvestris seu major Cord. hist.
Rosmarinus spontaneus latiore folio Bauh. Pin. p. 217.

~~Rosmarinus Tournef. F. R. H. p. 195. t. 92.~~

~~Blattus L. 159~~

β. Rosmarinus hortensis angustiore folio

Rosmannus Benth.

Rosmarinus hortensis angustiore folio Bauh. pin. 217.

Habitat in Hispania, q. Narbonensis, Italia, Orientis Gallie & Barbaria
ælibis $\frac{2}{3}$ Japonia $\frac{1}{4}$

Toutex 3-5 pedalis ramosus. ramis erectis striatis tetragonis
canescentibus rudemata ramulorum ex axillis. Folia
opposita sessilia linearia obtusa revoluta subtus rugosa
& tomentosa. Racemi pauciflori breviter ex apice ramu-
lorum lateralium pedicelli oppositi canescenti uti calycis

— folia sessilibus

ovata 2 Santheria foliis ovatis petio latioribus subtus pubescentibus, bracteis oblongis emarginatis.

Santheria ovata; foliis ovatis acuminatis, petiolis hemicylindricis. fl. per. ^{ut} t. p. t. s. f. c.

Habitat in Panuvia stagnetis et umbrosis. Ex herbario Gussipidi vel Thoni ni ~~in~~ fallor.

Caulis herbaceus, orgyalis, tetragonus, glaber erectus, glaber. Flores in spi
ca scissillata, involucriata. Involucrum diphyllum: foliolis ovatis, per
phyllis. Bractea purpurea. Corolla lutea. Filamenta hirsuta.

Caulis non divisus. Folia patentia, crenata, venosa, supra nitida. Involucrum folio
la conivax, acuta, apice reflexa, purpurea. Calyx tubulosus, inferne
angustatus, purpureus. fl. per. t. c.