

Sanicula

1. europaea L. foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus
2. canadensis L. foliis radicalibus compositis: foliolis ovatis
3. maritima L. caule folioso, flosculis masculis pedunculatis: her
maphrodito sessilibus

Anthemifolia Lanioula foliis decompositis linearibus, umbellis
trifidis. Willden. l.c.

Habitu. in *Sauria*.

Arctedia squamata Pallas novu Act. Petrop. 10. p. 308.

Caulis semipedalis ramosus divariculus.

Folia radicalia pinnato decomposita longe petiolo-
la basi vaginata, foliolis ternatis linearibus; cau-
lina ternata foliolis linearibus. Umbella trifida
umbellulis trifloris. Involucrum universale nullum;
partiale diphyllum. Semina bina coherentia subglo-
boso-orata stylis persistentibus et squamis adpressis
instructa.

Copenhag. Saniula

Habitat in Cap. b. ppei herb. Mus.

Caulis angulatus, glaber, superne dichotome divisus. Sola caulina ternata, superiora
opposita, unum in medio: foliola sessilia, lateralia opposita, unguis, internodi-
um utrinque acuta incisum, omnia glabra, serrata: serraturis mucronatis.
Umbella quadrata: radice tri flori; flores sessiles. Semina satis glabra hirsuta.

Javanica lancula

Habitat in Java. Common for herb. 4usf.

Caulis sesquipedalis, 5-6 ^{apice} dichotome diviso, glaber, striatus, purpureo-roseus; folia ramulosis
pinnata, ternata, longe petiolata: foliola ovata, bipinnata, sesquipolliciana, ovata, inter
dem basi attenuata, venosa, glabra, obtuse serrata serraturis micronatis, Petiolu-
bus utrinque membranaceis: Pedunculi in dichotomia divisi: flores terni foliola
duo linearia parva ad diviisuram. Semina ~~seta~~ apice hamosi.

Sanicula

Habitat in terra Commerfon herb. Mus.

Caule herbaceo, erecto glabro, striato; superne dichotomo, pedalis. Folia ternata, radicalia longe petiolata: foliola subsessile, sesquipedaliana, oblonga, glabra, lateralia latere interiore basi obliqua angustiora, latere exteriori ~~incisa~~ ^{sub} lobata utraque acuta ^{sub} incisa, omnia profunde crenata, venosa, crenis micronatis: caulina sub ramificationibus opposita, ternata. Pedunculi in dichotomia et apice solitarii. Semina sessilia

canadensis Sarricula

Habitat in Canada herb. Guss.

Caulis angulatus, glaber. Folia quinato-digitata, radicalia longe petiolata, caulina
petiolo membranaceo: foliola oblonga, subovata, profunde serrata, venosa, glabra
suprema opposita, tripartita

Infoliata ^{Jan} C. Involucris diphyllois foliis ternatis caule dichotomo

Habitat in Ambra Forkhal

Caulis erectus dichotome ramosus usque pedalis. Folia
petiolata ad ramos tantum remotissima, foliola ova
ta fere utraque apice mucronata serrata glabra
suprema sub pedunculis linearia indivisa

ob habitum huius refero cum ~~fl.~~ fructificatione
propter semina, sed non vid. planta obdura

Trifoliata Saniula caule folioso dichotomo, foliis ternatis
cuneatis serratis

Habitat Mohayo Forshall

Caulis ~~stratus~~ ^{radice} ~~us~~ ^{subpithambi} sulcato angulatis crispis fide exportis

Distichis sesquipedalis glaber folia petiolata ternata
foliola pollicaria cuneata subsessilia ^{inferiora} extorsum versus
subtrifido incisae, serrata serraturis ^{seta} brevi terminatis.
Umbella simplex radiis 3 bus brevibus semina
magnitudine vix conandi cum hujus generis

Europsa L. foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus L. V

Flor. Dan. Tab. 283.

Diapensia Cam. epit. 163.

Sanicula officinarum Bauh. pin. 319.

Habitat in Europa montosis sylvis usque Virginia 4.

Folia per radicalia petiolata, cordato subrotunda, quinque-
^{expuncto serratis serratis serratis apice obtusis}
da laciniis lateribus geminis bifidis; intermedius trifidis

lacinaulis serratis serratis glabra ^{caulis} Petioli elongati
caule dimidio breviores. Scapus ^{pediculis} erectus striatus glaber

umbella terminulis composita univesali 4-5 radiata

partiali tri radiata involucrium et involucriella diphylla

univesale ^{diphyllum} tri radiatum partiale 3-5 phyllum foliolo nervis
integris. Flores in capitulo

canadensis Sanicula foliis radicalibus compositis: folioli curvati Lin. Sp. ex. pl. p. 339 →

L. N. p. 272 Gron. Virg. 146.

Sanicula canadensis, amplifolius laciniato folio Tournef. F. R. H. 326.

Habitat in Virginia 4.

Structura ita cum Curioso convenit, ut vix differentia, sed planta decuple
saepe omnibus partibus major Lin.

non vidi

Manlandia Sanicula foliis masculis pedunculatis: hermaphroditis sessilibus Gron. V.
31. L. S. V. 1772. Gaëq. Coll. 2. p. 293.

Sanicula manlandia, caule Stamulis dichotomis, echinis minimis in eodem
communi pediculis ternis Raii suppl. 260.

Sanicula foliis septilobatis inopcalibus, foliis masculis pedunculatis Hort.
Upf. 57.

Habitat in Manlandia, Virginia & Dedit Nutt.

Caulis erectus sesqui-pedalis sulcatus angulatus glaber hinc
plurispinus. Solia inferiora petiolata ^{remota} superiora sessilia
caulina quoque partita laciniis ovatis tripollicaribus basi at
tenuatas lateralibus trifidis sic radice alia longius
petiolata 5-7-fida omnia profunde & inaequaliter
serrata supra glabra subtus villosa pallida, serraturis
mucronatis. Radix umbello quinque umbellula
3 vel 5 involuella diphylla basi serrata incisa.

caule foliis

Secundum specimina herb. Lin. an forte non diversa sunt canad. et
manland

S. mantardii