

Santolina

1. *chamaecyparissus* L. pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis
2. *rosmanifolia* L. pedunculis unifloris, foliis ramorum fruticulosi marginibus
bifariam tuberculatis, fertiliam internis
3. *ageratum* L. foliis pinnatis tomentosis, ramorum sterileum caesuceiformi linearibus
pinnatis, pedunculorum linearibus
4. *alpina* L. pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caulebus simplicibus
5. *anthemoides* L. pedunculis unifloris subsymptosis, foliis bipinnatis cauleque
tomentoso tomentosis

♂. (repens) herb. Mus.
♀. (canescens)

Santolina (abrotanum) hispanicum capitulis minore herb. Tournef. Ved. Fus.

Santolina?

Santolinoides perennis. Chamomelifolia caule ramoso Act. Plant.
herb. Mus.
Ved. Fus.

fragrantissima Santolina ~~incana~~, foliis oblongis crenatis, corymbis simplicibus, ramis calycibusque ^{niveo} tomentosis.

Santolina fragrantissima; corymbis fastigiatis; caule fruticoso diffuso, tomentoso; foliis ovatis, serratis, sessilibus Forst. descr. 147.

Habitat in desertis hahiniis.

Caulis pedalis, erectus, diffusus, virgatus, et tomento levi ^{vix} nivei
Rami sparsi teretes. Folia frequentia, sessilia, semirigida
lancea, oblonga vel ovato-oblonga, obtusa, rugosa, supra glabrata
gubtus incana. Peduncululi terminales brevissimi, duo vel tres
uniflori vel alter biflori. Calycis foliola oblonga, obtusa, canina
ta. Paleae lineares hyalinae

~~Onopordum~~

~~Carduus arvensis acanthifolius v. ind. et glaberrimus, flore purpureo ante Tour
Cor.~~

~~Habitat in Areta herb. Aus.~~

~~Similis *O. acanthifolius*. Caulis crassitie digiti minimi, alatus, ut in *O. acan-*
thio villosus. Folia inferna sequi pedalia dentato spinosa, glabra. Flor-~~

~~terminalis, foliatus. Calycis squama lanceolata, pollicaris, nec
brevis orata attenuata. Folia nonnulla sub capitulo~~

23. fragrantissima Santolina floribus corymbosis, foliis ovatis crenulatis.
Santolina fragrantissima; corymbis fastigatis; caule fruticoso diffuso
tomentoso; foliis ovatis, serratis, sessilibus Gaylth. Desf. v. pag. 147. no 71.
Caule ^{in capis} ~~tomentoso~~ ramosis; ramis alternis
Folia ovata, sessilia, alternis, approximata, in junonibus imbricata, crenu-
lata, obtusa, crassa, villosa.
et corymbi terminales, compositi.
Periantho calycis oblongo, obtuso, caniato, villosa
Palea receptaculi oblonga margine membranacea

1 Chamocypanthus Santolina pedunculis unifloris, foliis quadrifariis dentatis Lin. S. V. pag. 240

Chamocypanthus Plinii Tray - Fuchs

Abrotanum femina vulgare Clus. hist. 1. p. 341.

Abrotanum femina foliis teretibus Bauh. Pin. 136.

Habitat in Europa Australi 5

Cortex ramosus ramis teretibus superne tomentosis incanis, folio linearis confecta
ni pedunculatis remota ^{pollicariis} incanis junioribus teretibus dentibus quadri
fariam umbriata. pedunculorum fere plana fere adnata dentata ven
tibus bidentatis. Elos terminalis solitarius flavus. Calyx villosus. Squama
Calycini lanceolata

2 rosmarinifolia lan. pedunculis unifloris foliis ramorum sterilibus margine tuberculatis, fere lacin
subrotundis. biseriam

Abrotanum femina 4. Clus. hist. 1. p. 342.

Abrotanum femina, foliis rosmarini, major Bauh. Pin. 137. Monf. hist. 3. p. 12. f. 6.
tab. 3. fig. 22.

Santolina rosmarinifolia pedunculis unifloris, foliis linearibus margine tuber
culatis Lin. f. V. pag.

β. Abrotanum femina 5. Clus. hist.

Abrotanum femina, foliis rosmarini minoribus, Bauh. Pin. 137.

γ. Abrotanum femina 6. Clus. hist.

Abrotanum femina viridis Bauh. Pin. 137.

δ. Abrotanum femina villosa et incanis foliis Bauh. Pin. 137.

1. Anisimum Diosc. abrotani feminae folia Lobel. Ad.

Habitat in Hispania 7.

a. β. foliis ^{ramis glabris} junioribus tomentosis γ. glaber foliis glaucis. ramisque junioribus rose
aspirantes. Folia in ramis sterilibus approximata, semipollicaria redimen
ta ramulorum ex omnibus axillis hinc folia quae fasciculata, Rami floriferi
longiores. folia longiora absque redimenta ramorum, remotiora, absque tuber
cula ad marginem interdum densa utroque ad apicem. Peduncululus sulcatus sub
flore incoasatus. Calyx glaber speciem ovatis acutis, interioribus apicibus mar
queque subrotundis hyalinis.

tinctoria L. pedunculis unifloris, foliis lanceolatis integerrimis, caulibus
stratis Molin. Chil. hist. nat. pag 114
Habitat Chili ~~novi~~

novi

3, ageratum Santalina ~~pedunculata uniflora~~, ^{fomentosis} foliis pinnatis: ramorum paniculam lineari cunei
formibus, ^{pediculis} pedunculorum ~~dentato pinnatifidis~~, pedunculorum linearibus subintegra
Habitat in Hispania &

Similis Rosmarini folia diversa videtur foliis lanceolatis linearibus basi
attenuatis, obtusis longitudinaliter dentato incisio dentibus linearibus
superum in brevitate ^{parallelis} in foliis retusioribus remotis.

Pubescentia ramorum ex omnibus axillis: Pedunculus elongatus

Folii remotis superioribus & integris. Squamae calycinae lineares
interiores ⁱⁿ ab. que ⁱⁿ membrana seriosa. Paleae lineares apice flavescientes longi
tudine flosculorum

Galpuna Santolina pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caulibus simplicibus. Lin. S. V. pag.

741.

Pyrethrum alternum minus, caespitosa radice, anthemidis flore, italicum Barr. P. 522.

Habitat in monte morone Italia 4.

Santhemoides Sant. pedunculis unifloris subcorymbosis, foliis bipinnatis cauleque ramosissimo
Tomentosi

Santolina perennis, Chamomeli-folio, caule ramoso Vaill. art. 372.

Sant. anthemoides, pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caule ramosissimo vello
Lo. Lea Spec. pl. pag. 1180 + S.V. pag. 741.

Habitat in Hispania, Italia &

Plantae
pedalis

Caulis basi perennans lignosus ramosissimus rami dense tomentosi ^{prospere} diffusi
et a basi petiolum sessilibus alternatim vaginatus. Folia petiolata
simpliciana, bipinnata, ^{junius} approximata, ^{illisque} pinnis pectinatim oppositis, lineamentis
integerrimis, pectinatis foliolis ^{nonnulli} basi apice minoribus junioribus
dense tomentosi. Petiolus longitudine folii basi dilatatus amplexu
cauli subvaginarum, persistens, state glaber, versus apicem ramorum
inabruccia. Rudimenta ramorum eorum est omnibus axillis.

Pedunculi terminaliter 3 vel 5: subsessili versus apicem
foliolis basi minoribus ovatis alternis, pollicares, uniflori. Squa
ma calycino oblongo obtuso, villosa