

Sapium

acutiparum

annotationem ad Sapium ex insula Bourbonis vide inter Obs. no 328
Panic. glabri Verstea. Folia petiolata sparsa, 3-4 pollicaria. Spica terminali in
hollibus, simpliciter. Flores foeminei inferi, ut in reliquis frequentat.

obovatum Sapium foliis cuneatis integerrimis nitidis emarginatis

Habitat in insula Francia Comnes herb. Mus. F.

Rami teretes, glabri, dichotomi, ciliati, crassitie pennis anserina. Folia p^{er}
pennis, approximata, sparsa, basi versus per se attenuata, obtusissima, ^{sub} cuneata
obscure simpliciter venosa, margine costaque supra sepe ^{Petiolis pilani, effundunt} purpurea. Spica
terminalis crassitie fere pennas anserina. Pedunculus fusco-purpureus.
Flores remoti.

Lineatum Sapium foliis lanceolatis nitidis, petiolis glandulosis

Sapum lineatum La Mart

Habitat in insula Bourbonia Commerf. herb. Tuss. 3

Radix teretes, glabra, crassitie penna cygnae. Folia versus apicem, spatulata, per
violata 2-6 pollicaria, transversim oblique venisiter nervosa, subarenia, sub
tus simpliciter venosa, obtusi-²scula, ex utroque extremo obsolete serrata, supra
nitida, margine cordataque virescentia. Petioli plani, semipollicares.
Pedunculus terminalis erectus. Flores distantes.

biglandulosa H foliis ovato-oblongis basi biglandulosis Lin. S. V
Tithymalus arbor americana, mali medici foliis amplioribus Venus f. m. c. c.
natis sulco max. in venis Plin. alm. 369 tab. 229 fig. 8
Mancanilla laur. foliis oblongis Plum. Gen. 9c. 174 fig. 2.
Sapium aucuparium Jacq. Am. 31. tab. 150

Habitat in America calidioribus

Arbor 30 pedalis. Folia acuta serrata (laniceolato-oblonga Jacq.).

Corticis nitida, oblique multinervo, alterna ^{scissilis} ^{perpetua} ^{aggregati} ^{perpetua}
Spica terminalis, semipedalis, fere flores masculi in perne
foeminei solitarii omnibus basi glandulis duabus.

aucuparium ~~Aucupa~~ non Sapium