

Saponaria

1. officinalis *S. calycibus cylindricis, foliis ovato - lanceolatis.*
2. Vulcania *S. calycibus pyramidatis quinqueangularibus, foliis ovatis atuminate connatis*
3. Croatica *S. calycibus quinqueangularibus fratis, caule erecto subduotomo, foliis pubelatis*
4. porrigena *S. calycibus cylindricis pubefestibus, ramis di varicatis spinis, fructibus pendulis*
5. illyrica *S. calycibus subcylindricis, caule erecto refido purpurasciente, ramis alternis*
6. ozymoides *S. calycibus cylindricis, caulebus procumbentibus, foliis oblongis canaliculatis*
7. orientalis *S. calycibus oblongis villosis, foliis linearis - lanceolatis, caule dichotomo erecto patulo.*
8. lutea *S. calycibus teretibus, corollis coronatis, floribus subumbellatis, foliis publencaribus canaliculatis.*

Saponaria

Lycchnis orientalis, Boraginis foliis Tournef. Cor. pag 24

Habitat in Iberia herb. Tournef.

Caulis villosus. Solia petiolata, bpollicaria, ovata, attenuata, villosa, venosa
subtruncatim crenata. Pedunculi et alii superioribus, dichotomi. Calyx campanulatus. Styli 2.

Suffruticosa Saponaria

Habita in Syria herb Darfort. 4

Caules plures, vel rami a seti rotis canulebus; simplices; digitales; Vellopi. Flores in
ternum 3. 4. conferti.

habeo no 1.

Homalotheca Saponana

Habitat in Syria herb Desfont 4

Caulis suffruticosus; palmatus, inferne ramosus: rami superne vellosi, feliformis; Verbes.
Solia inferne in ramulis, confusa, linearis subcuneata, superiore remota, lanceolata.

minima Saponaria

Saponaria orientalis minima multiflora, floræ suave nebente

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis plures, ramosi, diffusi, pubescens, fructuosa, folia ^{tangit} ^{oblonga} ^{pratulata} vel subrotunda, vello
sa. Pedunculi terminales, triflori. Flores superflue. Calyx villosi, floriferi cylindrici

habes

1 officinalis Saponaria Salicibus Cylindricis foliis ovato lanceolatis Lin. s.v. p. 416
fl. Dan 24³

Saponaria Dodon.

Saponaria major Linii Bauhin. Lin. 206.

B. Saponaria concava anglica Bauhin. Lin. 206.

Mons. h. 2. p. 540. f. 5. t. 22. fig. 52.

Gentiana folio convoluto Bauhin. h. 3. p. 346.

Habita in Europa media. p. inventa a Gerardo in Nothamtonshire
Anglia 3.

Paulis glaber erectus simplex alternatio bipinnatus. foliis ellipticis,
glaber nemus, toria, avenia, non nervis integerrima typus
leucanthes folia pedunculi est axillaris summis et terminalibus
oppoisti triflori. Calyx & Tener apice angustatus pallidans
glaberrimus lacinia lanceolata & sub pedicellis

B. differt hybrida foliis ovalibus obtusis calycibus obtusis
corolla monopetala calyx duplo longior indurata

— elliptici & nervis

2 Vaccaria Saponaria calycibus pyramidatis quinqueangulatis; foliis ovatis
a Cumini se sebebatur connatis Lin. S. Ley pag 416

Polygonum sva Lydwech Trag.

Vaccaria Dod. pempt 104.

Lycni segatum nubo folio perfolato Baub. Pli 204.

Habitat inter praderas, Gallia, Germania, Helvetia Orientis &
Pauli eretus longissimus apice dichotomus diffusus. Tolia basi
connata, ovato-lanceolata, inde gemina bipinnata longissimo
aristis oblongo nervosa, glauco-viridia. Panicula dichot-
oma fortissima pede eti ~~lata~~ ^{ata} latetatis brevis bibractatis. Den-
tribus calycinis purpureis cibis.

— ovato lanceolatis

47 Portulaca saponaria calycibus cylindricis pubescentibus; ramis divaricatis, fructibus pendulis Lin. Mant. 239*

Lycchnis chalceensis annua, foliis paniculatis hispatis angustis, florebus carneis, pediculis infirmis bimaculatis, capsulis feré rotundis Morf. h. 3.
p. 541. mala

Silene nemorum Syst. Nat. 3. p. 230.

Habitat in Oriente C.

Ramis bipinnatis exstans; inferne glaber, superne pilosus rufopurpureus. Dicots
me ramorum ramis divaricatis. Obovo lanceolata acuminata
oblonga trinervia bipinnata, inferna glabra superna vello
rufopurpurea. Pedunculi catillares foliarii, longitudo foliorum
capillares; umbrae patentes summi fructiferi penduli. Calyx
oblongus tubulosus, peripherie rufidus. Petala absque corona, subin
carnata, emarginata laevius brevibus lacinia

lanceolatis villoso attenuatus

Ocymoides Saponaria calycibus cylindricis, caulebus procumbentibus foliis oblongo-
lanceolatis Lin. s. v. pag 407. Gaeger fl. aust. vol. 5 append t. 23.

Pneorum Matth.

Ocymoides repens Lam.

Lychni vel ocymoides repens modicum Baeh. Lin. 207.

Saponaria menor quibdam Baeh. Hist. 3. p. 344.

Habitat in Helvetia, & Italia, Montpelii petrofi, umbrosi & ~~bifidissimi~~
~~ata subpetiolaris~~ Caules diffusi ramosi Tetragonis villosi viscosi. Solea oblonga ~~viscosa~~
oblonga puberulosa. Pedunculi ex art. illi superne oppositi et
terminalibus. pedicellis trifloris. Calyx ex hispiti semiangusti culano
tubuloso superne non angustati.

5 Illyriæ Saponaria calycibus subcylindricis, caule erecto virido purpureo rami alterni, corollipatentia Lin Mant. 70 & S. V. p. 417
Saponaria caule dichotomo hispido, floribus fastigatis, corollipatentibus, petatis in tegumentis punctatis Ad. Spec. 2. p. 24. t. 4

Habitat in Illyria, Barbanay
Praecepit Lignosus crevus pithamou, ramosus rami subcylindrici articulis superioribus prolinearibus. folia lata linearis lanceolata
in genora conformatio caulem vegetantia articulis longiora, superiora
remota articulis breviora striata subtilissime basi connata
margine latro. terminali ^{ramorum} rami si fiformes unguiculares uniflori; Flores
pedunculi terminali si fiformes unguiculares uniflori; Flores
substantes. Oalyx subcylindricus pubescens; dentatus totum
que fructus albus. Petala linearis ciliata calyx longiora albida venis
vel penitus purpureas. Germen cylindricum

folios linearibus

orientalis Saponaria Calycibus oblongis villosis, caule dicto rotundo erecto patulo.
foliis ~~lanceolatis~~
~~Lan.~~ Hort. Upf. 106. n. 2. Spec. pl. p. 505. t. V. pag. 45.

~~Lynnis~~ ~~orientalis~~ annua saponaria, antitheni foliis, flore minimo purpureo
rapiente Tournef. Cor. 25. Dill. Elth. 4. 187. fig. 204.

Hab. et in oriente O

ramosissima

~~Ram.~~ Planta semi-pedali ramae Verthibus potentiis, foliis formibus
Hapice subrrollata ^{lanceolata} glabri. Folia lanceolata glabra, angustata, foliis pedunculi
in dichotomia d. axillis capillaris folio breviori uniflori. Calyx
oblongi villosi, fneet. per ovata erecti superne angustati

Sup. orientali calyxbus cylindricis oblongi villosi caule recte dicto
rotundo patulo Lin. Hort. Upf. 106. n. 2. Spec. pl. p. 505. t. V. p. 457.

lutea Saponaria calycibus verticibus, corollis coronatis, floribus subumbellatis, foliis
sublineariis canaliculatis Linn. s. v. p. 417

Lychnis floribus umbellatis ochroleucis, petalis ovatis filamentis nigris

All. pedem. 29. t. 5. fig. 4

B. globularia lutea montana Pol. Ephor. p. 152. t. 153.

Belli montana, globosa luteo flore Baub. Pl. 262.

Lychnis rubra globularia capitulo Boll. s. m. f. 2. p. 25. t. 82. t. 1.

Lychnis lutea montana, globularia capite et flave Baret. t. 490.

Habitat in Alpibus Etalianis, Seneffellanum, Canisio 4

Planta copitosa radice lignosa. Caulis erecti; digitatae simplicissime
teretes villosi. Tolla luteana od basi aggregata, pollicaria, basi parum
angustiora, subciliata, glabra. Caulera 2 vel 4 minor. Flores termina
ti pedunculati subumbellati. Calyx villosi. Floniferi subciliati
dorsi, fructiferi campanulati. Petala bifida. filamenta concreta
done corolle.

societatem in herb. Vaillant. videlicet foliis radicibus cuneatis cauleque glabro
bracteis ciliatis. Caulis spiritham.

3 Cratæa Saponaria calycibus quinqueangulatis stratis, caule erecto subdichotomo, foliis
pubulatis Lin. Spec. pag. 504 & L.V. pag. 416.

Saxifraga altera Alp. cat. 292 & 291.

Habita in Preto andi.

Caule brachiatuſ ſive dichotomuſ, Terer velloſo rufiduſ anguſtuſ, pedalis. Folia linean-
i pubulata, loria. Pedunculi axillares, foliari, uniflori, ſtneti. Stems erectus. Calyx
quinqueangulans angulis striis toribus, monophyllus, oblongus, acutus, inter dentes
membranaceus. Petala parva, indegra Lin. Spec. t.c.

non videt