

Saracha

Si genus proprium, nomen genericum aliud esse debet ne cum
Saraca Lin. confundi poter

procumbens Atropa caule herbaceo procumbente, foliis geminis inaequalibus ovatis
glabris: floribus umbellatis. Caran. vi: 1. pag. 53. Tab. 72. La Mark
Habitat in Mexico et Peruvia

Caulis herbaceus foliatus, valde ramosus, tripedalis, rami teneri subtilifoli.
Folcia ovato-acuta, in petiolum depresso, integerrima subtus glauca
Pedunculis communis solitariis inter duos pedicelos ut pollicari pedicellis
2. s. umbellatis. Calyx ~~pro~~ semi-superfici corolla brevior, fructifer acutus
patens. Corolla herbacea lutea rotata patens prima. Stamina filamenta
strobili unum intra Germani infidentibus. Stigma unisulcatum. Fructus
globosus, glaber baccis bilocularis. Semina numerosa Cav.

Saracha procumbens foliis geminis ovatis integerrimis, pedunculis sub
quadri flori umbellatis Fl. Peruv. 2. pag. 43. Tab. 100. fig. 6

Atropa procumbens caule herbaceo procumbente, foliis ovatis glabris
corollae patentissimae La Mark. Fl. Ind. 2. p. 12.
non vid.

Saracha contorta foliis ovatis angulato-dentatis integrisque, pedunculis multi-
floris umbellatis. Fl. Penn. 2. pag. 43. tab. 100. fig. a

Habitat in praeceptis Pennae. C.

Caulis herbaceus ulnaris, erectus, pentagonus, 5que sulcatus, canis, ~~ramosus~~, glaber,
inferne teredo violaceus. Rami dichotomi vel alterni pubescentes. Folia
alterna, petiolata, ovata: inferiora 3 obovata, angulato-dentata, superiora
gemina, altera minori, basi inaequalia, integerrima, obliqua, acuta, utrin-
que pubescentia, per petiolum decurrentia. Petioli teretes, folio dimidio
breviores. Pedunculi ex dichotomiis et axillis superioribus, solitarii, contorti,
sulcati, 6-10 flori, declinati. Flores umbellati, nu. 5-10. Pedicelli uniflori
contorti. Corolla albo lutescens, campanulata, tandem patens, prima
lacina acuta. Stamina basi hirsuta. Bacca globosa, nigra, magnitudi-
ne pisi. fl. Per. l. c.

scabrum Solanum inermis subherbaceum, caule tuberculato sic abro, basi
repente, foliis oblongo-lanceolatis pubescentibus La Mart. T.
E. 2. p. 14.

Melongo ~~ata~~ Sewall. obj. 2. 4. 26

Habitat in Penet

variat foliis appendiculatis subpinnatis

Lamium dentata foliis geminis ovatis integris dentatisque, pedunculis subquadris
ris. Pl. Penur. 2. pag. 43. Tab. 179. fig. 6.

Habitat Penuro in versuris. ☉

Pubescens. Caulis herbaceus, prostratus a radice ramis geminis. Rami pro
cumbentes, semipedales, dichotomi, angulosi, venae. Folia gemina, altera
brevis, breviter petiolata, ovata, oblonga lanceolataque, integerrima
vel dentata. Pedunculi ex dichotomiis interfoliaceique, politissimi, filiformes
tri-vel quadrisflori, interdum quinqueflori. Flores umbellati, corollae bre
vitate pedicellati. Corolla utrinque villosa, albo violacea, pellucida,
fundo punctis 10 viridibus notata, campanulata, tandem patens, rotata
laciniis acutis. Baccæ crocea, magnitudine Pisi. Semina nigrosius
cula Pl. Pen. l. c.

oblonga, ramis dentata

Saracha biflora; foliis ovatis subgeminis, pedunculis bifloris Tl. Per. 2. pag
42. tab. 179. fig. a

Habitat in Peninsula inter segetes et scopos 7

Pubescens. Caulis bipedalis erectus, ~~pauciflorus~~. Rami angulati. Folia solitaria
vel gemina, ovata, acuta, integerrima, venosa. Pedunculi laterales,
solitarii, biflori, rarisime triflori. Flores cernui. Corolla campanulata
vixdem patens: laciniis acutis, venosa, lutes viridi. Stamina corollae
duplo longiora. Bacca alba subrotunda, depresso-umbilicata magnitudine
pisi fl. Per. L. c

folia basi in petiolum attenuata acuminata

Solanum Lycoides caule spungo fruticoso, foliis oblongis obovatis ovatis
ramis in spumam decurrentibus, pedunculis aggregatis unifloris & l. Penn
2. pag. 41. tab. 1. 77. fig. 6.

Habitat in Pennis argillosis et petrosis 5

Saracha punctata, foliis ovato-oblongis solitariis, corollis punctatis. Flor
Pennis. 2. pag. 42. Tab. 170. fig. 6.

Habitat in Pennis alpebus.

Caulis suffruticosus, bis 4 tripedalis, teres, furcatus. Rami angulati, puberuli
centi. Folia sparsa, petiolata, ovato-oblonga, integerrima, venosubima
puberulenta, supra glabra. Peduncululi ex apicibus ramulorum vel gem
marum vel gemmarum aggregati, uniflori, ad basin attenuati, corolla
paulo longiores. Flores nati antes. Calyx glaber: lacinae ovato-bus
rotunda. Corolla maxima campanulata, tandem patens: lacinae
reflexae lateo-purpureae, punctis purpureis maculatae, extus
puberulenta. fl. Pennis

Folia ovata

atropa prostrans hinc revocatus ab Auctore, fl. P.

procumbens - ~~Atropa caule herbaceo procumbente, foliis ovatis glabris
corollis patentissimis Ca. Mart. T. E. 2. p. 12.
Atropa procumbens Caran. ii. p. 53. t. 72.
habitat in Peru O~~

non vid.